

2024 年河北省肥乡县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库含答案【综合题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 胰岛素和磺酰脲类药物最常见的共同不良反应是

- A: 低血糖反应
- B: 过敏反应
- C: 胃肠道反应
- D: 肝功能损伤

答案：A

2. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 E

答案：A

3. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

- A: 抑制胃酸分泌作用
- B: 局部止血作用
- C: 主要是抑制 H^+, K^+-ATP 酶
- D: 可以中和胃酸

答案：D

4. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

- A: 5mg
- B: 20~40mg
- C: 15mg
- D: 10mg

答案：B

5. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 多西环素
- D: 青霉素

答案：C

6. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

- A: 儿童慎用
- B: 避免接触眼睛和其他黏膜
- C: 不得与铁制品接触
- D: 可用于痤疮、脂溢性皮炎

答案：C

7. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

- A: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- B: 克罗米通具有局部麻醉作用
- C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：C

8. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 克林霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 两性霉素 B

答案：B

9. (2017 年真题) 具有留钾作用的利尿药是 ()

- A: 螺内酯
- B: 甘油果糖
- C: 去氨加压素
- D: 甘露醇

答案：A

10. 治疗勃起功能障碍药的是

- A: 达那唑
- B: 氯地孕酮
- C: 他达拉非
- D: 左炔诺孕酮

答案：C

11. 可能诱发酒后双硫仑样反应的抗菌药物是

- A: 甲硝唑
- B: 米诺环素
- C: 左氧氟沙星
- D: 哌拉西林

答案：A

12. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

- A: 十一酸睾酮
- B: 特拉唑嗪
- C: 西地那非
- D: 坦洛新

答案: D

13. 防治新生儿出血症应选用

- A: 维生素
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K
- D: 垂体后叶素

答案: C

14. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节的感染的是

- A: 万古霉素
- B: 克林霉素
- C: 替硝唑
- D: 红霉素

答案: B

15. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是 ()。

- A: CYP2E1
- B: CYP286
- C: CYP2D6
- D: CYP2C19

答案：D

16. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 替格雷洛
- B: 氯吡格雷
- C: 噻氯匹定
- D: 替罗非班

答案：C

17. 可诱导肝药酶活性的抗结核病药是()

- A: 异烟肼
- B: 对氨基水杨酸
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：D

18. 巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是

- A: 胃、十二指肠溃疡
- B: 深度呼吸抑制
- C: 肝脏损害
- D: 高钾血症

答案：B

19. 突然停药可导致反跳现象的是

- A: 硝酸甘油
- B: 哌唑嗪
- C: 氨氯地平

D: 可乐定

答案: A

20. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 ()。

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 西格列汀

D: 阿卡波糖

答案: A

21. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是 ()

A: 纳武利尤单抗

B: 巯嘌呤

C: 氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案: A

22. 治疗脑水肿、降低颅内压的首选药物是

A: 氨苯蝶啶

B: 甘露醇

C: 螺内酯

D: 阿米洛利

答案: B

23. 维拉帕米的药理作用是

A: 促进 Ca

B: 降低窦房结和房室结的自律性

C: 增加心肌收缩力

D: 直接抑制 Na

答案: B

24. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

A: 伊立替康

B: 多西他赛

C: 氟尿嘧啶

D: 多柔比星

答案: D

25. 治疗贾第鞭毛虫病最有效的药物是()。

A: 氯喹

B: 奎宁

C: 伯氨喹

D: 甲硝唑

答案: D

26. 患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0.5g，一日3次；阿卡波糖0.1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能I级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 乙酰唑胺

B: 呋达帕胺

C: 氨苯蝶啶

D: 呋塞米

答案: D

27. β -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

- A: 重组人促红素
- B: 链激酶
- C: 叶酸
- D: 尿激酶

答案：B

28. 周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 四氢叶酸

答案：A

29. 患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因“脊柱侧弯”入院。入院后完善相关检查，拟行“脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术”。既往有头孢类过敏史。

- A: 替考拉宁
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 左氧氟沙星

答案：B

30. (2017年真题) 抑制细菌叶酸合成 ()

- A: 头孢吡肟
- B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- C: 头孢米诺
- D: 利福喷丁

答案：B

31. (2017 年真题) 降低同型半胱氨酸水平的是 ()

- A: 维生素 B2
- B: 烟酸
- C: 泛酸钙
- D: 叶酸

答案：D

32. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- B: 每次注射需要更换不同部位
- C: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存
- D: 混悬型胰岛素可以静脉注射

答案：D

33. 下述药物可引起药物性鼻炎的是

- A: 硼酸甘油滴耳液
- B: 麻黄碱
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 过氧化氢溶液

答案：B

34. 多柔比星与阿糖胞苷同用可 ()

- A: 增加肝毒性
- B: 易产生沉淀
- C: 增加心脏毒性
- D: 导致坏死性结肠炎

答案：D

35. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 氨氯地平
- D: 维拉帕米

答案：D

36. 应用高剂量的 β

- A: 高钙血症
- B: 低镁血症
- C: 低钾血症
- D: 低钙血症

答案：C

37. 米非司酮避孕的主要机制是()

- A: 抑制胚胎发育
- B: 抑制受精卵着床
- C: 促进子宫内膜充血增厚
- D: 抑制乳腺泡发育

答案：B

38. 可导致“类流感样”反应的药物是

- A: 唑来膦酸钠
- B: 帕米膦酸二钠
- C: 氯屈膦酸二钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：A

39. 关于唑吡坦作用特点的说法, 错误的是()

- A: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- B: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- C: 唑吡坦属于 γ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- D: 唑吡坦具有镇静催眠作用, 抗焦虑作用

答案：D

40. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 因子 Xa
- B: 凝血酶 III (AT-III)
- C: 因子 IIa
- D: 因子 IXa

答案：B

41. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 过氧化氢
- B: 酚甘油
- C: 硼酸
- D: 盐酸麻黄碱

答案：D

42. 患者, 女, 41 岁, 因进食不洁食物后发生腹泻, 伴有恶心、呕吐及下腹痛, 大便每日 6~8 次, 为糊状或稀水状, 伴有黏液。血常规检查提示: 白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规: 白细胞 8~10 / HP, 红细胞 3~5 / HP。诊断: 急性腹泻。医嘱: 复方地芬诺酯片, 2 片, 口服, 3 次 / 日; 诺氟沙星胶囊, 300mg, 口服, 2 次 / 日。

- A: 肾功能
- B: 电解质
- C: 肝功能
- D: 尿量

答案：B

43. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 地衣芽孢杆菌胶囊
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 盐酸洛哌丁胺胶囊

答案：D

44. 属于单酰胺菌素类，抗菌谱窄，与青霉素、头孢菌素无交叉过敏反应的药物是

- A: 卡泊芬净
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 特比萘芬
- D: 氟曲南

答案：D

45. 适宜睡前服用，用于抑制"酸突破现象"的抑酸剂是()。

- A: 雷尼替丁
- B: 乳酸菌素
- C: 泮托拉唑
- D: 前列地尔

答案：A

46. 患者，男，57岁，身高175cm，体重87kg，诊断为2型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后1小时
- B: 餐前半小时
- C: 餐前即刻或餐时
- D: 餐后半小时

答案：C

47. 止吐方案：每日化疗前，联合应用5-HT₃受体阻断剂和口服地塞米松12mg，化疗后从第2日到第3日口服地塞米松或应用5-HT

- A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

48. 下列哪项不属于地西泮的注意事项

- A: 静注速度过快可引起高血压
- B: 不应连续滴注，癫痫持续状态除外
- C: 同类药之间的交叉过敏反应
- D: 可使肌无力者病情加重

答案：A

49. 硫酸亚铁临床应用

- A: 缺铁性贫血
- B: 失去药效
- C: 急性中性粒细胞减少症
- D: 缺血性脑卒中

答案：A

50. 链霉素属于

- A: 四环素类
- B: β -内酰胺类
- C: 氨基糖苷类
- D: 酰胺醇类

答案：C

51. 治疗滴虫病宜选用

- A: 吡喹酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 氯喹
- D: 甲硝唑

答案：D

52. 酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()

。

- A: 吗啡
- B: 芬太尼
- C: 曲马多
- D: 哌替啶

答案：C

53. 铵属于 M 胆碱受体阻断剂的是

- A: 乙酰胆碱
- B: 福莫特罗
- C: 异丙托溴

D: 孟鲁司特

答案: C

54. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

A: 小檗碱

B: 夫西地酸

C: 磷霉素

D: 利奈唑胺

答案: B

55. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 布洛芬

D: 泼尼松龙

答案: B

56. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

A: 空肠弯曲杆菌肠炎

B: 骨髓炎

C: 白喉带菌者

D: 婴幼儿支原体肺炎

答案: B

57. 患者，男，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现头痛、眩晕、关节痛、剥落性皮炎的是

A: 地塞米松

- B: 甲巯咪唑
- C: 左甲状腺素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案: D

58. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

- A: 40 倍
- B: 15 倍
- C: 25 倍
- D: 100 倍

答案: D

59. 青光眼患者应该慎用

- A: 沙丁胺醇
- B: 噻托溴铵
- C: 孟鲁司特
- D: 沙美特罗

答案: B

60. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: β 受体激动剂
- B: M 受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案: D

61. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 引起电解质紊乱的概率增加

- B: 耳毒性增加
- C: 低氯性碱中毒机会增加
- D: 利尿作用减弱

答案：B

62. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 胶体果胶铋
- C: 替普瑞酮
- D: 复方碳酸钙

答案：A

63. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

- A: 阿苯达唑
- B: 甲苯咪唑
- C: 哌嗪
- D: 左旋咪唑

答案：B

64. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 哌唑嗪
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：B

65. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 曲妥珠单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 长春新碱

答案：D

66. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是 ()

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 帕罗西汀
- D: 马普替林

答案：C

67. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 高血镁
- B: 高血钠
- C: 高血钾
- D: 碱中毒

答案：C

68. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 下午 4 时左右
- B: 晚餐前

C: 中午 12 时左右

D: 上午 8 时左右

答案: D

69. 利多卡因的电生理作用错误的是

A: 使传导减慢

B: 明显影响动作电位 0 相

C: 缩短复极时间

D: 提高心室颤动阈值

答案: B

70. 关于帕罗西汀的描述，错误的是

A: 用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等

B: 停药时直接停药

C: 停药时应缓慢减量至停药

D: 本品为选择性 5-HT 再摄取抑制剂

答案: B

71. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 四环素

B: 万古霉素

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案: A

72. 雄激素可降低的体内物质是

A: 低密度脂蛋白 (LDL)

B: 高密度脂蛋白 (HDL)

C: 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

D: 乳酸脱氢酶 (LDH)

答案: B

73. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案: A

74. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A: 治疗剂量下不会引起血小板减少

B: 可预测抗凝效果，无需监测 INR

C: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

D: 选择性高

答案: C

75. (2020 年真题) 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 消化道反应

B: 肾毒性

C: 肝毒性

D: 神经毒性

答案: D

76. 抑制脱氧胸苷酸合成酶

A: 阿糖胞苷

- B: 甲氨蝶呤
- C: 羟基脲
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

77. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 抑制二氢蝶酸合成酶
- B: 破坏细菌细胞壁
- C: 抑制二氢叶酸还原酶
- D: 抑制 DNA 螺旋酶

答案：C

78. (2021 年真题) 属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：B

79. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 静脉
- B: 口服
- C: 皮下
- D: 舌下含服

答案：A

80. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

- A: 导致坏死性结肠炎
- B: 增加肝毒性
- C: 增加心脏毒性
- D: 易产生沉淀

答案：D

81. (2017 年真题) 可用于治疗重度痤疮, 但妊娠期妇女避免使用的药物是()

- A: 异维 A 酸
- B: 克拉霉素
- C: 特比萘芬
- D: 克罗米通

答案：A

82. 患者, 女 52 岁, 因“闭经 1 年, 潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊, 临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为: 戊酸雌二醇片, 每日 1 次, 每次 1mg, 醋酸甲羟孕酮片每日 1 次, 每次 2mg。

- A: 白带增多
- B: 乳房触痛或增大
- C: 体重增加
- D: 突破性出血

答案：D

83. (2019 年真题) 患者, 女 75 岁, 既往有 2 型糖尿病史 18 年, 有青霉素过敏史, 因车祸导致左下肢开放性骨折, 术后发生骨髓炎, 给予克林霉素治疗 10 余天, 临床应关注的典型不良反应是()

- A: 急性溶血性贫血

B: 抗生素相关性腹泻

C: 肌肉震颤

D: 红人综合征

答案：B

84. 对生殖过程起作用的是

A: 视黄醛

B: 视黄醇

C: 视黄酸

D: 维生素 A

答案：B

85. (2016 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 艾塞那肽

B: 二甲双胍

C: 那格列奈

D: 阿卡波糖

答案：D

86. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 替格雷洛

B: 氯吡格雷

C: 噻氯匹定

D: 替罗非班

答案：B

87. 咳嗽伴有较多痰液时需要合用

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 喷托维林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/778120027044007022>