

## 2022 年新入职护士岗前培训考核试题及答案

患者在输液过程浮现输液部位疼痛伴有发红和水肿，并可触到条索状物，根据静脉炎分类标准，该患者处于静脉炎()。 \* [单选题] \*

- A . 1 级
- B . 2 级
- C . 3 级(正确答案)
- D . 4 级

一胃癌术后第 6 天患者，已排气，需记录 24h 出入液量，在协助其进食和饮水时，记录内容不正确的是：() \* [单选题] \*

- A . 进食和饮水时间
- B . 食物种类
- C . 食物含水量
- D . 食物的温度及软硬度(正确答案)
- E . 饮水量

轴线翻身时，保持整个脊椎平直，翻身角度不可超过()。 \* [单选题] \*

- A . 30°
- B . 45°
- C . 60°(正确答案)
- D . 90°

营养液配制后若暂时不输注，冰箱冷藏，保存时间不超过：() \* [单选题] \*

- A . 6h
- B . 12h

C . 24h(正确答案)

D . 36h

E . 48h

E . 78h

为膀胱过度膨胀且衰弱的患者导尿，第一次放尿不宜超过：() \* [单选题] \*

A . 500ml

B . 700ml

C . 1000ml(正确答案)

D . 1500ml

E . 2000ml

昏迷患者使用张口器时，应从处()放入。 \* [单选题] \*

A . 门齿

B . 舌底

C . 磨牙(正确答案)

D . 尖牙

一人将患者搬运至平车，平车与床的位置是()。 \* [单选题] \*

A . 平车头端与床尾成锐角

B . 平车头端与床头成锐角

C . 平车头端与床尾成钝角(正确答案)

D . 平车头端与床头成钝角

行持续膀胱冲洗时，溶液滴入膀胱速度为：() \* [单选题] \*

A . 速度 40~60 滴/min

B . 速度 60~80 滴/min

C . 速度 80~100 滴/min(正确答案)

D . 速度 100~120 滴/min

E . 速度 120~140 滴/min

给伤寒患者灌肠时，以下正确的是：() \* [单选题] \*

A . 伤寒患者灌肠时溶液不超过 500ml，液面不高于肛门 30cm(正确答案)

B . 伤寒患者灌肠时溶液不超过 1000ml，液面不高于肛门 30cm

C . 伤寒患者灌肠时溶液不超过 500ml，液面不高于肛门 50cm

D . 伤寒患者灌肠时溶液不超过 1000,ml，液面不高于肛门 50cm

E . 伤寒患者灌肠时溶液不超过 500,ml，液面不高于肛门 40cm

下列有关呼吸艰难这一症状描述不妥的为()。 \* [单选题] \*

A . 可浮现发绀、鼻翼扇动

B . 三凹征见于呼气性呼吸艰难(正确答案)

C . 表现为呼吸频率加快

D . 辅助呼吸肌参预呼吸活动

下列哪项不是呼吸艰难患者采取半卧位的目的()。 \* [单选题] \*

A . 扩大胸腔容量

B . 减少回心血量

C . 保持呼吸道通畅(正确答案)

D . 减轻心脏负担

休克卧位应() : \* [单选题] \*

A.抬高头胸部 10°~20°;抬高下肢 20°~30°(正确答案)

B.抬高头胸部 20°~30°;抬高下肢 20°~30°

C.抬高头胸部 10°~20°;抬高下肢 30°~45°

D.抬高头胸部 20°~30°;抬高下肢 30°~45°

E.抬高头胸部 10°~20°;抬高臀部 20°~30°

下列有关 Braden 压疮危 (wei) 险因素评估表说法正确的是()。 \* [单选题] \*

A . 评分 $\geq$ 14 分, 患者有发生压疮的危 (wei) 险

B . 评分 $\leq$ 14 分, 患者有发生压疮的危 (

wei) 险 C . 分数越高, 发生压疮的危

(wei) 险越高

D . 分数越低, 发生压疮的危 (wei) 险越高(正确答案)

半坐卧位时床头抬高: () \* [单选题] \*

A . 15°~30°

B . 30°~40°

C . 30°~60°(正确答案)

D . 60°~75°

E .90°

患者, 男, 76 岁, 慢性阻塞性肺疾病 10 年, 近一年自觉偶有胸痛, 下肢水肿一

周, 护士赋予患者的指导正确的是: () \* [单选题] \*

A . 轻度水肿者卧床歇息

B . 增加钠盐摄入

C . 适当摄入蛋白质(正确答案)

D . 不可使用利尿药

E . 多饮水

患者呕吐物带粪臭味可提示()。 \* [单选题] \*

A . 胃潴留

B . 小肠梗阻(正确答案)

C . 上消化道出血

D . 以上均不正确

以下关于体温的说法不正确的是: () \* [单选题] \*

A . 妇女月经前及妊娠期体温略高于正常

B . 老年人因代谢率偏低, 体温相对低于青壮年

C . 进餐后体温可略升高, 但普通波动范围不超过 2C(正确答案)

D . 正常体温在不同个体之间略有差异

E . 高温环境下体温可稍升高

需去枕仰卧位的是() \* [单选题] \*

A、行胸腔穿刺后的病人

B、行脊髓穿刺后的病人(正确答案)

C、行腹腔穿刺后的病人

D、行髂前棘骨穿刺后的病人

伤口敷料用胶布固定时, 粘贴方向应与患者肢体或者躯体长轴: () \* [单选题] \*

A . 平行

B . 向左倾斜

C . 向右倾斜

D . 垂直(正确答案)

E . 交叉

某病人因车祸脾破裂急诊入院, 浮现胸闷, 气促出冷汗, 脉细速, 血压

9.1/6.7Kpa, 护士应即将为其安置() \* [单选题] \*

A、平卧位

B、中凹卧位(正确答案)

- C、侧卧位
- D、头低足高位

患者沐浴告知其预防意外跌倒和晕厥的方法不妥的是() \* [单选题]\*

- A、感觉头晕时应先坐下，再呼叫
- B、进食 30 分钟后沐浴(正确答案)
- C、水温不可过热。
- D、走路注意防滑

护士为一位细菌加真菌感染的患者选用口腔护理液正确的是() \* [单选题] \*

- A 生理盐水
- B 0.1%的醋酸溶液
- C 1%- 4%的碳酸氢钠(正确答案)
- D 多贝尔氏液

对有伤口的患者及家属指导不正确的是: () \* [单选题] \*

- A . 告知患者及家属保持伤口敷料清洁的方法
- B . 告知患者及家属保持周围皮肤清洁的方法
- C . 指导患者沐浴时保护伤口的的方法
- D . 告知患者咳嗽时不必保护伤口(正确答案)
- E . 告知患者活动时保护伤口的的方法

患者，女， 56 岁，肺结核 2 年，近来浮现咯血，咯血部位尚未明确，晨起活动后蓦地浮现大咯血。应赋予的卧位是: () \* [单选题] \*

- A . 绝对卧床歇息(正确答案)
- B . 端坐位
- C . 头低脚高位

D . 中凹位

E . 半卧位

压疮 I 期患者禁止使用以下哪种护理措施() \* [单选题] \*

A 半透膜敷料

B 水胶体敷料

C 局部皮肤环形按摩(正确答案)

D 气垫床

对严重腹泻病人护理措施不妥的是() \* [单选题] \*

A 高热量、高维生素、多维生素饮食(正确答案)

B 注意水电解质补充

C 便后温水坐浴或者肛门热敷

D 按医嘱选用止泻药

下列哪项不是肠外营养的并发症() \* [单选题] \*

A 低血糖

B 腹泻(正确答案)

C 导管败血症

D 高渗性非酮症性昏迷

患者张某，男，79岁，慢性阻塞性肺疾病6年，近来咳嗽、咳黄色粘痰，以下护理措施不正确的是:() \* [单选题] \*

A . 提供整洁、舒适的环境，温湿度适宜，减少不良刺激

B . 赋予高蛋白、高维生素、足够热量的饮食

C . 嘱患者多饮水

D . 取仰卧位，防止痰堵窒息(正确答案)

E . 保持口腔清洁，必要时行口腔护理

李某某，行右侧乳房肿瘤切除术后 1 天，护士为其穿脱衣服的顺序是() \* [单选题] \*

A 先脱左侧肢体，先穿右侧肢体(正确答案)

B 先脱左侧肢体，先穿左侧肢体

C 先脱右侧肢体，先穿右侧肢体

D 先脱右侧肢体，先穿左侧肢体

换药时，应按照()原则进行，避免交叉感染 \* [单选题] \*

A 特殊感染、感染、污染、清洁

B 污染、感染、特殊感染、清洁

C 清洁、污染、感染、特殊感染(正确答案)

D 感染、污染、特殊感染、清洁

对排尿异常患者的评估内容，以下说法不正确的是：() \* [单选题] \*

A . 了解患者饮水习惯、饮水量

B . 评估排尿次数、量、伴有症状

C . 观察尿液的形状、颜色、透明度

D . 了解患者的进食情况(正确答案)

E . 评估膀胱充盈度，有无腹痛、腹胀

43 . 患者女， 50 岁，主因头晕入院治疗，赋予七叶皂苷静脉输注，输液部位发生疼痛并伴有发红和水肿，该症状符合静脉炎() \* [单选题] \*

A 1 级

B 2 级(正确答案)

C 3 级



D 4 级

患者女，50岁，主因头晕入院治疗，赋予七叶皂苷静脉输注，输液部位发生疼痛并伴有发红和水肿，该症状符合静脉炎() \* [单选题] \*

A 1 级

B 2 级(正确答案)

C 3 级

D 4 级

为昏迷病人进行口腔护理时，下列操作方法正确的是 () \* [单选题] \*

A 擦拭动作要快而有力

B 棉签尽量湿润，以便擦拭效果更好

C 用血管钳每次只取一个棉球，挤出多余水分(正确答案)

D 如有义齿，取下后放入温开水中保存

晨间护理和晚间护理应安排在: () \* [单选题] \*

A . 诊疗工作前，晚饭后(正确答案)

B . 诊疗工作后，晚饭前

C . 诊疗工作前，临睡前

D . 诊疗工作后，晚饭后

E . 诊疗工作前，晚饭前

为患者进行胃肠减压插胃管时，插入的长度应适宜，测量的方法为() \* [单选题]

\*

A、从发际至剑突

B、从耳垂至鼻尖再至剑突

C、从耳垂至鼻尖再至剑突的长度加之鼻尖至发际的长度(正确答案)

55.某患者，男性，48岁，因“胆管结石”入院，次日10:00进行手术治疗并进行T管引流，12:00回病房，14:00患者蓦地浮现腹痛、发热，查体腹膜刺激征明显，应考虑发生了的病症是() \* [单选题] \*

- A、胆系感染
- B、胆道内出血
- C、引流管压迫肠管(正确答案)
- D、胆汁渗漏

某患者，男性，46岁，因“肺癌”入院，进行手术治疗，术后赋予胸腔闭式引流，第二天，患者在翻身时引流管和水封瓶连接处脱节，护士正确的做法是() \* [单选题] \*

- A、应即将用血管钳夹闭引流管，用手将其折叠后捏紧(正确答案)
- B、及时用手指捏压伤口
- C、即将反折引流管，再接水封瓶
- D、通知医生，根据病情拔除引流管

某患者，男性，45岁，因“冠心病，心肌梗死”入院，入院后进行冠脉造影，诊断为三支病变，赋予冠脉搭桥手术，术后赋予心包、纵膈引流，术后当日白日引流量偏多，晚上20:00摆布，引流量蓦地减少，患者血压下降、心率增快、呼吸艰难、发绀、面色苍白、出汗等症状，应考虑发生的病症() \* [单选题] \*

- A、失血性休克
- B、围手术期心肌梗死
- C、低血糖反应
- D、心包压塞(正确答案)

使用胃肠减压的患者，口服给药时，应先将药片碾碎溶解后注入，并用温开水冲洗胃管，夹管多长时间() \* [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785132140043011044>