

2024 甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整题库（含答案）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 毛果芸香碱滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 卡替洛尔滴眼剂

答案：C

2. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 预混胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：D

3. 属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

- A: 长春碱
- B: 阿糖胞苷
- C: 顺铂
- D: 氮芥

答案：A

4. 用于绝经期妇女骨质疏松的治疗药 ()

- A: 地塞米松
- B: 黄体酮
- C: 雌二醇
- D: 米非司酮

答案: C

5. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 美西律

答案: C

6. 锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 吡拉西坦
- C: 氟西汀
- D: 文拉法辛

答案: B

7. 组胺 H

- A: 肠激惹综合征
- B: 变态反应性疾病
- C: 失眠
- D: 消化性溃疡

答案：D

8. 属于孕激素类的是()

- A: 甲羟孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 己烯雌酚
- D: 睾酮

答案：A

9. 下述不能用于治疗痤疮的药物是

- A: 阿达帕林
- B: 壬二酸
- C: 克霉唑
- D: 过氧苯甲酰

答案：C

10. 中度致吐级别的化疗药有

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 依托泊苷
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

11. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

A: 多西环素

- B: 氧氟沙星
- C: 环丙沙星
- D: 头孢菌素

答案：D

12. 支气管哮喘急性发作气雾吸入

- A: 多巴胺
- B: 去氧肾上腺素
- C: 异丙肾上腺素
- D: 去甲肾上腺素

答案：C

13. 判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

- A: 12~15 日
- B: 2~3 日
- C: 5~7 日
- D: 8~10 日

答案：C

14. 有关奎尼丁药理作用的叙述，正确的是

- A: 可使正常窦房结自律性降低明显
- B: 竞争性拮抗 N 受体，有抗胆碱作用
- C: 可缩短动作电位时程
- D: 直接作用于心肌，中度抑制 Na^+ 内流

答案：D

15. 目前仍用作一线抗结核药的是

- A: 甲硝唑

- B: 链霉素
- C: 青蒿素
- D: 二氯沙奈

答案：B

16. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 克拉维酸
- B: 氨基曲南
- C: 他唑巴坦
- D: 美罗培南

答案：B

17. 主要作用促使细胞中微管装配，抑制微管解聚的抗肿瘤药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 放线菌素
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：C

18. 利多卡因

- A: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- B: 可治疗房性期前收缩
- C: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- D: 可治疗阵发性室上性心动过速

答案：C

19. (2021 年真题) 关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SLG-2) 抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是 ()

- A: 重度肾功能不全患者禁用
- B: 适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒
- C: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响
- D: 降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性

答案：B

20. 常见体位性低血压的是

- A: 十一酸睾酮
- B: 非那雄胺
- C: 舍尼通
- D: 多沙唑嗪

答案：D

21. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是 ()

- A: 双氯芬酸
- B: 阿司匹林
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：D

22. β_1 受体激动后的影响是

- A: 肌肉震颤
- B: 支气管扩张
- C: 脂肪分解
- D: 增加心率

答案：D

23. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇
- B: 顺铂
- C: 来曲唑
- D: 依托泊苷

答案：D

24. 青霉素常见的不良反应

- A: 过敏反应
- B: 锥体外系反应
- C: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- D: 细胞缺氧、酸中毒、休克

答案：A

25. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 四环素
- C: 红霉素
- D: 头孢米诺

答案：C

26. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和其联合有协同作用的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 噻嗪类利尿药
- C: 留钾利尿药

D: 人促红素

答案：A

27. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

A: 心律失常

B: 高血压

C: 充血性心力衰竭

D: 心肌梗死

答案：A

28. 庚酸炔诺酮()

A: 减少精子数目

B: 促进蛋白质合成

C: 抑制排卵作用

D: 抗着床

答案：C

29. (2019 年真题) 起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是 ()

A: 利拉鲁肽

B: 艾塞那肽

C: 西格列汀

D: 罗格列酮

答案：D

30. 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

A: 托拉塞米

- B: 呋塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：C

31. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

- A: 长效硝酸酯类+普萘洛尔
- B: 短效硝酸酯类+螺内酯
- C: 维拉帕米+氢氯噻嗪
- D: 维拉帕米+普萘洛尔

答案：A

32. 袢利尿药可增强强心苷对心脏的毒性，这是因为袢利尿药可以造成

- A: 低钠血症
- B: 低镁血症
- C: 低血压
- D: 低钾血症

答案：D

33. 5-羟色胺再摄取抑制剂与单胺氧化酶制剂合用，出现不安、肌阵挛、多汗、震颤、腹泻、高热、抽搐和精神错乱等不良反应，严重者可导致死亡的现象称为

- A: “宿醉”现象
- B: 戒断反应
- C: 锥体外系反应
- D: 5-HT 综合征

答案：D

34. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

- A: 红人综合征
- B: 高血压危象
- C: 血糖异常
- D: 急性肝衰竭

答案：A

35. 聚乙二醇 4000 可用于

- A: 果糖不耐受儿童
- B: 哺乳期便秘
- C: 炎症性肠病患者
- D: 成人及 1 岁以上儿童（包括 1 岁）便秘

答案：B

36. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: 剂型
- B: 浓度
- C: pH
- D: 作用面积

答案：C

37. 与多柔比星合用或配伍可增加心脏毒性的药物是（）

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿糖胞苷
- C: 利福平

D: β 受体阻断剂

答案: D

38. 非选择性 NSAID 可引起胃黏膜损伤的原因是

A: 抑制 COX-2

B: 阻滞 ARB

C: 抑制 COX-1

D: 抑制 AC

答案: C

39. 中和胃酸的药物是()

A: 奥美拉唑

B: 哌仑西平

C: 雷尼替丁

D: 氢氧化铝

答案: D

40. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 水平

B: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

D: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

答案: C

41. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是()

- A: 通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效
- B: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级, LVEF $\leq$ 40%) 成年患者
- C: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用
- D: 血钾水平 >5

答案: C

42. 早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

- A: 罗红霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 红霉素

答案: C

43. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 快代谢型患者
- B: 慢代谢型患者
- C: 中间代谢型患者
- D: 超快代谢型患者

答案: B

44. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

- A: 口服制剂
- B: 雾化吸入溶液
- C: 干粉吸入方法
- D: 气雾剂

答案：A

45. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

- A: 卡托普利
- B: 地高辛
- C: 氨氯地平
- D: 哌唑嗪

答案：A

46. (2021 年真题) 血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是 ()

- A: 头孢唑林
- B: 左氧氟沙星
- C: 万古霉素
- D: 青霉素 G

答案：C

47. (2021 年真题) 属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是 ()

- A: 利伐沙班
- B: 氯吡格雷
- C: 华法林
- D: 依诺肝素

答案：C

48. 头孢唑林

- A: 肾毒性较大
- B: 用于非典型病原体感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

49. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 减少回心血量
- B: 增加心率
- C: 增加心室壁张力
- D: 扩张容量血管

答案：C

50. 哌拉西林

- A: 对支原体有效
- B: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- C: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- D: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

答案：B

51. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 多柔比星
- B: 多西他赛
- C: 氟尿嘧啶
- D: 伊立替康

答案：A

52. 静脉溶栓首选的药物是

- A: 维生素 K
- B: 达比加群酯
- C: 阿替普酶

D: 重组人促红素

答案：C

53. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

A: 绦虫病

B: 疟疾

C: 蛲虫病

D: 蛔虫病和蛲虫病

答案：D

54. （2019 年真题）能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下转化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是（）

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案：C

55. 为酸性强氧化性消毒药，遇有机物释放出新生态氧起氧化作用，能杀灭病毒、细菌、真菌、芽孢等各种病原微生物的消毒防腐药是

A: 过氧乙酸

B: 依沙吖啶

C: 聚维酮碘

D: 氯己定

答案：A

56. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 拉米夫定
- C: 乙胺嘧啶
- D: 吡喹酮

答案：A

57. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的 cAMP 含量，缓解慢性心力衰竭症状()

- A: 硝普钠
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：B

58. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 ()。

- A: 血钾
- B: 血钙
- C: 血氯
- D: 血钠

答案：A

59. 卡泊三醇治疗银屑病的作用机制是

- A: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常
- B: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

C: 通过角蛋白表达正常化，促进角朊细胞末端分化

D: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力

答案：B

60. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

A: 奎尼丁

B: 利多卡因

C: 胺碘酮

D: 普萘洛尔

答案：B

61. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A: 克拉霉素

B: 克罗米通

C: 异维 A 酸

D: 特比萘芬

答案：C

62. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 阿那曲唑

C: 依托泊苷

D: 顺铂

答案：B

63. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 呋塞米

B: 乙酰唑胺

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案: B

64. 属于抗胆碱药的是()

A: 哌仑西平

B: 氢氧化铝

C: 奥美拉唑

D: 雷尼替丁

答案: A

65. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 阿昔莫司

D: 阿托伐他汀

答案: B

66. 属于刺激性泻药的是()

A: 多库酯钠

B: 番泻叶

C: 欧车前

D: 利那洛肽

答案: B

67. 服用他汀类药物需要监测肌毒性，该临床指标是

A: 尿淀粉酶

B: 肌酸激酶

C: 碱性磷酸酶

D: 乳酸脱氢酶

答案：B

68. 未确诊的腹痛、炎症性器质性肠病、肠梗阻、肠穿孔患者禁用()

A: 甘油

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案：D

69. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

A: 用药期间需定期测定血红蛋白

B: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

C: 用药过量可导致出血并发症

D: 对于不同的手术选择的疗程不同

答案：B

70. 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不宜选用的糖皮质激素是

A: 可的松

B: 泼尼松龙

C: 泼尼松

D: 氟替卡松

答案：B

71. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 氟维司群
- C: 依西美坦
- D: 来曲唑

答案：A

72. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 肾功能不全者无需调整剂量
- B: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染
- C: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- D: 属于杀菌剂

答案：A

73. 氨基苷类抗生素的抗菌机制是

- A: 抑制细菌细胞壁的合成
- B: 影响叶酸代谢
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响胞浆膜的通透性

答案：C

74. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 洛伐他汀

答案：C

75. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案：B

76. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

- A: $\mu 1$ 受体
- B: δ 受体
- C: K 受体
- D: $\mu 2$ 受体

答案：B

77. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是

- A: 延长房室结的功能性不应期
- B: 增强交感神经效应
- C: 阻滞 β 肾上腺素能受体
- D: 减慢心房和房室结的传导

答案：B

78. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A: 布美他尼
- B: 呋塞米
- C: 托拉塞米
- D: 依他尼酸

答案：D

79. (2018 年真题) 过度使用, 会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积, 引起严重肝毒性的药物是 ()

- A: 双氯芬酸
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案: B

80. 氟西汀用于治疗神经性贪食症, 成人每日用量为

- A: 20mg
- B: 50mg
- C: 100mg
- D: 60mg

答案: D

81. 作用于二氢叶酸合成酶, 干扰叶酸合成的第一步的是

- A: 甲氧苄啶 (TMP)
- B: 替硝唑
- C: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- D: 莫西沙星

答案: C

82. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 拟胆碱能药
- B: 拟肾上腺素能药
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: 前列腺素类药物

答案: D

83. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 红人综合征
- B: 高血压危象
- C: 急性肝衰竭
- D: 血糖异常

答案：C

84. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 哺乳期慎用
- B: 滴眼后不应压迫泪囊
- C: 可诱发闭角型青光眼
- D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案：B

85. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

- A: 表面活性剂
- B: 氨溴索
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 糜蛋白酶

答案：D

86. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 凝血酶 III (AT—III)

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 因子 X_a

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/786112121054011030>