

1. 口服避孕药的禁忌症不包括

- A. 患严重心血管疾病病人
- B. 糖尿病病人
- C. 甲状腺功能亢进者
- D. 精神病生活不能自理者
- E. 产后 8 个月妇女

正确答案:

E

2. 某患儿, 出生 1 天, 诊断为“新生儿窒息”入暖箱治疗。该新生儿室的湿度波动范围应为

- A. 20~30%
- B. 30~40%
- C. 40~50%
- D. 50~60%
- E. 60~70%

正确答案:

D

3. 患者, 女性, 68 岁。诊断为慢性呼吸衰竭, 当天的实验室检查结果, 下列结果提醒需要做进一步核实的是

- A. 血清钾 4.9mmol/L
- B. ALT 45U/L
- C. BUN 9mmol/L
- D. pH 7.48
- E. 红细胞计数 $6.1 \times 10^{12}/L$

正确答案:

D

4. 频发早搏的心律失常患者, 不可饮用浓茶的目的主要是避免 ()

- A. 影响铁的摄入
- B. 过多液体的摄入
- C. 过多咖啡因的摄入
- D. 过多 K⁺的摄入
- E. 过多 Ca²⁺的摄入

正确答案:

C

5. 帕金森病的特征性症状是

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 意识丧失
- D. 静止性震颤
- E. 姿势步态异常

正确答案:

D

6. 某 8 岁患儿, 被诊断为“胆道蛔虫病”, 经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗(每天 1 次)。该患儿服用驱虫药的时间应是

- A.早餐后
- B.午餐前
- C.午餐后
- D.晚餐后
- E.晚上睡前

正确答案:

E

7. 患者男, 57岁。因严重肝病导致昏迷, 呼吸微弱, 浅而慢。护士为其测量呼吸的正确方法是

- A.以 1/4 脉率计算
- B.测脉率后观察胸腹起伏次数
- C.计算所听到的呼吸音的次数
- D.用手感觉呼吸气流通过的次数
- E.用少许棉花置患者鼻孔观察棉花飘过次数

正确答案:

E

8. 患者男, 56岁, 肝硬化腹水, 在放腹水的过程中突然出现昏迷, 首先采取的措施是

- A.吸氧
- B.头部降温
- C.停止放腹水
- D.补充血容量
- E.保持呼吸道通畅

正确答案:

C

9. 患者男, 30岁。阿米巴痢疾, 医嘱: 硫酸巴龙霉素 40—60 万 Upoqid。患者正确的服药时间是

- A.每日 4 次
- B.每次 3 次
- C.每日 2 次
- D.每日 1 次
- E.每 4 小时 1 次

正确答案:

A

10. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A.头晕
- B.皮疹
- C.乏力
- D.便秘
- E.口干

正确答案:

D

11. 患儿女, 1岁。细菌性肺炎入院, 目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱: 吸氧。适宜该患儿的吸氧方式为

- A.单侧鼻导管法
- B.面罩法
- C.鼻塞法

D.漏斗法
E.头罩法
正确答案：
E

12. 患者男性，76岁，因脑血栓导致左侧偏瘫。住院2日后，护士发现其右侧骶尾部皮肤发红，并伴有肿、热、痛，皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤改变为压疮的

A.淤血红润期
B.炎性浸润期
C.浅度溃疡期
D.坏死溃疡期
E.深度溃疡期
正确答案：
A

13. 心室颤动患者的脉搏特征是

A.快而规则
B.慢而规则
C.快而不规则
D.慢而不规则
E.摸不到
正确答案：
E

14. 不利于保持良好护际关系的行为是（）

A.自行其是
B.相互理解
C.相互支持
D.相互配合
E.互尊互学
正确答案：
A

15. 患者女性，35岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽，声音嘶哑，既往患者有风湿热，常有扁桃体炎发资料仅供参考，考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。明确诊断风湿性心脏病二尖瓣狭窄的检查是

A.心电图
B.血管造影
C.超声心动图
D.胸部X片
E.磁共振
正确答案：
C

16. 关于对重症抑郁症病人的健康教育，正确的叙述是

A.建议病人进行自我心里调整为主，用药为辅
B.鼓励安静休息，避免声光刺激
C.生活中回避压力，不要主动挑起对抗
D.尽量减少社会活动，避免受人关注
E.坚持服用药物治疗，不要漏服或随意停药

正确答案：

E

17. 可以动态监测产妇产程进展和识别难产的重要手段是

- A. 胎儿监护
- B. 多普勒听胎心
- C. 产程图
- D. 阴道检查
- E. 肛门检查

正确答案：

C

18. 患者，女性，35岁。1个月来出现外阴瘙痒，检查见外阴充血、肿胀，阴道分泌物无异常。评估诱因时，应重点询问

- A. 饮食习惯
- B. 卫生习惯
- C. 睡眠习惯
- D. 活动习惯
- E. 职业情况

正确答案：

B

19. 1岁小儿，因气管异物窒息入院。治疗中并发脑水肿，遵医嘱使用20%的甘露醇。护士向家长解释使用此药物的作用是

- A. 迅速降颅压，预防脑疝
- B. 预防颅内出血
- C. 预防颅内感染
- D. 促进脑细胞代谢
- E. 兴奋呼吸中枢

正确答案：

A

20. 白血病的主要临床表现有：（）

- A. 贫血，发热，出血，肝、脾和淋巴结肿大
- B. 贫血，出血，肝、脾和淋巴结肿大，肾功能衰竭
- C. 贫血，发热，肝、脾和淋巴结肿大，蛋白尿
- D. 发热，出血，肝、脾和淋巴结肿大
- E. 贫血，乏力，出血，肾功能衰竭

正确答案：

A

21. 患儿，男，3岁。出生后1个月发现心脏杂音，确诊室间隔缺损，近日来，患儿无诱因出现青紫，不喜动，乏力，呼吸急促，心率120次/分，考虑该患儿可能出现

- A. 差异性青紫
- B. 呼吸衰竭
- C. 心力衰竭
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 艾森门格综合征

正确答案：

E

22. 护士进行晨间护理的内容不包括

- A. 协助患者进行口腔护理
- B. 整理床单位
- C. 必要时更换衣服
- D. 发放口服药物
- E. 必要时给予吸痰

正确答案:

D

23. 患者男, 34岁。损伤性气胸。遵医嘱给予胸腔闭式引流, 其引流装置如图所示。目前该装置给予其胸腔施压的压力是

- A. -60cmH₂O
- B. -4 cmH₂O
- C. 0 cmH₂O
- D. -8 cmH₂O
- E. 60cmH₂O

正确答案:

D

24. 深II度烧伤局部损伤的深度达: ()

- A. 表皮层, 生发层健在
- B. 表皮层, 甚至真皮乳头层
- C. 真皮深层, 有皮肤附件残留
- D. 脂肪层
- E. 脂肪下层

正确答案:

C

25. 低钾性 碱中毒 最可能出现于

- A. 尿毒症
- B. 胃手术后
- C. 大量输血
- D. 术后少尿
- E. 严重创伤

正确答案:

B

26. 预防室性 心律失常 的最佳方法是

- A. 适宜的锻炼
- B. 保持情绪稳定
- C. 良好的饮食习惯
- D. 经常进行健康体检
- E. 控制器质性心脏病病情

正确答案:

E

27. 患者男, 30岁。夏天在田地里劳作时, 突然出现头痛、头晕、恶心, 继而出现口渴、胸闷、面色苍白、冷汗淋漓、脉搏细速、血压下降, 后晕倒在地。该患者最可能发生了

- A.急性心肌梗死
- B.脑血管意外
- C.中暑
- D.低血糖休克
- E.农药中毒

正确答案:

C

28. 患者女，64岁。摔倒致右股骨头下骨折。因合并有严重心肺疾病，采取非手术治疗12周后髋部疼痛没有缓解，下肢活动受限，不能站立和行走。首要考虑该患者出现了

- A.关节脱位
- B.关节感染
- C.骨折断端神经损伤
- D.骨折畸形愈合
- E.股骨头缺血性坏死

正确答案:

E

29. 患者女，53岁。患类风湿性关节炎，接受药物治疗，近日因天气变湿冷，手指关节疼痛加重，晨僵可达数小时，同时伴活动障，目前正确的护理措施是

- A.睡前戴手套
- B.晨起冷敷手关节
- C.保持手关节伸展
- D.加大手关节活动度
- E.增加手关节活动量

正确答案:

A

30. 胰腺癌最常见的首发症状是

- A.上腹痛及上腹饱胀不适
- B.黄疸
- C.食欲缺乏
- D.消化不良
- E.乏力消瘦

正确答案:

A

31. 患者女，58岁。直肠癌晚期进行化疗，需定期测血常规。护士再次采血时患者拒绝，并说“我太瘦了，血都快没了，不采了!”此时护士最适宜的回答是()

- A.“您怎么这么不听话啊?采血不是为了你好吗?”
- B.“那您找你主治医生去吧!他若同意不化验就行”
- C.“不采就算了，反正您的血管也不好扎”
- D.“采血是为了监测您的病情，必须得采。”
- E.“采血是为了更好地为您治疗，请您配合好吗?”

正确答案:

E

32. 某患者因上消化道大出血伴休克紧急入院抢救，护士采取的措施中不妥的是

- A.头低足高位

- B. 暂禁食
- C. 建立静脉通路
- D. 迅速交叉配血
- E. 氧气吸入

正确答案：

A

33. 阿尔兹海默病患者出现下列哪项情况时，护士应该高度关注发生走失的风险

- A. 语言啰嗦，反复唠叨
- B. 情绪高涨，言语激动
- C. 情绪紧张，无故攻击他人
- D. 四处徘徊，无目的的走动
- E. 拒绝正确意见，情绪执拗

正确答案：

D

34. 患者女，70岁。急性下壁心肌梗死，收入CCU病房，患者出现下列哪种心律失常最危险？

- A. 窦性心动过速
- B. 偶发性期前收缩
- C. 窦性心律不齐
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 偶发室性期前收缩

正确答案：

D

35. 特发性血小板减少性紫癜的治疗首选：（）

- A. 糖皮质激素
- B. 脾切除
- C. 输新鲜血
- D. 输血小板悬液
- E. 大剂量免疫球蛋白滴注

正确答案：

A

36. 血液病出血倾向的护理措施中，错误的是：（）

- A. 保持衣服柔软
- B. 避免皮肤摩擦
- C. 可行局部冷敷
- D. 高维生素饮食
- E. 深部肌肉注射

正确答案：

E

37. 判断心脏骤停的最主要指征是

- A. 面色苍白
- B. 瞳孔散大
- C. 皮肤发绀
- D. 尿量减少
- E. 大动脉搏动消失

正确答案：

E

38. 目前认为除哪项外，均和白血病发病有关（）

- A. 药物化学因素
- B. 病毒因素
- C. 物理因素
- D. 免疫功能亢进
- E. 遗传因素

正确答案：

C

39. 患者，女性。宫内妊娠 41+周，主诉胎动减少 2 天入院，检查宫底于剑突下 2 指，LOA，先露头，胎心 148 次/分，尚规则，无宫缩，以下首先应采用的处理措施是

- A. B 超
- B. 破 E 膜引产
- C. 急诊剖宫产
- D. 缩宫素点滴引产
- E. 胎心监护 (NST)

正确答案：

E

40. 一位 3 岁患儿患急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，行将出院。其父母觉得小儿虚弱，要求输血。碍于情面医生同意了。可护士为了快点交班，提议给予静脉推注输血。当时患儿哭闹，医护齐动手给她输血过程中，患儿突发心脏骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是

- A. 无知，无原则，违背了有利病人的原则
- B. 无知，无原则，违背了人道主义原则
- C. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了有利病人的原则
- D. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了不伤害病人的原则
- E. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了人道主义原则

正确答案：

D

41. 特殊口腔护理的适应证不包括

- A. 禁食
- B. 高热
- C. 鼻饲
- D. 昏迷
- E. 腹泻

正确答案：

E

42. 右心衰竭患者查体时可出现

- A. 颈静脉怒张
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 交替脉
- D. 心尖区舒张期奔马律
- E. 双肺底湿啰音

正确答案：

A

43. 急性呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是

- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 意识障碍
- D. 肺功能下降
- E. 球结膜水肿

正确答案:

B

44. 患儿男, 10岁, 室间隔缺损, 拟次日行室间隔缺损修补术, 夜间护士巡视病房时发现患儿不肯入睡, 哭诉不想手术, 此时患儿的主要护理问题是:

- A. 活动无耐力
- B. 营养失调: 低于机体需要量
- C. 潜在并发症: 心力衰竭
- D. 有感染的危险
- E. 焦虑/恐惧

正确答案:

E

45. 患者, 男性, 20岁。阑尾炎手术后第4天, 切口红肿、压痛。下列护理措施最关键的是

- A. 继续静脉补液
- B. 做好引流管护理
- C. 及时更换被渗液污染的敷料
- D. 做好生活护理
- E. 康复知识教育

正确答案:

C

46. 某医院有两位等待肾移植的患者, 其中一位患者是25岁青年农民, 因外伤致双肾破裂。另一位患者是因长期肾炎而至肾衰竭的65岁教授。现只有一个可供医务人员进行决策时考虑的标准不包括

- A. 年龄
- B. 预期寿命
- C. 免疫相容性
- D. 身体的整体功能
- E. 患者的社会地位

正确答案:

E

47. 提示左心衰的临床表现是

- A. 奇脉
- B. 平脉
- C. 平脉
- D. 脉搏短绌
- E. 交替脉

正确答案:

E

48. 某孕妇, 30岁, G1P0 孕37周, 羊水过多行羊膜腔穿刺术后为该孕妇腹部放置沙袋的目的是

- A. 减轻疼痛

- 减少出血
- C. 预防休克
- D. 预防血栓形成
- E. 预防感染

正确答案:

C

49. 患者男, 30岁。阿米巴痢疾, 医嘱: 硫酸巴龙霉素 40~60 万 Upoqid。患者正确的服药时间是()。

- A. 每日 4 次
- B. 每日 3 次
- C. 每日 2 次
- D. 每日 1 次
- E. 每 4 小时 1 次

正确答案:

A

50. 患者男性, 60岁。连续 3 天测血压为 140/95 mm Hg。此患者属于

- A. 正常血压
- B. 正常高限
- C. 高血压
- D. 收缩压正常, 舒张压升高
- E. 收缩压升高, 舒张压正常

正确答案:

C

51. 心肺复苏时, 判断及评价呼吸的时间不得超过

- A. 5 秒
- B. 6 秒
- C. 8 秒
- D. 10 秒
- E. 15 秒

正确答案:

D

52. 患者男, 52岁。肾癌行肾部分切除术后 2 天。护士告知患者要绝对卧床休息, 其主要目的是

- A. 防止出血
- B. 防止感染
- C. 防止肿瘤扩散
- D. 防止静脉血栓形成
- E. 有利于肾功能恢复

正确答案:

A

53. 患者男, 65岁, 因“呼吸衰竭”入院, 住院期间应用呼吸兴奋剂。患者出现了何种情况时提示药物过量

- A. 烦躁不安
- B. 面色苍白
- C. 呼吸深快
- D. 四肢湿冷
- E. 高热不退

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/787001130013006160>