

2024 年海南省海棠区《执业药师之西药学专业二》考试题库含答案【能力提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 肾结石患者禁用的药物是()

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 非布索坦
- D: 苯溴马隆

答案：D

2. 甲氧氯普胺治疗呕吐和促胃肠运动的机制是()

- A: 阻断 H
- B: 阻断 CTZ 的 D
- C: 抗幽门螺杆菌
- D: 抑制胃壁细胞的 H

答案：B

3. 不属于普罗帕酮作用特点的是

- A: 无肝首过效应
- B: 适用于室上性和室性心律失常
- C: 属于 I c 类抗心律失常药
- D: 在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高

答案：A

4. 甲状腺危象选用()

- A: 格列本脲
- B: 胰岛素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 二甲双胍

答案：C

5. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 便秘
- B: 躁狂
- C: 胆绞痛
- D: 低血压

答案：D

6. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 阿托品
- C: 氢氧化铝
- D: 奥美拉唑

答案：A

7. 关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

- A: 肾功能不良者禁用
- B: 糖尿病患者慎用
- C: 痛风患者慎用
- D: 可引起低钙血症

答案：D

8. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

A: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每急日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

答案：D

9. 多黏菌素主要作用于

A: 支原体

B: 革兰阳性菌

C: 革兰阴性杆菌

D: 厌氧菌

答案：C

10. （2016 年真题）脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

A: 地西洋

B: 佐匹克隆

C: 异戊巴比妥

D: 阿普唑仑

答案：C

11. （2018 年真题）具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是（）

- A: 普通胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 预混胰岛素注射液

答案：B

12. 利巴韦林最主要的不良反应是

- A: 溶血性贫血
- B: 头痛
- C: 味觉异常
- D: 听力异常

答案：A

13. 皮肤念珠菌病可选用()

- A: 维 A 酸
- B: 酮康唑
- C: 林旦霜
- D: 阿达帕林

答案：B

14. 目前首选的口服减肥药是

- A: 阿法骨化醇
- B: 鲑降钙素
- C: 奥利司他
- D: 阿仑膦酸钠

答案：C

15. 不能阻滞钠通道的抗心律失常药物是()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 利多卡因
- C: 普萘洛尔
- D: 普罗帕酮

答案：C

16. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 头孢类抗生素
- B: 阿司匹林
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 华法林

答案：D

17. 长期大量服用维生素 A 会出现()

- A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案：B

18. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 增加镇痛作用
- B: 增加解痉作用
- C: 防止成瘾
- D: 镇痛和解痉作用

答案：D

19. 下列关于碘苷说法错误的是

- A: 皮肤疾病可长期用药
- B: 可用于疱疹性脑膜炎
- C: 可延缓角膜上皮创伤愈合
- D: 可用于单纯疱疹性角膜炎

答案：A

20. 下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

- A: 甲泼尼龙
- B: 地塞米松
- C: 泼尼松龙
- D: 泼尼松

答案：B

21. 腺苷蛋氨酸作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- B: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：B

22. 重组人促红素的最佳适应证是

- A: 严重再生障碍性贫血
- B: 慢性肾衰竭所致贫血

C: 化疗药物所致贫血

D: 严重缺铁性贫血

答案: B

23. (2020 年真题) 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 联苯苄唑

B: 制霉菌素

C: 阿莫罗芬

D: 特比萘芬

答案: D

24. 下列药物属于第四代头孢菌素的是

A: 头孢吡肟

B: 头孢氨苄

C: 头孢呋辛

D: 头孢噻肟

答案: A

25. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

A: 利多卡因

B: 美西律

C: 维拉帕米

D: 普萘洛尔

答案: C

26. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 泌尿系统感染
- B: 骨质疏松症
- C: 血栓性静脉炎
- D: 血脂异常

答案：C

27. 可使人体对维生素 B

- A: 雌激素
- B: 丙磺舒
- C: 异烟肼
- D: 糖皮质激素

答案：B

28. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 地高辛
- D: 氨氯地平

答案：A

29. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

- A: 头孢克洛
- B: 头孢替安
- C: 头孢哌酮

D: 头孢吡肟

答案：A

30. (2015 年真题) 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用 ()。

A: 碘苷滴眼液

B: 复方托吡卡胺滴眼液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：B

31. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是 ()

A: 孕二烯酮

B: 去氧孕烯

C: 氯地孕酮

D: 左炔诺孕酮

答案：D

32. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是 ()

A: 紫杉醇

B: 伊立替康

C: 多柔比星

D: 长春碱类

答案：B

33. 抑制微管聚合，阻碍纺锤体的形成

A: 长春碱

B: 羟喜树碱

C: 紫杉醇

D: 他莫昔芬

答案: A

34. (2020 年真题) 替罗非班的作用机制是

A: 抑制凝血因子 X

B: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

C: 拮抗维生素 K

D: 抑制凝血酶

答案: B

35. 不能抑制胃酸分泌，可在两餐间和睡眠前服用，不属于治疗消化道溃疡的首选抗酸药物是

A: 枸橼酸铋钾

B: 碳酸氢钠

C: 硫糖铝

D: 法莫替丁

答案: B

36. 利血平与布洛芬合用

A: 首剂量低血压反应

B: 口干、便秘、发热

C: 钠水潴留

D: 降压效应减弱

答案: D

37. 属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A: 黄体酮

- B: 甲地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 米非司酮

答案: D

38. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断药的是 ()

- A: 坎地沙坦
- B: 地尔硫
- C: 阿利克仑
- D: 左旋氨氯地平

答案: A

39. 多库酯钠作为泻药的作用机制是

- A: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- B: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- C: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- D: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案: A

40. 具有强大的抗凝血因子 XA 功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是 ()

- A: 那屈肝素钙

B: 阿加曲班

C: 尿激酶

D: 华法林

答案: A

41. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

A: 静脉滴注奎宁

B: 乙胺嘧啶+磺胺药

C: 咯萘啶或甲氟喹

D: 氯喹+伯氨喹

答案: C

42. 患者，男，56岁。有糖尿病病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl。

A: 静脉注射

B: 皮下注射

C: 舌下含服

D: 口服

答案: A

43. 帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A: 60mg

B: 20mg

C: 100mg

D: 50mg

答案: B

44. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ()

- A: 苯甲酸钠咖啡因
- B: 氟马西尼
- C: 纳洛酮
- D: 阿托品

答案: D

45. 低剂量可提供接近全效的降压作用的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 阿米洛利

答案: A

46. 可致色觉异常的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 硝酸甘油

答案: B

47. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ()

- A: 地特胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案: B

48. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 阿托品滴眼剂
- B: 左氧氟沙星滴眼剂
- C: 氯霉素眼膏
- D: 红霉素眼膏

答案：B

49. 氢氯噻嗪的利尿作用部位在（）

- A: 集合管
- B: 肾小球
- C: 髓袢升支粗段
- D: 远曲小管初段

答案：D

50. 服用伊马替尼的时间是

- A: 餐前 1 小时
- B: 进餐时
- C: 睡前
- D: 餐后 2 小时

答案：B

51. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类正性肌力药是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 米力农
- C: 地高辛
- D: 依那普利

答案：A

52. 恶性贫血可选用

- A: 肝素
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K
- D: 维生素 B

答案：D

53. 螺内酯临床常用于()

- A: 急性肾衰竭
- B: 脑水肿
- C: 醛固酮升高引起的水肿
- D: 尿崩症

答案：C

54. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

- A: 硫酸鱼精蛋白
- B: 维生素
- C: 维生素 K
- D: 氨甲苯酸

答案：A

55. 患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 属于蒽环类抗肿瘤药物
- B: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性

C: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

D: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星

答案: D

56. 用于治疗耐氯喹和耐多种药物虫株所致的恶性疟，也可用于治疗间日疟的药物是

A: 双氢青蒿素

B: 蒿甲醚

C: 奎宁

D: 乙胺嘧啶

答案: C

57. 下述关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是()

A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

B: 可导致皮肤干燥

C: 可分解出新生态氧而发挥作用

D: 为强还原剂，极易分解

答案: D

58. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

A: 应在绝经后 6 年之内开始

B: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

C: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

D: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

答案: D

59. 口服吸收差，血药浓度低，仅适用于肠道感染及下尿路感染的是()

- A: 诺氟沙星
- B: 磺胺嘧啶
- C: 甲氧苄啶
- D: 呋喃唑酮

答案：D

60. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

- A: 普萘洛尔
- B: 阿昔莫司
- C: 胍乙啶
- D: 硝酸甘油

答案：D

61. 可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

- A: 叶酸
- B: 泛酸钙
- C: 烟酸
- D: 维生素 B

答案：C

62. 胰岛素对代谢的作用，叙述错误的是()

- A: 促进糖原合成
- B: 减少酮体生成
- C: 抑制脂肪合成
- D: 抑制糖原分解

答案：C

63. 放线菌素 D 的主要作用环节在

- A: S 期
- B: M 期
- C: G
- D: G

答案: D

64. 红霉素的作用机制是()

- A: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程
- B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- D: 与核糖体 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案: C

65. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 阿莫西林
- C: 氨曲南
- D: 克拉维酸

答案: C

66. 属于低危患者可应用 PDE5 抑制剂的是

- A: 轻度、稳定型心绞痛
- B: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- C: 中度的充血性心力衰竭
- D: 高血压未得到控制者

答案：A

67. 洋地黄中毒可见

- A: 血小板计数减少
- B: 严重低血压
- C: 视物模糊
- D: 色觉异常

答案：D

68. 需尽快建立一个肠道正常菌群，宜用

- A: 酪酸菌
- B: 地芬诺酯
- C: 双歧三联活菌胶囊
- D: 双歧杆菌

答案：C

69. 属于钙通道阻滞剂，静脉注射用于终止阵发性室上性心动过速的是
()

- A: 维拉帕米
- B: 苯妥英钠
- C: 利多卡因
- D: 普鲁卡因胺

答案：A

70. 属于第二代头孢菌素口服制剂的是()。

- A: 头孢克洛
- B: 头孢拉定
- C: 头孢克肟

D: 头孢吡肟

答案：A

71. 可减弱吲达帕胺降压作用的是

A: 考来烯胺

B: 多巴胺

C: 胺碘酮

D: 拟交感药

答案：D

72. 与长春新碱合用可增强神经毒性

A: 替尼泊苷

B: 非格司亭

C: 铂类

D: 异烟肼

答案：A

73. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 阿瑞吡坦

B: 甲氧氯普胺

C: 格雷司琼

D: 甲地孕酮

答案：C

74. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

- B: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：A

75. (2019 年真题) 患者，男，30 岁，有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是 ()

- A: 氢氧化铝
B: 雷贝拉唑
C: 西咪替丁
D: 奥美拉唑

答案：A

76. 通过抑制 GABA 转移酶而达到抗癫痫作用的药物是

- A: 二苯并氮革类
B: 乙内酰脲类
C: γ -氨基丁酸类似物
D: 脂肪酸类

答案：C

77. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
B: 紫杉醇
C: 巯嘌呤
D: 吉非替尼

答案：A

78. 黄体酮属于

- A: 皮质激素
- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 雄性激素

答案：B

79. 可用于防治夜盲症的维生素是()

- A: 维生素 A
- B: 叶酸
- C: 维生素 K
- D: 维生素 B

答案：A

80. (2016 年真题) 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 头孢氨苄
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 青霉素 G

答案：B

81. 患者已经使用利尿剂治疗高血压，医生欲开始使用福辛普利，应该

- A: 开始用福辛普利前停用利尿剂 2~3 日
- B: 开始用福辛普利前停用利尿剂 5~7 日
- C: 直接换用福辛普利即可
- D: 直接加用福辛普利即可

答案：A

82. 天然的雌激素是()

- A: 戊酸雌二醇
- B: 炔雌醚
- C: 雌二醇
- D: 黄体酮

答案: C

83. 用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

- A: 维拉帕米
- B: 苯妥英钠
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案: A

84. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是()

- A: 阿莫西林
- B: 兴孢他啶
- C: 林可霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案: D

85. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。下列关于氟尿嘧啶的说法中错误的是()

- A: 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂
- B: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/787033054051010024>