

同等学力申硕-临床病理学-系统病理学--消化系统疾病(A型题 4)

[单选题]1. 下述哪项支持胃的恶性溃疡

- A. 溃疡呈圆形，椭圆形
- B. 边缘整齐，不隆起
- C. 底部较平坦
- D. 火山口状，底部凹凸不平
- E. 皱襞向溃疡（江南博哥）集中

正确答案：D

[单选题]2. 以活性形式存在于胰腺内的酶是

- A. 淀粉酶
- B. 蛋白酶
- C. 磷脂酶 A
- D. 弹力纤维酶
- E. 胰舒血管素

正确答案：A

[单选题]3. 幽门螺杆菌（Hp）的主要传播途径为

- A. 空气传播
- B. 血液传播
- C. 粪口传播
- D. 母婴传播
- E. 以上都是

正确答案：C

[单选题]4. 正常人胃食管反流的特点，下列哪一项是对的

- A. 多发生在夜间
- B. 白天罕见
- C. 餐时或餐后多发
- D. 反流总时间大于 1 小时 / 24 小时
- E. 以上都不对

正确答案：C

[单选题]5. 反流性食管炎的主要特征性症状为

- A. 上腹隐痛
- B. 消化不良，腹部不适
- C. 服用抗酸剂无效
- D. 进行性吞咽困难
- E. 胸骨后烧灼感

正确答案：E

[单选题]6. 关于促胰液素的作用，下列哪项是错误的

- A. 促进肝胆汁分泌

- B. 促进胰液分泌
- C. 促进胃运动
- D. 促进胰腺分泌 HCO_3^-
- E. 促进小肠液分泌

正确答案：C

[单选题]7. 下列哪一项不符合重度溃疡性结肠炎

- A. 腹泻每日小于 5 次
- B. 体温达 37.7°C 以上至少持续 2 天
- C. 血红蛋白小于 75g/L
- D. 血沉大于 30mm/第 1 小时
- E. 血清白蛋白小于 30g/L

正确答案：A

[单选题]8. 治疗消化性溃疡时应用下列何种药物抑制胃酸和胃蛋白酶分泌最有效

- A. 质子泵抑制剂
- B. H_2 受体拮抗剂
- C. M 胆碱能受体阻滞剂
- D. 促胃液素受体拮抗剂
- E. 胃酸中和剂

正确答案：A

[单选题]9. 女，40 岁，腹泻 3 个月，粪便量多，含大量脂肪及泡沫，奇臭，应考虑为

- A. 慢性萎缩性胃炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 慢性细菌性痢疾
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 肠易激综合征

正确答案：B

[单选题]10. 患有幽门螺杆菌相关性胃炎的病人，给予哪种抗生素最适宜

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 先锋霉素IV
- E. 羟氨苄青霉素

正确答案：E

[单选题]11. 关于胆汁的生理作用，下列哪项是错误的

- A. 胆盐、胆固醇和磷脂酰胆碱（卵磷脂）都可乳化脂肪
- B. 胆汁酸可与脂肪酸结合，促进脂肪酸的吸收

- C. 胆汁可促进脂溶性维生素的吸收
- D. 胆汁中的消化酶可促进脂肪的消化
- E. 胆汁在十二指肠可中和一部分胃酸

正确答案：D

[单选题]12. 女性，50岁，因上腹部不适，腹胀、纳差、反酸、暖气行胃镜检查，镜下见大量胆汁流入胃腔，应选用下列哪种药物治疗最合适

- A. 法莫替丁
- B. 雷尼替丁
- C. 多潘立酮
- D. 胃舒平
- E. 654-2

正确答案：C

[单选题]13. 对肝炎后肝硬化的诊断下列哪项最有价值

- A. 脾肿大
- B. 蜘蛛痣
- C. 肝功能不正常
- D. B超示肝内回声不均匀
- E. 肝组织活检见假小叶形成

正确答案：E

[单选题]14. 判断胃酸缺乏最可靠的指标是

- A. 呕吐物无酸
- B. 空腹胃液 pH 为 7
- C. BAO 为 0
- D. MAO 为 0
- E. 空腹胃液中游离酸为 0

正确答案：D

[单选题]15. 男性患者，酒宴后出现上腹部剧烈疼痛，呕吐，可能是

- A. 胰腺炎
- B. 脾破裂
- C. 病毒性肝炎
- D. 结核型腹膜炎
- E. 细菌性痢疾

正确答案：A

[单选题]16. 现在认为下列哪项最不可能引起溃疡性结肠炎

- A. 结肠的感染
- B. 免疫异常
- C. 氧自由基损伤
- D. 遗传因素

E. 过敏反应

正确答案：E

[单选题]17. 肝癌实验室检查项目中，诊断意义最大的是

- A. 癌胚抗原
- B. γ -谷氨酰转肽酶
- C. 甲胎蛋白
- D. 碱性磷酸酶
- E. 乳酸脱氢酶同工酶

正确答案：C

[单选题]18. 在多数病人中，哪一种物质是反流性食管炎的主要原因

- A. 胆汁
- B. 胃酸
- C. 胰液
- D. 胃内物质
- E. 以上都不是

正确答案：B

[单选题]19. 男性，50岁，上腹不适，食欲不振三个月。一个月来出现黄疸进行性加重，有体重减轻，全身明显黄染，肝未触及，深吸气时可触到肿大胆囊底部，无触痛。化验血胆红素 $256.5 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)，尿检胆红素阳性。最可能是

- A. 肝炎
- B. 胆石症
- C. 胰头癌
- D. 慢性胰腺炎
- E. 肝癌

正确答案：C

[单选题]20. 原发性肝癌的发生与下列哪种因素最有关

- A. 肠道戊型肝炎病毒感染
- B. 肠道寄生虫感染
- C. 肠道细菌感染
- D. 黄曲霉毒素污染
- E. 酒精中毒

正确答案：D

[单选题]21. 关于食管下括约肌的叙述，下列哪项是错误的

- A. 该部位平滑肌增厚
- B. 正常人休息时食管下括约肌压力为 $10\sim 30\text{mmHg}$
- C. 食管下括约肌长约 $2\sim 4\text{cm}$
- D. 促胃液素可刺激其收缩

E. 可防止胃内容物逆流入食管

正确答案：A

[单选题]22. 女性 28 岁，右下腹痛、腹泻伴关节酸痛，低热半年，查体心肺正常，腹软，右下腹触及可疑肿块，X 线钡餐检查显示回盲部有钡影跳跃征象，最可能的诊断是

- A. Crohn 病
- B. 肠结核
- C. 阿米巴痢疾
- D. 右半结肠癌
- E. 溃疡性结肠炎

正确答案：B

[单选题]23. 消化道出血出现黑便时，出血量不少于

- A. 10ml
- B. 20ml
- C. 30ml
- D. 50ml
- E. 100ml

正确答案：D

[单选题]24. 下述哪项支持门脉性肝硬化

- A. 结节大小相仿，纤维分隔薄而均匀
- B. 结节大小不等，纤维分隔厚薄不均
- C. 肝脏呈细颗粒状，深绿色
- D. 树枝状纤维组织将肝脏分割为粗大结节
- E. 肝内散在多个大结节

正确答案：A

[单选题]25. 上消化道出血不包括下列哪项病变引起的出血

- A. 十二指肠出血
- B. 胃出血
- C. 胃空肠吻合术后的空肠病变出血
- D. 回肠出血
- E. 胰胆病变引起的出血

正确答案：D

[单选题]26. 关于溃疡性结肠炎的叙述中，下列哪项不是此病的典型表现

- A. 本病的病理特点是结肠粘膜有广泛的溃疡形成
- B. 最常受累的部位是升结肠和回肠末端
- C. 主要症状是腹泻，带有脓血及粘液
- D. 钡剂灌肠和纤维结肠镜是最有价值的检查
- E. 症状反复发作，久治不愈者癌变率高

正确答案：B

[单选题]27. 溃疡性结肠炎患者腹痛、腹泻明显时，应用 M 胆碱受体阻断药剂量过大，可能引起下列哪项并发症

- A. 机械性肠梗阻
- B. 肠穿孔
- C. 中毒性结肠扩张
- D. 结肠大出血
- E. 以上均不是

正确答案：C

[单选题]28. 下述哪项是恶性肿瘤最具特征的变化

- A. 出血坏死
- B. 浸润
- C. 转移
- D. 细胞多形性
- E. 生长迅速

正确答案：C

[单选题]29. 关于门脉高压症，哪项叙述是错误的

- A. 脾大，脾功能亢进，消化道出血和腹水是主要临床表现
- B. 脾功能亢进时都有血细胞减少，以白细胞和血小板改变明显
- C. 外科治疗的主要目的是制止食管胃底静脉曲张破裂所致的大出血
- D. 分流手术主要是阻断门奇静脉间的反常血流
- E. 腹腔-静脉转流术可治疗肝硬化引起的顽固性腹水

正确答案：D

[单选题]30. 肠结核的最常见感染途径是

- A. 直接蔓延
- B. 血行播散
- C. 经淋巴扩散
- D. 经口感染
- E. 以上都不是

正确答案：D

[单选题]31. 上消化道出血的临床表现不包括下列哪项

- A. 呕血
- B. 黑便
- C. 发热
- D. 心率变慢
- E. 氮质血症

正确答案：D

[单选题]32. 在肠结核的治疗中，下列哪一项不正确

- A. 为使病人早日康复，防止耐药性的产生，目前多采用长程抗结核治疗
- B. 一般用异烟肼与利福平二种杀菌药联合
- C. 治疗开始 1~2 周即有症状改善
- D. 腹痛可用抗胆碱能药物
- E. 伴完全肠梗阻者应手术治疗

正确答案：A

[单选题]33. 男，50 岁，有慢性肝炎病史，近日出现黄疸，化验血甲胎蛋白阳性，应高度警惕

- A. 胆囊炎
- B. 胰腺炎
- C. 慢性胃炎
- D. 肺癌
- E. 肝癌

正确答案：E

[单选题]34. 结核性腹膜炎的抗结核治疗，下列哪项不正确

- A. 其疗效一般比溃疡型肠结核略好
- B. 粘连型合并渗出者，病变不易控制
- C. 一般用 3 至 4 种药物联合强化治疗
- D. 继发于体内其他结核病的病人，临床多选用以往未用或少用药物
- E. 有血行播散或严重结核毒性症状者，可短期加用肾上腺糖皮质激素

正确答案：A

[单选题]35. 目前认为与溃疡性结肠炎的病因无关的是

- A. 感染因素
- B. 遗传因素
- C. 精神因素
- D. 过敏因素
- E. 免疫因素

正确答案：D

[单选题]36. 氨在血中主要是以下列哪种形式运输的

- A. 谷氨酸
- B. 天冬氨酸
- C. 谷氨酰胺
- D. 门冬氨酸
- E. 谷胱甘肽

正确答案：C

[单选题]37. 上消化道大出血伴休克时，最紧急和首要的措施应为

- A. 头低位和吸氧
- B. 积极补充血容量

- C. 去甲肾上腺素胃内滴入
- D. 紧急胃镜检查以明确诊断
- E. 胃内冰水洗胃止血

正确答案：B

[单选题]38. 慢性胃炎的感染因素中，目前认为最重要的细菌为

- A. 沙门菌
- B. 副溶血弧菌
- C. 大肠杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 幽门螺杆菌

正确答案：E

[单选题]39. 肝性脑病的脑性毒物中，下列哪项不正确

- A. 氨
- B. 精氨酸
- C. γ -氨基丁酸
- D. 苯丙氨酸
- E. 色氨酸

正确答案：B

[单选题]40. 急性出血坏死型胰腺炎的特征是

- A. 上腹痛向左腰背部放射
- B. 腹式呼吸增强
- C. 脐周皮肤出现青紫
- D. 肠鸣音亢进
- E. 无明显腹膜刺激征

正确答案：C

[单选题]41. 出血坏死型胰腺炎时的 Cullen 征是指

- A. 胁腹部皮肤呈灰紫色斑
- B. 脐周皮肤呈灰紫色斑
- C. 胁腹皮肤青紫
- D. 脐周围皮肤青紫
- E. 脐周皮肤红斑

正确答案：D

[单选题]42. 下列疾病好发部位描述中错误的是

- A. 慢性胃溃疡—胃窦及移行部
- B. 十二指肠溃疡—十二指肠起始部
- C. 伤寒—回肠上段
- D. 细菌性痢疾—大肠下段
- E. 阿米巴痢疾—结肠上段

正确答案：C

[单选题]43. 血清淀粉酶在发病后开始升高的时间是

- A. 3~4h
- B. 6~8h
- C. 10~12h
- D. 16~20h
- E. 24h

正确答案：B

[单选题]44. 呕血伴黄疸，多见于下列哪种疾病

- A. 食管炎
- B. 食管癌
- C. 肝硬化
- D. 十二指肠溃疡
- E. 胃粘膜脱垂

正确答案：C

[单选题]45. 血清中抗线粒体抗体阳性多见于下列哪项

- A. 病毒性肝炎肝硬化
- B. 酒精性肝硬化
- C. 血吸虫病性肝硬化
- D. 原发性胆汁性肝硬化
- E. 淤血性肝硬化

正确答案：D

[单选题]46. 克罗恩（Crohn）病最常见的并发症是

- A. 腹腔内脓肿
- B. 吸收不良综合征
- C. 肠梗阻
- D. 大量便血
- E. 发生癌变

正确答案：C

[单选题]47. 出血坏死性胰腺炎最常见的并发症是

- A. 化脓性腹膜炎
- B. 败血症
- C. 消化道出血
- D. 胰周围脓肿
- E. 休克

正确答案：E

[单选题]48. 男，20岁，间断性上腹部疼痛、反酸、烧心2年，解柏油样便1天，未呕血，可能为

- A. 食管静脉曲张
- B. 食管贲门粘膜撕裂
- C. 胃下垂
- D. 十二指肠球部溃疡
- E. 食管炎

正确答案：D

[单选题]49. 出血坏死型与水肿型胰腺炎不同的化验结果是

- A. 血清淀粉酶升高
- B. 血白细胞升高
- C. 血清脂肪酶升高
- D. 血清胆红素升高
- E. 血清正铁血红蛋白阳性

正确答案：E

[单选题]50. 下列哪种物质可使食管下端括约肌（LES）舒张

- A. 前列腺素 E1
- B. 促胃液素
- C. 胃动素
- D. P 物质
- E. 蛙皮素

正确答案：A

[单选题]51. 男，50岁，呕血伴肝肿大，血液化验甲胎蛋白（AFP）阳性，可能为

- A. 食管贲门粘膜撕裂
- B. 胃粘膜脱垂
- C. 肝癌
- D. 胃癌
- E. 胃溃疡

正确答案：C

[单选题]52. 下列哪项不是肝昏迷的常见诱因

- A. 上消化道出血
- B. 强利尿剂
- C. 外科手术
- D. 高血钾
- E. 便秘

正确答案：D

[单选题]53. 肝硬化腹水患者，应首选的利尿剂为

- A. 甘露醇
- B. 利尿酸钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/787043065114006154>