专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖北省石首市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库附答案【达标题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近3个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

A: 糖化血红蛋白

B: 空腹血糖

C: 尿胆红素

D: 餐后2小时血糖

答案：A

2.患者，女性，25岁，因面色苍白、头晕、乏力1年余，加重伴心悸1个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 右旋糖酐铁

B: 葡萄糖酸亚铁

C: 琥珀酸亚铁

D: 叶酸

答案：D

3.辛伐他汀

A: 宜餐后服用

B: 宜睡前服用

C: 宜餐前服用

D: 宜清晨服用

答案：B

4.医生开具处方，必须使用药品的名称是

A：药品习用名

B：药品通用名

C：药品化学名

D：药品商标名

答案：B

5.以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

A：四环素同服硫酸亚铁降低疗效

B：维生素C与多潘立酮同服吸收减少

C：昆布片同服异烟肼导致药效降低

D：氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

答案：D

6.季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

A：冷

B：花粉

C：热

D：光线

答案：B

7.可导致体重增加的抗癫痫药是

A：丙戊酸钠

B：拉莫三嗪

C：卡马西平

D：苯妥英钠

答案：A

8.患者，男，55岁，因支气管哮喘使用倍氯米松-福莫特罗干粉吸入剂治疗，症状控制良好，5个月内无急性发作，拟进行降级治疗。关于哮喘降级治疗原则的说法，错误的是

A: 通常每3个月减少倍氯米松剂量25%～50%

B: 首先降低激素剂量，再减少使用频率

C: 降级治疗应选择适当时机，需避开患者呼吸道感染等情况

D: 以最低剂量的福莫特罗维持治疗，直到最终停药

答案：D

9.需要在服药时多饮水的药物不包括

A: 抗痛风药

B: 氨基糖苷类抗生素

C: 降糖药

D: 平喘药

答案：C

10.以下所列物质中，一旦误服中毒，忌用硫酸镁导泻的是

A: 香豆素类灭鼠药

B: 磷化锌等灭鼠药

C: 拟除虫菊酯类杀虫药

D: 有机氮类杀虫药

答案：B

11.服药期间进食高脂肪可促进吸收的药品是

A: 西咪替丁

B: 格列本脲

C: 硫酸亚铁

D: 维生素

答案：D

12.患者，男，65岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙600mg。药师为其推荐碳酸钙(0. 5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

A: 4片qd

B: 1片tid

C: 2片tid

D: 6片qd

答案：B

13.正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为()：

A: 2.2～5.1mmol/L

B: 3.2～7.1mmol/L

C: 1.8～6.5mmol/L

D: 3.8～6.1mmol/L

答案：B

14.过敏性鼻炎应首选的口服药是

A: 赛庚啶

B: 氯苯那敏

C: 泮托拉唑

D: 氯雷他定

答案：D

15.护士用药咨询的内容是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B：不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

C：栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

D：抗菌药物的合理使用

答案：B

16.下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法，错误的是

A：避免使用含碘药物

B：禁食富含碘的食物

C：哺乳期伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑

D：避免饮用咖啡等兴奋性饮料

答案：C

17.以下咨询问题的分类属于用药方法的是

A：中午忘吃药了怎么办

B：这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗

C：这药能治我这种病吗

D：这种药需要服用多久

答案：A

18.用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A：乙胺丁醇

B：利福平

C：吡嗪酰胺

D：链霉素

答案：A

19.下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A：苯妥英钠

B: 普鲁卡因胺

C: 普萘洛尔

D: 阿托品

答案：A

20.属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 美沙酮

C: 二氢可待因

D: 谷维素

答案：C

21.能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 真菌

B: 上皮细胞

C: 吞噬细胞增多

D: 红细胞

答案：A

22.某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 脱水

B: 降血压

C: 扩容

D: 止血

答案：A

23.（2019年真题）下列药物中，使用前无需皮试的是

A：抑肽酶注射剂

B：紫杉醇注射剂

C：苄星青霉素注射剂

D：抗狂犬病血清注射剂

答案：B

24.下列疾病中，WHO视为艾滋病最常见的机会性感染的是

A：卡氏肉瘤

B：结核病

C：肺炎

D：腹泻

答案：B

25.用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

A：卡巴拉汀

B：加兰他敏

C：美金刚

D：多奈哌齐

答案：C

26.在审核处方用药适宜性时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列联用药物中有潜在不良相互作用的是

A：阿莫西林和克拉维酸钾

B：苄丝肼和左旋多巴

C：甲氧氯普胺和氯丙嗪

D：头孢哌酮和舒巴坦

答案：C

27.影响核酸合成的药物

A: 依托泊苷

B: 放线菌

C: 顺铂

D: 培美曲塞

答案：D

28.患者李某，男，45岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为160／100mmHg。

A: ACEI

B: β 受体阻断剂

C: 利尿剂

D: AR

答案：A

29.针对单纯性酒精中毒严重患者，下列救治措施，错误的是

A: 静脉注射5%葡萄糖注射液100ml和胰岛素20U

B: 肌内注射维生素B1.维生素B6和烟酸各100mg

C: 静脉注射纳洛酮0.4mg

D: 适当补充维生素C

答案：A

30.患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素C

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 B12

答案：C

31.以下关于抑郁症的介绍错误的是

A: 抑郁症的好发年龄在 20～50 岁

B: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

C: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点

D: 抑郁症的病因明确

答案：D

32.用药时须与食物同服的增强认知功能药物为（）

A: 苯海索

B: 加兰他敏

C: 卡巴拉汀

D: 多奈哌齐

答案：C

33.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

A: 清晨服抗抑郁药

B: 清晨服氨基糖苷类

C: 清晨服利尿药

D: 清晨服糖皮质激素

答案：C

34.下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是

A: 肌酸激酶增高

B: 尿淀粉酶

C: 淀粉酶增高

D: 血淀粉酶

答案：A

35.女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g／L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×109／L，血小板 120×109／L，血清铁 300μg／L。

A: 右旋糖酐铁肌注

B: 维生素 B12 肌内注射

C: 输血

D: 硫酸亚铁口服

答案：D

36.患者，男，57 岁,因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是()

A: 金刚烷胺

B: 奥司他韦

C: 利巴韦林

D: 金刚乙胺

答案：B

37.常见老年人 ADR 的药物类别,阿托品、苯海索等致尿潴留

A: β 受体阻断剂

B: 抗生素

C: 钙通道阻滞剂

D: 抗胆碱药

答案：D

38.（2017年真题）高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于（）

A: 胃溃疡患者

B: 心力衰竭患者

C: 痛风患者

D: 双侧肾动脉狭窄患者

答案：C

39.含马兜铃酸的中药可导致

A: 直接肾毒性

B: 肾间质纤维化

C: 肾小管阻塞

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

40.使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

A: 60mgbid

B: 60mgtid

C: 100mg/次

D: 60mgqd

答案：B

41.口服避孕药妇女所致心肌梗死，在吸烟人群中危险性加大

A: 药物制剂因素

B: 生理因素

C: 药物的使用

D: 生活和饮食习惯

答案：D

42.尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液1000～3000ml。其中97%为水分，而在3%的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣管型

C: 尿沉渣磷酸盐

D: 尿沉渣结晶

答案：B

43.患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg—天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h—次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8°C，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数18.5X109/L（参考值4.0X09/L10.0X09/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质

B: 首选口服补液，必要时静脉补液

C: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

答案：D

44.患者男,78岁实施右侧髋关节置换术,术后第10日,患侧下肢出现肿胀、疼痛,诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是（）

A: 阿司匹林

B: 氯吡格雷

C: 血凝酶

D: 依诺肝素

答案：D

45.脑出血的内科治疗最重要的是

A: 降低血压

B: 控制脑水肿

C: 抗生素治疗

D: 给予止血剂

答案：B

46.肾衰竭者

A: 不能催吐

B: 禁止洗胃

C: 不能用强利尿剂

D: 不能导泻

答案：C

47.可引起血红蛋白减少的疾病为

A: 糖尿病

B: 胃溃疡

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：B

48.血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A: 男性 11～50U/L

B: 成人<50U/L

C：成人<40U/L

D：男性<40U/L

答案：C

49.属于5α还原酶抑制剂的是

A：氟他胺

B：普适泰

C：依立雄胺

D：雌三醇

答案：C

50.某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：尽快补服一片,然后在常规时间继续服药

B：尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

C：不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

D：到21日20:00再同时服用两片药,然后在常规时间继续服药

答案：A

51.是目前治疗ED的首选疗法的药物为

A：RAAS拮抗剂

B：PDE-5抑制剂

C：克罗米芬

D：AR

答案：B

52.麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

A：患者姓名、性别

B：临床诊断

C：患者身份证明编号

D：药品名称、剂型、规格、数量

答案：C

53.可加重损伤精神运动功能的是

A：异丙嗪

B：氯苯那敏

C：地西泮

D：H

答案：C

54.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别。头孢曲松属于()

A：D级

B：C级

C：A级

D：B级

答案：D

55.属于整合酶链转移抑制剂的抗HIV药物是

A：替诺福韦

B：拉替拉韦

C：阿德福韦

D：利托那韦

答案：B

56.消化性溃疡抗H.pylori的四联疗法使用疗程为（）

A: 10日或14日

B: 6～8周

C: 8～12周

D: 4～6周

答案：A

57.有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

A: 双歧杆菌

B: 干酵母

C: 比沙可啶

D: 硫酸镁

答案：C

58.患者，男，56岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 恩替卡韦

B: 利巴韦林

C: 阿昔洛韦

D: 奥司他韦

答案：C

59.致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

A: 注意定期监测器官功能

B: 注意药物的迟发反应

C: 注意特殊人群用药

D: 了解患者及家族的过敏史

答案：B

60.可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

A：过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

B：胃溃疡

C：糖尿病

D：肾移植术后发生排斥反应

答案：A

61.可提示完全梗阻性黄疸的是

A：>342μmol/L

B：17.1μmol/L～34.2μmol/L

C：34.2μmol/L～171μmol/L

D：17.1μmol/L～171μmol/L

答案：A

62.药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

A：过度治疗用药

B：无适应证用药

C：有禁忌证用药

D：联合用药

答案：D

63.新生儿白细胞计数的正常范围值

A：（11.0～12.0）×109/L

B：（15.0～20.0）×109/L

C：（3.5～10.0）×109/L

D: （10.0～20.0）×109/L

答案：B

64.患者，女，51岁，体检时发现血压160／105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9．56mmol／L、甘油三酯1．52mmol／L(正常参考区间0．56～1．70mmol／L)、总胆固醇6．26mmol／L(正常参考区间<5．2mmol／L)、低密度脂蛋白胆固醇4．85mmol／L(正常参考区间2．1～3．1mmol／L)、高密度脂蛋白胆固醇1．2mmol／L(正常参考区间1．2～1．65mmol／L)、血肌酐50t．Lmol／L(正常参考区间45～84μmol／L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 复方利血平

B: 依那普利

C: 氢氯噻嗪

D: 特拉唑嗪

答案：B

65.痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A: 秋水仙碱

B: 阿司匹林

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：C

66.关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（）

A: 儿重内分泌系统不够稳定，长期使用糠皮质激表易导致发育迟缓

B: 儿重血脑界跑不完着，多种药物均能通过，有可能引发不良反应

C：婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高

D：和成人相比，婴儿胃液PH低,对酸不稳定的药物易被破

答案：D

67.利尿降压药

A：氢氯噻嗪

B：缬沙坦

C：氨氯地平

D：依那普利

答案：A

68.药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

A：卡托普利

B：氯苯那敏

C：氟西汀

D：铋制剂

答案：C

69.在骨性关节炎治疗中，为减轻胃肠道反应，可选用的选择性COX-2抑制剂是

A：吲哚美辛

B：塞来昔布

C：萘普生

D：双氯芬酸

答案：B

70.在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

A：苯妥英钠

B：氯化钾

C：青霉素

D：红霉素

答案：D

71.药师在知道合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法，下列交代的内容错误的是：

A：活菌制剂不能超过40℃的水送服

B：泡腾片是可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

C：肠溶片要整体吞服，不易咀嚼服用

D：栓剂是外用制剂，不可口服

答案：B

72.患者，男，67岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续1个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A：吗啡

B：布洛芬

C：山莨菪碱

D：加巴喷丁

答案：D

73.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A: 超适应证用药

B: 无适应证用药

C: 处方应写商品名

D: 门诊处方所开剂量不能超过 7 日用量

答案：D

74.易经乳汁分泌的药物的特征是：

A: 弱酸性?

B: 蛋白结合率高?

C: 分子量大?

D: 脂溶性大?

答案：D

75.下列药物属于容积性泻药的是

A: 聚乙二醇

B: 多库酯

C: 欧车前

D: 乳果糖

答案：C

76.患者，男，22 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃。经实验室和 X 线胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是

A: 亚胺培南-西司他丁

B: 阿莫西林

C: 阿米卡星

D: 阿奇霉素

答案：B

77.目前，临床用药的单剂量药盒主要应用于

A：住院患者

B：家庭患者

C：门诊患者

D：自购药品患者

答案：A

78.药学服务的对象

A：医务人员

B：护理人员

C：血液透析者

D：广大公众

答案：D

79.（2019年真题）患者，女，35岁，复杂部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A：丙戊酸钠的不良反应

B：糖尿病病情进展

C：卡马西平的不良反应

D：停用了苯妥英钠

答案：A

80.患者，女性，25岁，因面色苍白、头晕、乏力1年余，加重伴心悸1个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 餐前

B: 两餐间

C: 餐后

D: 睡前

答案：C

81.患者，男，56岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA≥20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素α和核苷（酸）类抗病毒药物。

A: 替比夫定

B: 恩替卡韦

C: 拉米夫定

D: 阿德福韦

答案：B

82.患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0~10×109/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 洛哌丁胺?

B: 药用炭?

C: 鞣酸蛋白?

D: 小檗碱?

答案：A

83.经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 一般无须调整剂量

B: 尽可能避免使用

C: 必须减量应用

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：A

84.处方中外文缩写OS代表()

A: 双眼

B: 左耳

C: 左眼

D: 右耳

答案：C

85.下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

A: 炉甘石

B: 氧化锌

C: 滑石粉

D: 硼酸

答案：D

86.大量长期应用可导致老年人肠道菌群失调或真菌感染并发症的药物是

A: 降糖药

B: 抗过敏药

C：广谱抗生素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/788046071043007022