

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

口腔医学练习题库含答案

1、患者,女,32岁。左上后牙进食痛3月,平时热饮痛。查|6龋深,探硬,不敏感,叩痛(+),冷测迟钝。该患牙诊断最可能是()。

- A、深龋
- B、牙髓坏死
- C、急性牙髓炎
- D、慢性牙髓炎
- E、可复性牙髓炎

答案: D

2、某患者面部遭受外力打击后,未形成开放性创口,局部肿胀、疼痛和皮下淤血,X线检查未见颌骨骨折。临床诊断为()。

- A、撕裂伤
- B、挫裂伤
- C、挫伤
- D、擦伤
- E、撕脱伤

答案: C

3、关于感染性休克患者应用糖皮质激素的依据与方法,不正确的是()。

- A、糖皮质激素可以稳定细胞及溶酶体膜,免受内毒素破坏
- B、大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用
- C、适当应用糖皮质激素可以减少并发症
- D、糖皮质激素应从大剂量开始
- E、要取得疗效至少要使用5天

答案: E

4、下列哪项不是 Sjögren 综合症的病理变化?()

- A、淋巴细胞灶状浸润
- B、病变从小叶中心开始
- C、小叶内腺泡全部消失
- D、小叶内导管的导管上皮增生
- E、小叶轮廓保留

答案: A

5、下列治疗军团菌病的首选药物是()。

- A、红霉素
- B、四环素
- C、头孢唑林

D、青霉素 G

E、氯霉素

答案: A

6、为消除可摘局部义齿不稳定, 错误的方法是()。

A、增加对抗平衡固位体

B、尽力设计黏膜支持式义齿, 以避免产生支点

C、在支点或支点线的对侧加平衡力

D、消除颌支托, 卡环在余留牙上形成的支点

E、消除基托下与组织形成的支点

答案: B

7、患者 2 周前因 龋洞在外院做银汞合金充填。术后遇冷敏感症状加重, 叩痛(+), 近日有阵发性自发痛, 昨晚因疼痛难以入眠。诊断最可能为()。

A、继发龋

B、牙髓坏死

C、急性牙髓炎

D、慢性牙髓炎

E、可复性牙髓炎

答案: C

8、患者, 女, 31 岁。反复发作性干咳伴胸闷 3 年, 多于春季发作, 无发热、咯血及夜间阵发性呼吸困难, 多次胸片检查无异常, 常用抗生素治疗效果不明显。无高血压病史。全身体检无阳性体征。为明确诊断首选的检查是()。

A、胸部 CT

B、心脏超声波

C、支气管激发试验

D、动脉血气分析

E、纤维支气管镜

答案: C

9、患者, 男, 70 岁, 20 年前有黄疸、纳差, 诊断为肝炎。近二月来纳差、消瘦, 肝区疼痛。查体: 轻度黄疸, 面部有蜘蛛痣, 腹膨隆, 肝肋下 2cm、剑下 4cm。质硬、压痛。脾肋下 3cm, 移动性浊音阳性。临床上应首先考虑的是()。

A、肝硬化

B、慢性肝炎

C、原发性肝癌

D、继发性肝癌

E、结核性腹膜炎

答案: C

10、患者,男,35岁。右下颌第一磨牙全冠修复体永久粘固后2周,主诉咬合痛,其可能原因是()。

- A、继发龋
- B、创伤
- C、牙龈炎
- D、牙周炎
- E、牙髓充血

答案: B

11、对牙周组织破坏最大的力因素是()。

- A、垂直向力过大
- B、侧向力过大
- C、扭力过大
- D、精力小均匀
- E、牙周支持力不足

答案: C

12、在下列方法中,属于精神分析治疗常用的是()。

- A、系统脱敏
- B、厌恶治疗
- C、患者中心
- D、催眠治疗
- E、自由联想

答案: E

13、糖酵解的关键酶是()。

- A、丙酮酸羧化酶
- B、己糖激酶
- C、果糖二磷酸酶
- D、葡萄糖-6-磷酸酶
- E、磷酸化酶

答案: B

14、属于点角的是()。

- A、中切牙的近中切角
- B、第一磨牙近颊○角
- C、侧切牙的近中唇面角
- D、尖牙近远中牙尖嵴的交角

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788135012014006070>