

2024 年安徽省贵池区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题真题附答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 立刻舌下含服硝酸甘油片
- B: 立刻喝白开水 200mL
- C: 立刻服用美托洛尔片
- D: 立刻口服糖水或糖块

答案：D

2. 容易氧化的药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 青霉素类
- C: 牛痘菌苗
- D: 胃蛋白酶

答案：A

3. 某男孩，12 岁，近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。

- A: 丙戊酸
- B: 苯妥英钠
- C: 氯丙嗪

D: 地西洋

答案：A

4. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

A: 链霉素

B: 红霉素

C: 土霉素

D: 四环素

答案：D

5. 以下对“发热指标”的叙述中，不正确的是

A: 直肠温度超过 37.6°C

B: 口腔温度超过 37.3°C

C: 腋下温度超过 37.0°C

D: 腋下温度超过 36.6°C

答案：D

6. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，因糖尿病酮症酸中毒入院需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

7. 下述药物中，具有肝药酶抑制作用的是

A: 西咪替丁

- B: 卡马西平
- C: 苯巴比妥
- D: 利托那韦

答案：A

8. (用药与尿液检查异常) 氨丁三醇可能引起

- A: 尿液隐血
- B: 尿蛋白
- C: 尿液 pH 增高
- D: 尿胆红素

答案：C

9. 贫血患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血小板增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：C

10. 主要抑制 L-型钙通道的钙离子内流，减慢窦房结的自律性和房室结传导的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 去乙酰毛花苷
- C: 多巴胺
- D: 米力农

答案：A

11. 药物对妊娠的危险性分级中属于 X 级的是

- A: 阿卡波糖
- B: 甲氨蝶呤
- C: 链霉素
- D: 奥美拉唑

答案：B

12. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

- A: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点
- B: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率
- C: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁
- D: 抑郁症的病因明确

答案：D

13. 结肠癌

- A: 白细胞增多
- B: 真菌
- C: 上皮细胞
- D: 红细胞

答案：D

14. 1 型糖尿病患者首选的药物是

- A: 胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 格列苯脲
- D: 二甲双胍

答案：A

15. 长期大量应用容易导致体重明显增加的是

- A: 酮替芬
- B: 色甘酸钠
- C: 氯雷他定
- D: 盐酸异丙嗪

答案：A

16. 解救蛇咬伤中毒的是

- A: 二巯丙醇
- B: 单价抗毒血清
- C: 依地酸钙钠
- D: 盐酸戊乙奎醚

答案：B

17. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 复方氨基酸注射液

答案：C

18. 患者,男,56岁,体检发现血尿酸 $530\mu\text{mol/L}$ (参考值 $<420\mu\text{mol/L}$),患者向药师咨询维生素使用问题,药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是()

- A: 维生素
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B12

答案：A

19. I 期临床试验样本数为

- A: 常见病 $\geq$ 1000 例
- B: 100~300 例
- C: 20~30 例
- D: 常见病 $\geq$ 2000 例

答案：C

20. 双膦酸盐

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：D

21. 痛风缓解期，在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

- A: 呋塞米
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 阿司匹林

答案：B

22. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 腹腔注射
- B: 动脉注射
- C: 腔内注射
- D: 膀胱灌注

答案：B

23. 应用氟马西尼可解救的是

- A: 铅、汞中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 有机磷中毒

答案：B

24. (常用的特殊解毒剂的适应证)，丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 谷胱甘肽
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：B

25. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 异戊巴比妥
- B: 硫喷妥钠
- C: 巴比妥
- D: 苯巴比妥

答案：A

26. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用量为

- A: 0.5gtid
- B: 0.1gtid

C: 0.2gqd

D: 0.5gqd

答案：C

27. 典型结核病的临床表现错误的是

A: 高热

B: 乏力

C: 食欲减退

D: 咳嗽

答案：A

28. 微粒型非诺贝特的用量是（）

A: 0.6g, bid

B: 0.2g, qd

C: 0.2g, tid

D: 0.1g, tid

答案：B

29. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

A: 庆大霉素

B: 甲硝唑

C: 制霉菌素

D: 林可霉素

答案：C

30. 指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填“好转”

- A: 用药原因
- B: 用药起止时间
- C: 不良反应 / 事件的结果
- D: ADR / ADE 过程描述

答案：C

31. 患者,女,62 岁,2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难,不宜选用的药物是()

- A: 阿卡波糖
- B: 格列齐特
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

32. 下列引起药源性疾病的事例中,其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

- A: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用
- B: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿
- C: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险
- D: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

答案：B

33. 以下有关肝功能不全病人用药原则的叙述中,不正确的是

- A: 特别应避免与肝毒性的药物合用
- B: 选用从肝脏排泄的药物
- C: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物
- D: 定期检查肝功能,及时调整治疗方案

答案：B

34. 在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效果分析
- D: 最小成本分析

答案：B

35. 奥昔布宁用于治疗急迫性尿失禁，其主要不良反应是

- A: 眼内压升高
- B: 性功能减退、乳房增大
- C: 体位性低血压
- D: Q-T 间期延长

答案：A

36. （2015 年真题）伴有高血压的患者应慎用的是（ ）。

- A: 含伪麻黄碱的复方制剂
- B: 氯苯那敏
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：A

37. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

- A: 尼古丁替代药物
- B: 伐尼克兰

C: 安非他酮

D: 可乐定

答案: B

38. 适宜与乳酶生伍用的药物是

A: 干酵母

B: 抗酸药

C: 抗生素

D: 磺胺类

答案: A

39. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

A: 氨茶碱

B: 孟鲁司特

C: 异丙托溴铵

D: 噻托溴铵

答案: B

40. 减少尿酸排泄，引起高尿酸血症的是

A: 丙磺舒

B: 吲哚美辛

C: 氢氯噻嗪

D: 苯溴马隆

答案: C

41. 发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

A: 37℃以上

B: 41℃ 以上

C: 38.1℃ ~ 39℃

D: 37.4℃ ~ 38℃

答案：D

42. (抗癫痫药物的选择) 癫痫全身强直阵挛性发作的一线用药是 ()

A: 加巴喷丁

B: 扑米酮

C: 卡马西平

D: 乙琥胺

答案：C

43. 首次给药在睡前上床后服用，适用于高血压伴前列腺增生，也用于难治性高血压患者降压药种类是

A: ACEI 和 ARB

B: 钙通道阻滞剂

C: β 受体阻断剂

D: α 受体阻断剂

答案：D

44. (2015 年真题) 上市后药品临床再评价阶段是 ()。

A: III 期临床试验

B: IV 期临床试验

C: I 期临床试验

D: II 期临床试验

答案：B

45. 用于对洋地黄治疗无效的顽固性充血性心力衰竭，长期使用可增加死亡率的磷酸二酯酶III抑制剂是

- A: 去乙酰毛花苷
- B: 米力农
- C: 维拉帕米
- D: 多巴胺

答案：B

46. 抗高血压的药是()。

- A: 多粘菌素
- B: 卡托普利
- C: 二甲双胍
- D: 法莫替丁

答案：B

47. 交代患者药品未开启包装时应置于 2℃~8℃保存，开始使用后不要存放于冰箱中，可在室温下（不超过 25℃）存放 4 周的是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 胰岛素注射剂
- C: 米索前列醇
- D: 氟西汀

答案：B

48. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

- A: 1 型糖尿病
- B: 高血压

C: 2 型糖尿病

D: 高血脂

答案: C

49. 贫血患者常出现()

A: 血小板计数增多

B: 中性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: C

50. 用药错误定义为药物在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当。临床用药的过程一般是指开写处方、转抄医嘱、药师调剂发药、护士或患者给药以及监测用药结果等。

A: 患者自行选购药品

B: 新手值班

C: 药品包装外观相似

D: 药品位置凌乱

答案: C

51. 下列药物中，适用于急迫性尿失禁的药物为

A: 奥昔布宁

B: 哌唑嗪

C: 非那雄胺

D: 米多君

答案: A

52. 艾滋病的传播途径不包括

- A: 经血制品传播
- B: 经血传播
- C: 性途径传播
- D: 消化道传播

答案：D

53. 氯喹与链霉素合用

- A: 诱发癫痫
- B: 加重神经肌肉接头抑制作用
- C: 根治间日疟
- D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：B

54. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

- A: 输尿管结石
- B: 横纹肌溶解
- C: 十二指肠溃疡
- D: 急性心肌梗死

答案：B

55. (新药 4 期临床评价的局限性)上市前临床试验观测的指标限于试验设计内容，其他临床指标容易被忽视，属于

- A: 病例数量少
- B: 管理漏洞
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案：C

56. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 尼美舒利
- B: 美洛昔康
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 双氯芬酸钠

答案：C

57. 口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药，较为有效的用药时间是症状出现的

- A: 72 小时内
- B: 96 小时内
- C: 48 小时内
- D: 108 小时内

答案：C

58. 下列药品通用名与别名的组合中，不属于同一种药品的是

- A: 氯己定与洗必泰
- B: 氨甲苯酸与止血敏
- C: 利可君与利血生
- D: 桂利嗪与脑益嗪

答案：B

59. (2016 年真题) 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于 ()。

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效益分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效用分析

答案: C

60. (妊娠的危险性分级) 在有对照组的早期妊娠妇女中未显示对胎儿有危险(并在中、晚期妊娠中亦无危险的证据)，可能对胎儿的伤害极小

A: B 级

B: C 级

C: D 级

D: A 级

答案: D

61. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

A: 5%葡萄糖注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 复方氨基酸注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案: A

62. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

A: 肾间质纤维化

B: 前列腺素合成障碍

C: 直接肾毒性

D: 肾小管阻塞

答案: D

63. 具有末梢神经炎毒性，必要时需补充 B 族维生素和神经营养剂的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 环磷酰胺
- C: 阿糖胞苷
- D: 长春新碱

答案：D

64. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- B: 瑞格列奈片应于餐前服用
- C: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：A

65. 在治疗痔疮的药物中，作为硬化剂或萎缩剂的是

- A: 地奥司明
- B: 九华膏
- C: 苯酚甘油-水溶液
- D: 草木犀流浸液片

答案：C

66. 最可能引起血小板计数减少的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 氯丙嗪
- C: 阿莫西林
- D: 乳酸钠

答案：A

67. 处方中"餐前给药"的外文缩写是

- A: qn
- B: pc
- C: po
- D: ac

答案：D

68. 常见老年人 ADR 的药物类别,硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

- A: β 受体阻断剂
- B: 抗生素
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 抗胆碱药

答案：C

69. (2015 年真题) 接种乙肝疫苗后, 血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是 ()。

- A: 乙型肝炎病毒
- B: 乙型肝炎病毒表面抗原
- C: 乙型肝炎病毒表面抗体
- D: 乙型肝炎病毒 e 抗原

答案：C

70. 摄入过多可增加体内血容量, 促发充血性心力衰竭或高血压的是

- A: 食醋
- B: 脂肪
- C: 食盐

D: 酒

答案: C

71. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

A: 抑制 CYP3A4

B: 抑制 CYP1A2

C: 诱导 CYP3A4

D: 抑制 CYP2C9

答案: A

72. 下列病痛中，不适宜应用解热镇痛药治疗的是

A: 肌肉痛

B: 关节痛

C: 牙痛

D: 肠绞痛

答案: D

73. 注射氟马西尼，用于

A: 解救丙咪嗪中毒

B: 解救硝西泮中毒

C: 解救可待因中毒

D: 解救乙醇中毒

答案: B

74. 抗凝治疗

A: 阿司匹林

B: 阿替普酶

C: 低分子肝素

D: 巴曲酶

答案: C

75. (有关物质中毒的特效解毒剂)，香豆素类灭鼠药中毒的特效解毒剂是

A: 烯丙吗啡

B: 氯解磷定

C: 维生素 K

D: 乙酰胺

答案: C

76. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

A: 萘普生

B: 吲哚美辛

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案: C

77. 归属于用药记录的是

A: 对药物治疗的建设性意见

B: 主治医师签名

C: 同时合并应用的药品

D: 主要实验室检查数据

答案: C

78. 上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 病例数目少
- B: 观察时间短
- C: 管理漏洞
- D: 考察不全面

答案：D

79. 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

- A: 心力衰竭患者
- B: 双侧肾动脉狭窄患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 痛风患者

答案：D

80. 融合抑制剂

- A: 齐多夫定
- B: 利巴韦林
- C: 依非韦伦
- D: 利托那韦

答案：B

81. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

- A: 科学发展
- B: 管理规范到位
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 知识培训

答案：C

82. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: PK/PD 参数法
- B: 稳态一点法
- C: CTP 评分
- D: 一点法和重复一点法

答案：C

83. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 忽略药品说明书的提示用药
- B: 滥用糖皮质激素、人血白蛋白
- C: 美扑伪麻片用于伴有青光眼的感冒患者
- D: 病因未明而应用两种以上的药物

答案：B

84. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：D

85. 处方调配差错的内容

- A: 加强药品货位管理
- B: 药品名称出现差错
- C: 确认差错发生的过程、细节
- D: 通过药剂师双人复核制

答案：B

86.（2017 年真题）下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是（）

- A: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
- B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效
- C: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：B

87. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 依他尼酸合用华法林
- B: 用药时同服甲氧氯普胺
- C: 抗酸药合用四环素类药
- D: 磺胺类药与青霉素合用

答案：A

88. 选择的前提是

- A: 药物治疗的方便性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的规范性
- D: 药物治疗的安全性

答案：D

89.（2019 年真题）患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/788140076045007022>