2024年安徽省贵池区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试内部题库（实用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.以下临床用药中，药物相互作用主要是药效学的影响是

A：四环素同服硫酸亚铁减效

B：利福平同服异烟肼致肝毒性增加

C：氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

D：维生素C与多潘立酮同服吸收减少

答案：C

2.单一试验提供信息，其结果或结论有误将误导读者是指

A：二级信息源

B：四级信息源

C：三级信息源

D：一级信息源

答案：D

3.能用结论较肯定的药物就不用新药，即

A：禁止用试验性药

B：可用可不用的药物应尽量不用或少用

C：用药必须有明确的指征和适应证

D：选用对胎儿危害较小的药物

答案：A

4.患者，女，62岁，医师处方如下：

A: 氯吡格雷
B: 二甲双胍
C: 氨氯地平
D: 阿卡波糖
答案：C

5.关于尿路感染的说法，不正确的是
A: 男性发病率稍高
B: 多见于育龄期和绝经后女性
C: 由细菌感染引起
D: 大肠埃希菌感染最为常见
答案：A

6.患者，男，56岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA≥20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。
A: 替比夫定
B: 拉米夫定
C: 恩替卡韦
D: 阿德福韦
答案：C

7.患者,男,65岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是（）
A: 乙酰半胱氨酸
B: 羧甲司坦
C: 右美沙芬
D: 氨溴索

答案：C

8.用于胆囊炎患者控制感染症状的药物是

A：匹维溴铵

B：脂肪乳

C：头孢曲松与甲硝唑联用

D：复方阿嗪米特

答案：C

9.用淡黄色处方纸书写的是

A：第二类精神药品处方

B：急诊处方

C：第一类精神药品处方

D：普通处方

答案：B

10.由国家基本药物临床应用指南和处方集编委会主编的是

A：《医师案头参考》

B：《中国药典临床用药须知》

C：《国家基本药物处方集》

D：《中国国家处方集》

答案：C

11.下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A：苯妥英钠

B：阿托品

C：普萘洛尔

D：普鲁卡因胺

答案：A

12.药师审核后判定为合理处方，应该

A：拒绝调配处方，并依照有关规定报告

B：调配处方并发药

C：拒绝调配处方

D：拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预

答案：B

13.已知"1%(g/ml)盐酸麻黄碱溶液的冰点降低值为0.16"，1g盐酸麻黄碱氯化钠的等渗当量为0.28，欲配制2%(g/ml)盐酸麻黄碱滴鼻剂500ml，需要氯化钠的量是

A：1.7g

B：1.88g

C：1.83g

D：1.78g

答案：A

14.药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中,会发生相互影响,不能同时服药",但没有明示服药间隔时间,通常建议的间隔时间是（）

A：0.5小时

B：3小时

C：2小时

D：1小时

答案：C

15.脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

A：阿司匹林

B: 阿替普酶

C: 甘露醇

D: 普通肝素

答案：B

16.阿昔洛韦可导致药源性肾病的机制是

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾间质纤维化

D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：D

17.以下论述哪项是错误的（）

A: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

B: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，以提高疗效、减少不良反应

D: 普萘洛尔可抑制肾素的分泌

答案：A

18.甲基黄嘌呤治疗慢阻肺疾病的不良反应不包括

A: 室性心律失常

B: 头痛失眠

C: 癫痫大发作

D: 口渴

答案：D

19.目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A：绝经后15年之内或60岁以后
B：60岁以后
C：绝经后10年之内或60岁以前
D：绝经后5年之内
答案：C

20.（2019年真题）配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是
A：依托泊苷
B：博来霉素
C：环磷酰胺
D：奥沙利铂
答案：D

21.药物相互作用使毒性增加的事例是
A：山莨菪碱联用哌替啶
B：阿托品联用普萘洛尔
C：铁剂联用维生素
D：阿托品联用吗啡
答案：A

22.关于药物作用相加或增加疗效的举例,磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于
A：延缓或降低抗药性
B：保护药品免受破坏
C：促进机体的吸收利用
D：作用于不同的靶位

答案：D

23.患者，男，45岁，患有抑郁症，服用帕罗西汀40mgqd6月余。近期感染社区获得性肺炎，该患者不宜使用的抗感染药是

A: 左氧氟沙星

B: 阿莫西林一克拉维酸

C: 利奈唑胺

D: 头孢哌酮一舒巴坦

答案：C

24.H

A: 埃索美拉唑

B: 多潘立酮

C: 铝碳酸镁

D: 法莫替丁

答案：D

25.禁用于严重痛风患者的调脂药物为

A: 阿托伐他汀

B: 考来烯胺

C: 烟酸类

D: 非诺贝特

答案：C

26.患者，女，45岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的NSAID是

A: 布洛芬

B: 双氯芬酸

C: 吲哚美辛

D: 塞来昔布

答案：D

27.表现为"牛肉样舌"的疾病为

A: 缺铁性贫血

B: 巨幼细胞性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 淋巴瘤

答案：B

28.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 阿莫西林

B: 喷托维林

C: 右美沙芬

D: 沙丁胺醇

答案：C

29.患者，女，39岁，有哮喘病史。1天前因发热服用阿司匹林250mg，用药后30分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 这是由于发热引发了哮喘

B: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘

C：可用肾上腺素治疗

D：这是阿司匹林中毒的表现

答案：B

30.服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

A：苦味健胃药

B：抗利尿药

C：利胆药

D：抗尿结石药

答案：A

31.治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A：维生素B6

B：雷尼替丁

C：昂丹司琼

D：奥美拉唑

答案：C

32.（2018年真题）患者,男,59岁,高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物（）

A：硝苯地平

B：缬沙坦

C：尼莫地平

D：氨氯地平

答案：C

33.长期应用可引起牙龈出血、手术创面渗血等出血倾向，需要合用维生素K的药物是

A: 头孢菌素类

B: 加替沙星

C: 培高利特

D: 氟西汀

答案：A

34.用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

A: 塞来昔布

B: 贝诺酯

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案：D

35.可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是:

A: 埃索美拉唑20mgqd+克拉霉素1.0gqd+枸橼酸铋钾0.6gbid

B: 埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgbid+阿莫西林1.0gbid+枸橼酸铋钾0.6gbid

C: 埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgtid+枸橼酸铋钾0.6gbid

D: 埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgqd+阿莫西林0.5gtid

答案：B

36.下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

A: 肝肾功能不全者

B: 药物治疗窗窄、需要做监测者

C: 需要重新选择药品或调整用药方案者

D: 应用特殊剂型者

答案：A

37.患者，男，1岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见5叶或6叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

A: 叶酸片、维生素B12片

B: 输入新鲜血浆

C: 硫酸亚铁片

D: 促红细胞生成素注射剂

答案：A

38.属于选择性5-HT4受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 昂丹司琼

答案：B

39.饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

A: 红色

B: 酱色

C: 暗绿色

D: 黑褐色

答案：A

40.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 青霉素

B: 氟喹诺酮类

C: 碳青霉烯类

D: 头孢菌素

答案：B

41.表现为“牛肉样舌”的疾病为()

A: 巨幼细胞性贫血

B: 缺铁性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 白血病

答案：A

42.缺铁性贫血最早和最常见的症状是

A: 乏力、困倦、活动耐力减退

B: 头晕

C: 食欲不振

D: 记忆力减退

答案：A

43.目前治疗低HDL-C血症，较为有效的药物是

A: 贝特类

B: ω-3脂肪酸制剂

C: 烟酸类

D: 他汀类

答案：C

44.对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

A：在8℃以上时，温度越低，对保管越有利

B：在10℃以上时，温度越低，对保管越有利

C：在2℃以上时，温度越低，对保管越有利

D：在0℃以下时，温度越低，对保管越有利

答案：C

45.（2019年真题）患者，男，50岁，临床诊断为焦虑症，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者用药教育的说法错误的是

A：服用氟西汀期间不能饮酒

B：不能突然停止服用氟西汀

C：不得随意自行调整氟西汀剂量

D：氟西汀应于睡前服用

答案：D

46.无症状菌尿

A：治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次幽现真性细菌尿，菌株与上次不同

B：治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再出现菌尿，菌种与上次相同

C：患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数>10scfu/ml

D：宜选用毒性小的抗菌药物

答案：C

47.以下哪项是乳果糖治疗功能性便秘的主要机制

A：润滑肠壁，软化大便和调节稠度

B：刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便

C：在结肠中被消化道菌群转化成低分子量的有机酸，导致肠道内的pH下降，并通过渗透作用增加结肠内容量

D：润滑并刺激肠壁，软化大便

答案：C

48.国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

A：>1.5

B：<0.8

C：0.8～1.5

D：2

答案：C

49.严重心脏病患者不能

A：催吐

B：洗胃

C：实施血液净化

D：强利尿

答案：A

50.服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

A：粉剂

B：胶囊剂

C：糖浆剂

D：包衣片

答案：C

51.急性痛风性关节炎期首选药物是

A: 碳酸氢钠

B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案：C

52.饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A: 复合营养素

B: 钙剂

C: 中草药制剂

D: 复合维生素

答案：D

53.属于妊娠C级毒性药品的是

A: 氧氟沙星

B: 辛伐他汀

C: 水溶性维生素

D: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

答案：A

54.阿司匹林可能引起

A: 尿肌酐

B: 尿沉渣结晶

C: 尿酮体

D: 尿血红蛋白

答案：D

55.能减轻眼部平滑肌及血管痉挛,改善局部微循环,缓解视疲劳的药物是（）

A: 可的松滴眼液

B: 山莨菪碱滴眼液

C: 聚乙烯醇滴眼

D: 硫酸锌滴眼液

答案：B

56.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 雷米普利

B: 氟伐他汀

C: 左旋氨氯地平

D: 比索洛尔

答案：B

57.“根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

A: 致病药物的确定

B: 流行病学的调查

C: 询问用药过敏史和家族史

D: 排除药物以外的因素

答案：A

58.维生素E用于

A: 防治坏血病

B: 防治夜盲症

C: 习惯性流产的辅助治疗

D: 防治佝偻病

答案：C

59.治疗胆囊炎的药物需选用

A: M 受体激动剂

B: 质子泵抑制剂

C: 消炎利胆片

D: H2 受体阻断剂

答案：C

60.体位性低血压

A: 卡托普利

B: α 受体阻断剂

C: 普萘洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：B

61.临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

A: 每个半衰期给药 1 次

B: 静脉滴注给药

C: 每 2～3 个半衰期给药 1 次

D: 每日给药 1 次

答案：D

62.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

B: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

D: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至2～4.5小时

答案：A

63.静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A: 美罗培南

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 头孢哌酮

答案：B

64.特别适用于碘中毒的是

A: 淀粉溶液

B: 1%硫酸镁溶液

C: 药用炭混悬液

D: 1％氯化钠溶液

答案：A

65.避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

A: 胺碘酮

B: 链激酶

C: 氯吡格雷

D：阿托伐他汀钙

答案：A

66.(儿童用药特点)针对儿童最方便、最安全、最经济的给药途径

A: 口服给药

B: 静脉给药

C: 局部给药

D: 皮下注射

答案：A

67.不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

A: 可待因

B: 氨茶碱

C: 氯苯那敏

D: 地高辛

答案：B

68.轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

A: 弱轻度

B: 轻度

C: 中度

D: 重度

答案：B

69.（2016年真题）患者，女，1岁6个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是（）。

A: 双人核对

B: 采用两种方式核对患者身份

C：使用药片通用名

D：采用电子处方系统

答案：A

70.吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

A：氯丙嗪

B：呋塞米

C：胰岛素

D：西咪替丁

答案：B

71.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A：多索茶碱

B：毛花苷丙

C：硝普钠

D：硝苯地平

答案：B

72.有关噻托溴铵干粉吸入剂（吸乐装置）正确使用操作：①拉开防尘帽，打开吸嘴，从包装中取出1粒胶囊，将胶囊放入中央室内，合上吸嘴直至听到一声“咔嗒”声；②尽量呼气（避开吸嘴），用口唇包裹住吸嘴，保持头部垂直，缓慢深吸气，屏住呼吸，约10秒后慢慢呼气；③漱口，去除咽部残留药物；④手持吸入器将吸嘴朝上，将刺针按钮完全按下1次；⑤擦拭吸嘴，再次打开吸嘴，取出胶囊壳，关闭吸嘴和防尘帽。正确的操作步骤是

A：①②③④⑤

B: ②④①⑤③

C: ①④②⑤③

D: ⑤④②①③

答案：C

73.嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A: 过敏性疾病如荨麻疹

B: 感染性疾病如肺结核

C: 病毒感染性腹泻

D: 铅、铋中毒

答案：A

74.（2016年真题）患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌（LES）压力＜6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgbid强化抑酸治疗。

A: 戒烟酒

B: 餐中多饮水

C: 避免高脂饮食

D: 控制体重

答案：B

75.影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

A: 多潘立酮+维生素C

B: 西咪替丁+格列本脲

C: 青霉素+丙磺舒

D: 四环素+硫酸亚铁

答案：B

76.关于治疗药物监测的论述，错误的是

A：是临床药学服务的重要内容之一

B：治疗药物监测可以实现给药个体化

C：治疗药物监测的常用英文缩写是“TDM”

D：所有的治疗药物都必须进行监测

答案：D

77.结果一致的Ⅱ、Ⅲ级临床研究结论或Ⅰ级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

A：E级

B：B级

C：D级

D：C级

答案：B

78.致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

A：注意特殊人群用药

B：注意药物的迟发反应

C：注意定期监测器官功能

D：了解患者及家族的过敏史

答案：B

79.属于胃食管反流病的食管外症状的是（）（消化性溃疡病的治疗）

A：烧心

B：上腹部烧灼感

C：反流

D：哮喘

答案：D

80.卡马西平治疗三叉神经痛无效时，可改服

A：麦角胺咖啡因片

B：阿司匹林

C：对乙酰氨基酚

D：苯妥英钠

答案：D

81.服用后不宜立刻饮水，以免冲淡咽部药物浓度的是

A：糖浆剂

B：胶囊剂

C：粉剂

D：舌下片

答案：A

82.1日1次用药、初治短程化疗方案是

A：2S(E)HR2/4HR

B：2HSP(E)/10HP(E)

C：1HS/11H2S2

D：2S(E)HR2/4H3R3

答案：A

83.依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选()。

A：苯丙哌林

B：吗啡

C：可待因

D：右美沙芬

答案：D

84.宜用温开水送服，直接口服会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

A：泡腾片

B：胶囊剂

C：糖浆剂

D：粉剂

答案：B

85.预混胰岛素30R的组成为()

A：70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素

B：30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素

C：30%中效胰岛素，70%短效胰岛素

D：70%中效胰岛素，30%短效胰岛素

答案：D

86.每次配方尽可能1次完成，是针对

A：配备足够的人力

B：及时沟通

C：规范操作、坚持核对

D：环境整齐、安静

答案：C

87.关于抗抑郁药的合理使用，下列说法错误的为（）

A：不能突然停止使用，以避免出现症状反弹和戒断综合征

B：在单胺氧化酶抑制剂停用的14天内不能使用SSRIs等抗抑郁药物

C：多数需要至少 2 周才会起效

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/788140100045007022