# 2024湖南省泸溪县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库（能力提升）

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.严重铅中毒患者出现的最难救治的临床症状是

A：中毒性肝炎

B：中毒性肾炎

C：贫血

D：铅毒性脑病

**答案：D**

2.患者，男，72岁，因病毒性感冒而致发热，体温39.2℃，伴轻咳、痰多且黏稠。今日“支气管哮喘”宿疾复发。家人前来药店购买对乙酰氨基酚片、右美沙芬片、氨溴索片、沙丁胺醇气雾剂。药师提供的用药指导中，错误的是

A：服药期间禁止饮酒

B：右美沙芬宜睡前服用

C：沙丁胺醇气雾剂每次1~2喷，第1小时内每20分钟给药一次，随后调整为每3~4h一次

D：右美沙芬和氨溴索同时服用

**答案：D**

3.不能受潮的药品是

A：硝酸甘油

B：阿卡波糖片

C: 头孢曲松钠

D: 复方甘草合剂

**答案：B**

4.在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

A: 中国国家处方集

B: 新编药物学

C: 药物不良反应

D: 国家基本药物处方集

**答案：A**

5.可帮助人短时间内急速降低体重

A: 蛋白同化制剂

B: 麻醉药品

C: 利尿剂

D: 肽激素类

**答案：C**

6.能降LDL也降HDL的药物是

A: 普罗布考

B: 烟酸

C: 塞伐他汀

D: 非诺贝特

**答案：A**

7.细菌性痢疾可出现()。

A：脓血便

B：胨状便

C：鲜血便

D：稀糊便

**答案：A**

8.下列药物中，不属于三环类抗抑郁药的是（）

A：氟伏沙明

B：氯米帕明

C：丙米嗪

D：阿米替林

**答案：A**

9.下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

A：阿米洛利片

B：左甲状腺素钠片

C：东莨菪碱片

D：氟桂利嗪胶囊

**答案：B**

10.患者，女，35岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是20天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是()

A：牙齿色素沉着

B：骨骼发育异常

C：腭裂

D：流产或发育成正常胚胎

**答案：D**

11.轻度支气管哮喘的临床表现不包括

A：可有焦虑

B：步行或上楼时气短

C：呼吸频率轻度增加，可闻及散在哮鸣音

D：心率增快>120次/分

**答案：D**

12.血脂调节药的合理应用主要用于高胆固醇血症，尤其是黄色瘤患者的是（）

A：他汀类与贝特类联用

B：伊曲康唑

C：普罗布考

D：依折麦布

**答案：C**

13.粪外观所对应的疾病,上消化道出血(>50ml)

A：暗红果酱色

B：米泔水样

C：白陶土便

D：柏油便，黑色有光泽

**答案：D**

14.对合并糖尿病以及肾病的高血压病人降压的目标建议是

A：＜140/90mmHg

B：＜150/90mmHg

C：＜160/95mmHg

D: ＜130/80mmHg

**答案：D**

15.（2017年真题）半衰期大于24h的药物通常选择（）

A: 静脉滴注给药

B: 2～3个半衰期给药1次

C: 每个半衰期给药1次

D: 每日给药1次

**答案：D**

16.现代药物临床治疗更多依赖于循证医学的支持，在循证医学证据分级中，证据和推荐强度的级别最高的是()

A: 大样本病案系列

B: 同质病例对照试验的系统评价

C: 单个大样本随机对照试验

D: 同质随机对照试验的系统评价

**答案：D**

17.指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填"好转"

A: 不良反应/事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE过程描述

**答案：A**

18.比沙可啶适用于

A：低张力性便秘

B：急性便秘

C：习惯性便秘

D：功能性便秘

**答案：C**

19.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A：妥布霉素

B：庆大霉素

C：新霉素

D：异烟肼

**答案：B**

20.可引起胎儿性发育异常的药物是

A：雌激素、孕激素、雄激素

B：苯巴比妥

C：叶酸拮抗剂

D：沙利度胺

**答案：A**

21.患者，女，26岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶450mg/d治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

A：红细胞

B：血红蛋白

C：白细胞

D：嗜酸粒细胞

**答案：C**

22.合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

A：非那雄胺

B：托特罗定

C：多沙唑嗪

D：坦索罗辛

**答案：B**

23.就餐时随第一、二口食物给药的是

A：二甲双胍

B：瑞格列奈

C：阿卡波糖

D：胰岛素

**答案：C**

24.下列足癣类型中，以冬季多见或加重的是

A：鳞屑型

B：角化型

C：水疱型

D：间擦型

**答案：B**

25.属于渗透性泻药，成人起始剂量每日30ml，早餐时一次性服用，糖尿病患者应慎用的是

A：乳果糖

B：聚乙二醇4000

C：比沙可啶

D：欧车前

**答案：A**

26.高尿酸血症的诊断标准为日常饮食情况下，非同日两次空腹血尿酸水平（gmol／L）大于

A：480

B：360

C：420

D：240

**答案：C**

27.属于5α-还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

A：非那雄胺

B：黄酮哌酯

C：氟他胺

D：阿夫唑嗪

**答案：A**

28.肾衰竭者不能

A：强利尿

B：洗胃

C：催吐

D：实施血液净化

**答案：A**

29.治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

A：依诺肝素钠

B：氯吡格雷

C：尿激酶

D：达比加群酯

**答案：B**

30.下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

A：胃黏液

B：胃黏膜屏障

C：HCO3-的分泌

D：非甾体抗炎药

**答案：D**

31.促进肌肉发达增加爆发力的兴奋剂是

A：甲睾酮

B：呋塞米

C：苯丙胺

D：阿托品

**答案：A**

32.苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠26～29周时游离药物达高峰，是由于

A：血容量增加使血浆白蛋白浓度降低

B：激素分泌改变，药物代谢也受影响

C：妊娠晚期血流动力学发生改变

D：胃肠活动减弱，使吸收减慢

**答案：A**

33.用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

A：贝诺酯

B：阿司匹林

C：塞来昔布

D：布洛芬

**答案：D**

34.（2015年真题）处方中“餐前给药”的外文缩写是（）。

A：Ac

B：pc

C：po

D：qn

**答案：A**

35.下列不属予艾滋病的基本特征的是

A：T淋巴细胞功能下降

B：B淋巴细胞功能失调

C：自然杀伤细胞（NK细胞）活性下降

D：体重减轻或非正常的生长减慢

**答案：D**

36.药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

A：适量

B：规律

C：早期

D：联合

**答案：C**

37.应贮存在阴凉处的药物是

A：硫酸亚铁片

B：重组人促红细胞生成素

C：头孢拉定

D: 托烷司琼注射剂

**答案：C**

38.可能影D向儿童骨骼发育的药物是

A: 头孢克洛

B: 诺氟沙星

C: 阿莫西林

D: 华法林

**答案：B**

39.饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A: 20ml

B: 25ml

C: 15ml

D: 10ml

**答案：B**

40.药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中国药学会的网址是

A: org.cn

B: www.cp

C: www.cm

D: org.cn

**答案：D**

41.长期、大量使用可对肝脏造成不可逆性损伤的药物是

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C：布洛芬

D：对乙酰氨基酚

**答案：D**

42.循证医学证据级别和强度最低的是

A：同质随机对照试验的系统评价

B：大样本病案系列

C：专家意见

D：单个样本随机对照试验

**答案：C**

43.使尿血红蛋白呈阳性的药品是

A：顺铂

B：苯巴比妥

C：两性霉素B

D：阿司匹林

**答案：D**

44.使用非甾体抗炎药治疗类风湿性关节炎时，为预防其胃肠副作用常并用

A：碱性药

B：钙剂

C：维生素K

D：H

**答案：D**

45.（2016年真题）患者，男，48岁，患有青光眼3年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是（）。

A：孟鲁斯特纳咀嚼片

B：布地奈德混悬液

C：多索茶碱注射液

D：沙丁胺醇气雾剂

**答案：B**

46.（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

A：雷美尔通

B：地西泮

C：佐匹克隆

D：米氮平

**答案：D**

47.(常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

A：二巯丁二钠

B：谷胱甘肽

C：乙酰半胱氨酸

D：纳洛酮

**答案：C**

48.苯丙胺中毒

A：1%硫酸镁溶液

B：5%碳酸氢钠溶液

C：1%氯化钠溶液

D: 药用炭混悬液

**答案：D**

49.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，1～2小时后缓解，以冬春季多发。

A: 氢氧化铝

B: 兰索拉唑

C: 氯化钾片

D: 法莫替丁

**答案：C**

50.对缺铁性贫血者应选用

A: 富马酸亚铁

B: 维生素K

C: 叶酸+维生素B

D: 甲磺酸去铁胺

**答案：A**

51.治疗急性细菌性扁桃体炎的首选药物是

A: 莫西沙星

B: 阿奇霉素

C: 克林霉素

D: 阿莫西林

**答案：D**

52.患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病和前列腺增生症，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关，复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的是

A: 依那普利

B: 非那雄胺

C: 珍菊降压片（含氢氯噻嗪）

D: 二甲双胍

**答案：C**

53.为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 硫酸亚铁

B: 亚叶酸钙

C: 维生素C

D: 叶酸+维生素B12

**答案：C**

54.属于妊娠C级毒性药品的是

A: 水溶性维生素

B: 辛伐他汀

C: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

D: 氧氟沙星

**答案：D**

55.及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

A: 发现药品质量问题

B: 药品上市前风险评估

C: 药品上市后风险评估

D: 发现与规避假、劣药品流入市场

**答案：D**

56.老年人退热服用贝诺酯，1日3次；1日用量不得超过

A: 2.0g

B: 3.0g

C: 2.5g

D: 1.5g

**答案：C**

57.1类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

A: 无适应证用药

B: 有禁忌证用药

C: 过度治疗用药

D: 联合用药不适宜

**答案：A**

58.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂?

B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂?

C: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮?

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁?

**答案：A**

59.蒽环类药物的主要毒副作用是（）

A: 肺纤维化

B: 溶血性尿毒症

C: 心脏毒性

D: 出血性膀胱炎

**答案：C**

60.较易导致肾损伤的药品是

A：氯化钾

B：阿米卡星

C：酮康唑

D：新霉素

**答案：D**

61.就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

A：抗-HBs(+)

B：HBeAg(+)

C：抗-HBe(+)

D：HBsAg(+)

**答案：B**

62.可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

A：低精蛋白锌胰岛素

B：甘精胰岛素

C：预混胰岛素

D：普通胰岛素

**答案：D**

63.血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的正常值参考范围是

A：速率法：成人<40U/L

B：成人<60U/L

C：<40U/L

D：速率法：<40U/L

**答案：A**

64.提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员

A：新颖性

B：权威性

C：合理性

D：归因性

**答案：B**

65.服药期间饮茶可降低药效的是

A：硫酸亚铁

B：格列本脲

C：西咪替丁

D：泼尼松

**答案：A**

66.药物不良反应多潘立酮（）

A：睡眠障碍

B：黑便

C：性功能障碍

D：溢乳现象

**答案：D**

67.目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的IL-1拮抗剂类生物制剂为

A：阿达木单抗

B：英夫利昔单抗

C：阿那白滞素

D：阿巴西普

**答案：C**

68.描述是否充分、详细、准确是评价

A：前言

B：摘要

C：结果

D：讨论

**答案：C**

69.患者，男，60岁，身高170cm，体重85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率100次/分、血压160/100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A：150/100mmHg

B：140/90mmHg

C：140/80mmHg

D：130/80mmHg

**答案：D**

70.治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

A：克霉唑栓

B：硝酸咪康唑栓

C：甲硝唑栓

D：聚甲酚磺醛栓

**答案：D**

71.医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

A: 新药信息
B: 药物相互作用
C: 给药途径
D: 禁忌证
**答案：B**

72.粪外观所对应的疾病,霍乱
A: 柏油便，黑色有光泽
B: 米泔水样
C: 白陶土便
D: 暗红果酱色
**答案：B**

73.可单独用于轻度、早期高血压的是
A: 氢氯噻嗪
B: 阿米洛利
C: 甘露醇
D: 呋塞米
**答案：A**

74.某男性，53岁，参加婚礼后5小时突发左脚第一跖趾关节剧痛．3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为500μmol／L；足部X线示非特征性软组织肿胀。
A: 对乙酰氨基酚
B: 尼美舒利
C: 布洛芬
D: 阿司匹林
**答案：A**

75.患者，女，35岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

A：肝毒性

B：心脏相关风险

C：胃肠道反应

D：肾毒性

**答案：C**

76.网站的内容是否及时更新，是衡量互联网信息的

A：权威性

B：新颖性

C：合理性

D：归因性

**答案：B**

77.60岁以上老年人用药剂量应酌减，一般给予成人剂量的

A：45327

B：45356

C：45295

D：45355

**答案：D**

78.可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

A：头孢哌酮

B：特拉唑嗪

C：卡马西平

D: 左氧氟沙星

**答案：B**

79.治疗病毒性腹泻宜选用的药物是

A: 泛昔洛韦

B: 双歧杆菌

C: 庆大霉素

D: 山莨菪碱

**答案：A**

80.苯丙胺中毒的临床表现是（）

A: 心血管毒性

B: 明显的锥体外系症状

C: 肌肉震颤、抽搐

D: 谵妄、躁狂、幻觉

**答案：D**

81.（2018年真题）可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是（）

A: 链霉素

B: 异烟肼

C: 乙胺丁醇

D: 对氨基水杨酸钠

**答案：C**

82.以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

A: 可待因

B: 苯丙哌林

C：羧甲司坦

D：氨溴索

**答案：B**

83.氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（）

A：维生素K1

B：乙酰胺

C：青霉胺

D：纳洛酮

**答案：B**

84.不稳定型心绞痛的药物治疗中，不属于抗凝治疗的药物为

A：低分子肝素

B：肝素

C：替罗非班

D：磺达肝癸钠

**答案：C**

85.（2018年真题）患者,男,80岁,临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是（）

A：睡前服用,注意监测肾功能

B：睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压

C：睡前服用,定期监测肝功能

D：每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

**答案：B**

86.用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。

A: 氯丙嗪

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/795202332114012033