

2023-24 年广东省香洲区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题题库及答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

- 1.（2018 年真题）患者，女，38 岁，已婚，妊娠 2 个月，近日自觉心慌、多汗，查 FT₃、FT₄ 偏高 TSH 0.01mU/L，临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为（）
- A: 维持妊娠，行甲状腺切除手术
 - B: 维持妊娠，选用丙硫氧嘧啶治疗
 - C: 终止妊娠，选用丙硫氧嘧啶治疗
 - D: 维持妊娠，选用甲巯咪唑治疗

答案：B

2. 二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥
- A: 过度治疗用药
 - B: 非适应证用药
 - C: 盲目联合用药
 - D: 超适应证用药

答案：D

3. 在葡萄糖注射液中极易裂解的是
- A: 红霉素
 - B: 苯妥英钠
 - C: 氯化钾
 - D: 青霉素

答案：D

4. 连续应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

- A: 7 天
- B: 10 天
- C: 5 天
- D: 3 天

答案：B

5. 膀胱炎约占尿路感染的 60%以上，致病菌多为（）

- A: 金黄色葡萄球菌
- B: 白色念珠菌
- C: 奈瑟淋病双球菌
- D: 大肠埃希菌

答案：D

6. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- B: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染
- D: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪

答案：B

7. 不能用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: α_1 受体阻断剂
- B: 雄激素
- C: 5-a 还原酶抑制剂
- D: 雄激素受体阻断剂

答案：B

8. 适用于早期、轻度症状者的是

- A: 司来吉兰
- B: 恩托卡朋
- C: 苯海索
- D: 左旋多巴

答案：A

9. 容易引湿的药物是

- A: 胃蛋白酶
- B: 阿扑吗啡
- C: 牛痘菌苗
- D: 青霉素类

答案：A

10. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 左氧氟沙星
- B: 呋喃唑酮
- C: 四环素
- D: 阿莫西林

答案：A

11. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 恩夫韦替
- C: 沙奎那韦
- D: 扎西他滨

答案：D

12. 评价三级信息的标准是

- A: 研究目的是否明确
- B: 作者是否为该领域的专家
- C: 研究方法是否科学合理
- D: 索引的完备程度，刊载杂志的数量

答案：B

13. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 妥布霉素
- B: 链霉素
- C: 新霉素
- D: 奈替米星

答案：C

14. 下列为二级信息源的药学文献

- A: 中国药学文摘
- B: 中国国家处方集
- C: 药学杂志
- D: 药物信息手册

答案：A

15. 下列具有肝药酶抑制作用的药物中，所诱导的酶系类型最多的是

- A: 异烟肼
- B: 咪康唑
- C: 胺碘酮

D: 利福平

答案: C

16. 对 A 组 β 溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

A: 阿奇霉素

B: 克林霉素

C: 阿莫西林

D: 莫西沙星

答案: D

17. 剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A: 阿司匹林

B: 可待因

C: 多奈哌齐

D: 吗啡

答案: B

18. 乙型肝炎的辅助治疗药物不包括

A: CB 维生素 D

B: 维生素

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 谷胱甘肽

答案: A

19. 调剂工作未执行双人核对制度，归属于

A: 患者经济拮据

- B: 管理缺失
- C: 产品缺陷
- D: 操作失误

答案：B

20. 用药期间禁止饮酒则可出现面部潮红、头痛、眩晕等"双硫仑反应"的药品是

- A: 庆大霉素
- B: 青霉素钾
- C: 克林霉素
- D: 甲硝唑

答案：D

21. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

- A: 患者疾病发病时间
- B: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- C: 采取措施干预不良反应的时间
- D: 患者用药记录

答案：C

22. 妊娠 5 个月后用何种抗菌药物会使婴儿牙釉质发育不全、牙齿黄染

- A: 青霉素
- B: 氟喹诺酮类
- C: 大环内酯类
- D: 四环素类

答案：D

23. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是 ()

- A: 阿巴卡韦
- B: 奈韦拉平
- C: 多替拉韦
- D: 洛匹那韦

答案：D

24. 患者，女，78 岁，患有心衰，接受地高辛治疗，为了安全起见，药师定期给患者做血药浓度监测，血药浓度应控制在

- A: $0.5 \sim 0.9 \mu\text{g} / \text{L}$
- B: $2.5 \sim 5.0 \mu\text{g} / \text{L}$
- C: $0.1 \sim 0.4 \mu\text{g} / \text{L}$
- D: $15 \sim 30 \mu\text{g} / \text{L}$

答案：A

25. 抗凝，抗血小板治疗

- A: 华法林
- B: 硝苯地平
- C: 血凝酶
- D: 多非利特

答案：A

26. 属于容积性泻药的药物是

- A: 甘油栓
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 比沙可啶

答案：B

27. 1U 维生素 A 相当于

- A: 3 μ g 维生素 A
- B: 0.03 μ g 维生素 A
- C: 0.3 μ g 维生素 A
- D: 30 μ g 维生素 A

答案：C

28. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 氨茶碱
- B: 速尿
- C: 氨溴索
- D: 吗啡

答案：D

29. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

- A: 右旋糖酐铁(二价铁)
- B: 枸橼酸铁(三价铁)
- C: 琥珀酸亚铁(二价铁)
- D: 乳酸亚铁(二价铁)

答案：B

30. 降钙素属于

- A: 骨形成刺激剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 激素替代剂

答案：B

31. 下列关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述，哪一项是错误的

- A: 咽痛、发热
- B: 药疹、瘙痒
- C: 粒细胞缺乏
- D: 中毒性肝炎

答案：A

32. 处方后记项下包括

- A: 医师签名、药品金额
- B: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- C: 主要实验室数据
- D: 临床诊断、费别

答案：A

33. 马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾间质纤维化
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：B

34. 苯丙胺中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 谵妄、躁狂、幻觉
- C: 明显的锥体外系症状
- D: 心血管毒性

答案：B

35. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 无适应证用药

答案：D

36. 临床急需 70%乙醇 400ml，问需取 95%乙醇的体积是

- A: 290ml
- B: 280ml
- C: 285ml
- D: 295ml

答案：D

37. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: PK/PD 参数法
- B: 一点法和重复一点法
- C: CTP 评分
- D: 稳态一点法

答案：C

38. 可作为轻度痤疮治疗单独一线用药的是

- A: 夫西地酸乳膏
- B: 过氧化苯甲酰凝胶
- C: 维 A 酸凝胶
- D: 水杨酸软膏

答案：C

39. 他汀类与贝特类药物联合使用时，最容易出现的毒性风险是

A: 十二指肠溃疡

B: 输尿管结石

C: 横纹肌溶解

D: 急性心肌梗死

答案：C

40. 感冒初，出现卡他症状，如鼻粘膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A: 含氢溴酸右美沙芬制剂

B: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

C: 含非甾体抗炎药制剂

D: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

答案：D

41. 关于血清总蛋白、白蛋白和球蛋白的叙述正确的是

A: A/G 比值大于 1，提示有慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害、肾病综合征等病变

B: 球蛋白是多种蛋白质的混合物，增高主要以 β -球蛋白增高为主

C: 血清总蛋白为白蛋白和球蛋白之和

D: 白蛋白为急性时相蛋白，在维持血浆胶体渗透压、体内运输、营养方面均起着非常重要的作用

答案：C

42. 下列具有肝药酶诱导作用的药物中，所抑制的酶系类型最多的是

A: 苯妥英钠

- B: 苯巴比妥
- C: 利福平
- D: 卡马西平

答案：C

43. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 左氧氟沙星
- B: 罗红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 克林霉素

答案：A

44. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

- A: 0.5gqd
- B: 0.1gtid
- C: 0.5gtid
- D: 0.2gqd

答案：D

45. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 氨苄西林
- C: 莫西沙星

D: 氧氟沙星

答案：A

46. 白天咳嗽宜选用的药品是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案：C

47. 易经乳汁分泌的药物特性是

A: 脂溶性高

B: 分子量大

C: 蛋白结合率高

D: 弱酸性

答案：A

48. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

A: 右美沙芬

B: 羧甲司坦

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案：D

49. 和缓医疗总的原则不包括（）

A: 有益

B: 无痛苦

C: 不伤害

D: 尊重

答案: B

50. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

A: 单纯雌激素补充治疗

B: 雌孕激素连续联合用药

C: 雌孕激素序贯用药

D: 单纯孕激素补充治疗

答案: C

51. 以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

A: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

B: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效

C: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

D: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少

答案: C

52. 容易水解的药物是

A: 牛痘菌苗

B: 青霉素类

C: 吗啡

D: 胃蛋白酶

答案: B

53. 静脉注射给药的外文缩写是

A: iv

B: im

C: ivgtt

D: i. h

答案：A

54. (血常规检查异常的病症) 恶性肿瘤

A: 淋巴细胞增多

B: 血小板增多

C: 白细胞增多

D: 红细胞沉降率减慢

答案：C

55. 导致心脑血管事件的是

A: 阿托伐他汀

B: 罗非昔布

C: 加替沙星

D: 己烯雌酚

答案：B

56. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

A: 胰蛋白酶？

B: 胃蛋白酶？

C: 门冬酰胺酶？

D: 凝血酶？

答案：A

57. 主要用于降低三酰甘油的药物是

A: 他汀类

B: 考来烯胺

C: 普罗布考

D: 贝丁酸类

答案: D

58. 患者,男,49岁,近1个月出现血压升高, BP155/95mmHg,同时伴有高尿酸血症,血尿酸 508 $\mu\text{mol/L}$ 。使用别嘌醇 100mgbid,氯沙坦钾 50mgqd,碳酸氢钠 1gtid 治疗。关于该患者用药指导的说法,正确的是()

- A: 别嘌醇用药后可出现眩晕,用药后不宜驾车
- B: 氯沙坦钾可引起血尿酸升高
- C: 严格限制蛋白质的摄入,每天不超过 0.6g/kg
- D: 关节疼痛时可选用贝诺酯止痛

答案: A

59. 患者,女,44岁,半年前诊断为支气管哮喘,间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗,没有规律用药治疗。近日,因秋冬季节交替,出现明显喘憋、话不成句,被紧急送往医院。

- A: 福莫特罗干粉吸入剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

答案: D

60. 肝硬化患者应用利多卡因,可引起严重中枢神经系统疾病,引起药源性疾病的因素主要为

- A: 性别因素
- B: 年龄因素
- C: 遗传因素
- D: 基础疾病因素

答案：D

61. 巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

- A: 叶酸片
- B: 维生素 B12
- C: 苯妥英钠注射液
- D: 硫酸亚铁片

答案：B

62. “主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

- A: 最小成本分析方法
- B: 成本—效益分析方法
- C: 成本—效用分析方法
- D: 最大效果分析方法

答案：A

63. (2017 年真题) 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是 ()

- A: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪
- B: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- D: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面, 以防创面感染

答案：B

64. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

- A: 茶碱
- B: 蛋白质

C: 鞣酸

D: 咖啡因

答案: C

65. 关于 TIA 的药物治疗说法不正确的是

A: 小剂量肠溶阿司匹林能一定程度上降低卒中再发

B: 抗凝治疗为非心源性 TIA 的常规治疗

C: 对伴发房颤、风湿性二尖瓣病变的患者建议选用华法林抗凝治疗

D: 对反复发生 TIA 的患者应首先考虑选用抗血小板药物

答案: B

66. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于()。

A: 发药环节

B: 接待投诉环节

C: 药品储存环节

D: 调配处方环节

答案: A

67. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是()

A: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

B: 青霉素与 5%葡萄糖注射液

C: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液

D: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液

答案: A

68. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

A: 四环素

- B: 青霉素
- C: 链霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

69. 简化治疗方案，有利于
- A: 健康生活方式的教育
 - B: 提高用药顺应性
 - C: 转变疾病预防和保健观念
 - D: 识别及管理多重用药

答案：B

70. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是
- A: 血糖升高
 - B: 高钾血症
 - C: 定向力障碍、意识混乱
 - D: 低镁血症

答案：D

71. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

- A: 很可能
- B: 可能
- C: 可能无关
- D: 肯定

答案：D

72. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 多沙唑嗪
- C: 坦索罗辛
- D: 奥昔布宁

答案：D

73. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

- A: 1~1.5 小时
- B: 2~3 小时
- C: 0.5~1 小时
- D: 1.5~2 小时

答案：B

74. 常见老年人 ADR 的药物类别，阿托品、苯海索等致尿潴留

- A: 抗生素
- B: 钙通道阻滞剂
- C: 抗胆碱药
- D: β 受体阻断剂

答案：C

75. 及时发现重大药害事件，即可防止药害事件蔓延和扩大

- A: 减少 ADR 的危害
- B: 促进临床合理用药
- C: 为临床药物评价提供依据
- D: 促进新药的研制开发

答案：A

76. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

- A: 针对革兰阴性杆菌可用氨基糖苷类
- B: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用
- C: 对于清洁手术（I 类切口），通常不需预防用抗菌药物
- D: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨基糖苷类预防感染

答案：D

77. 依照药品不良反应程度分级标准，以下属于“中度药品不良反应”的是

- A: 重要器官有严重损害
- B: 症状不发展
- C: 不良反应症状明显
- D: 一般无需治疗

答案：C

78. 高血压首选的利尿剂是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：C

79. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施

- A: 静脉药物配置
- B: 处方审核
- C: 处方点评
- D: 治疗药物监测

答案：C

80. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 小檗碱
- B: 胰酶
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 碳酸氢钠

答案：B

81. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 呋喃唑酮
- B: 克林霉素
- C: 庆大霉素
- D: 依替米星

答案：A

82. 属于 H₂ 受体拮抗剂的是 ()

- A: 法莫替丁
- B: 多潘立酮
- C: 铝碳酸镁
- D: 埃索美拉唑

答案：A

83. 为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 淋巴细胞
- C: 嗜酸性粒细胞
- D: 中性粒细胞

答案：D

84. 患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用阿托伐他汀钙片
- B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：A

85. 引起急性支气管炎的常见病原体是

- A: 呼吸道合胞病毒
- B: 结核杆菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 肺炎链球菌

答案：A

86. “根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

- A: 流行病学的调查
- B: 致病药物的确定
- C: 询问用药过敏史和家族史
- D: 排除药物以外的因素

答案：B

87. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 利多卡因
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 苯妥英钠

答案：C

88. 轻度支气管哮喘的临床表现不包括

- A: 心率增快 >120 次 / 分
- B: 有焦虑
- C: 呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音
- D: 步行或上楼时气短

答案：A

89. 清洁手术的预防用药时间不超过

- A: 12 小时

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 24 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/795210210131012033>