

2024 年广东省广宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题大全完整参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性痛风性关节炎期首选药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 别嘌醇

答案：B

2. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 卡托普利
- B: 福辛普利
- C: 缬沙坦
- D: 拉贝洛尔

答案：D

3. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

- A: 腋下温度超过 36.6℃
- B: 口腔温度超过 37.0℃

C: 口腔温度超过 37.3℃

D: 直肠温度超过 36.3℃

答案: C

4. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期 12h 的药物通常选择()

A: 每个半衰期给药 1 次

B: 静脉滴注给药

C: 每日给药 1 次

D: 2~3 个半衰期给药 1 次

答案: A

5. 患者,男,56 岁,体检发现血尿酸 530 $\mu\text{mol/L}$ (参考值 $<420 \mu\text{mol/L}$),患者向药师咨询维生素使用问题,药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是()

A: 维生素 B2

B: 维生素 B6

C: 维生素

D: 维生素 B12

答案: C

6. 老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎,主要是因为老年人()。

A: 血浆蛋白含量降低,使游离性药物增加

B: 消化腺分泌减少,药物吸收增加

C: 对药物处于高敏状态,影响中枢神经系统的功能

D: 肾功能降低,药物半衰期延长,耳、肾毒性增加

答案: D

7. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT3，FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100mg，qd，晚餐后顿服
- B: 100 μ g，qd，早餐前半小时，顿服
- C: 100 μ g，qd，早餐后半小时，顿服
- D: 100mg，qd，睡前顿服

答案：B

8. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

- A: 复杂部分性发作
- B: 失神发作
- C: 肌阵挛发作
- D: 简单部分性发作

答案：B

9. 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是()

- A: 哌替啶
- B: 甲睾酮
- C: 可卡因
- D: 人促红素

答案：D

10. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A: 双向交流作用

- B: 药物警戒作用
- C: 应对投诉作用
- D: 用药监督作用

答案：A

11. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 叶酸
- B: 阿托伐他汀
- C: 福辛普利
- D: 二甲双胍

答案：B

12. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

- A: 患者身份证明编号
- B: 临床诊断
- C: 患者姓名、性别
- D: 药品名称、剂型、规格、数量

答案：A

13. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- B: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- C: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- D: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

答案：B

14. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

- A: 乙琥胺
- B: 扑米酮
- C: 加巴喷丁
- D: 卡马西平

答案：D

15. 药物代谢酶系不成熟或分泌不足，2 周后肝功能趋于完备可影响

- A: 药物排泄
- B: 药物中毒
- C: 药物代谢
- D: 药物吸收

答案：C

16. (用药导致的血常规异常)阿司匹林

- A: 血小板减少
- B: 中性粒细胞减少
- C: 血红蛋白量增多
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：A

17. 癫痫患者禁用下列哪种抗焦虑药物（）

- A: 氯米帕明
- B: 曲唑酮
- C: 艾司唑仑
- D: 舍曲林

答案：A

18. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- B: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- C: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少
- D: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高

答案：C

19. 因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 青霉素
- C: 克拉霉素
- D: 亚胺培南

答案：C

20. 患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢吡肟
- D: 氨苄西林

答案：A

21. 乳母服用华法林,乳汁中几乎不会含有华法林的机制是其

- A: 呈弱碱性
- B: 解离度大
- C: 在母体血浆中处于结合状态
- D: 呈弱酸性

答案：C

22. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

- A: 慢性肾衰竭
- B: 溶血性贫血
- C: 粒细胞减少症
- D: 消化性溃疡

答案：C

23. 适用于肝性脑病及长期卧床的老年便秘患者的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖
- D: 甘油栓

答案：C

24. （2016 年真题）患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌（LES）压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏
- B: 适宜餐前 30 分钟服用
- C: 应整片吞服
- D: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

答案：A

25. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 沙丁醇胺
- B: 维生素 B1
- C: 硫酸镁
- D: 噻氯匹定

答案：A

26. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是()

- A: 利伐沙班
- B: 肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：D

27. 二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

- A: 盲目联合用药
- B: 超适应证用药
- C: 非适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：B

28. 具有降低 TC、LDL-C 和 TG，升高 HDL-C 的作用的是（）

- A: 烟酸类
- B: 他汀类
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：A

29. (2018 年真题) 患者, 男, 65 岁, 因腹胀, 呕吐就诊, 医生处方, 甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于 ()

- A: 有配伍禁忌
- B: 有禁忌证用药
- C: 用法、用量不适宜
- D: 无适应证用药

答案: C

30. 一般情况下, 以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施, 洗胃液每次的用量为

- A: 最多不超过 200ml
- B: 最多不超过 300ml
- C: 最多不超过 400ml
- D: 最多不超过 500ml

答案: D

31. 5-HT

- A: 舍曲林
- B: 阿米替林
- C: 丁螺环酮
- D: 艾司唑仑

答案: C

32. 可致齿龈增生的抗癫痫药为 ()

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠

D: 苯巴比妥

答案: B

33. 化疗前血常规检查患者白细胞计数 $<2.0 \times 10^9 / L$ 或粒细胞计数 $<1.0 \times 10^9 / L$ ，可给予

A: 白介素-11(IL-11)

B: 昂丹司琼

C: 人粒细胞巨噬细胞刺激因子(GM—CSF)

D: 甲氧氯普胺

答案: C

34. 患者，女，32 岁，妊娠 20 周。1 天前发热，体温 39.8°C ，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

A: 金刚烷胺片

B: 利巴韦林片

C: 奥司他韦胶囊

D: 阿昔洛韦片

答案: C

35. (2018 年真题) 患者,男,57 岁,化验结果:TC 4.6mmol/L (参考值 $<5.2\text{mmol/L}$),TG 11.0mmol/L (参考值 $0.56\text{—}1.70\text{mmol/L}$) 尿酸 508umol/L (参考值 $<420\text{umol/L}$),应首选的调脂药物为 ()

A: 烟酸

B: 考来烯胺

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：C

36.（2018 年真题）患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A：立刻舌下含服硝酸甘油片
- B：立刻喝白开水 200mL
- C：立刻口服糖水或糖块
- D：立刻服用美托洛尔片

答案：C

37. 糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

- A：培氟沙星
- B：头孢哌酮
- C：加替沙星
- D：培高利特

答案：C

38.（2019 年真题）夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

- A：含漱剂
- B：滴眼剂
- C：软膏剂
- D：直肠栓剂

答案：D

39.（2017 年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（）

- A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- D: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：C

40. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.50~0.70
- B: 0.01~0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03~0.08

答案：A

41. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 左旋咪唑
- C: 碳酸锂
- D: 碘化钾

答案：A

42. 易吸湿的药品

- A: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装
- B: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- C: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处
- D: 可贮存于严密的药箱内

答案：B

43. 属于护士用药咨询的是

- A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- B: 抗菌药物的合理应用
- C: 注射剂溶媒的正确选择
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：C

44. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

- A: E 级
- B: C 级
- C: D 级
- D: B 级

答案：D

45. 进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: III 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: 临床预试验

答案：A

46. 可引起尿液碱度降低的疾病是

- A: 应用碳酸氢钠
- B: 肾小管性酸中毒
- C: 呼吸性碱中毒
- D: 痛风

答案：D

47. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

- A: 硝苯地平
- B: 利伐沙班
- C: 胺碘酮
- D: 去乙酰毛花苷

答案：D

48. 药学服务的对象

- A: 护理人员
- B: 广大公众
- C: 医务人员
- D: 血液透析者

答案：B

49. 患者，女，57 岁，患骨质疏松症伴 Paget 病，该患者避免使用的治疗药是

- A: 鲑鱼降钙素
- B: 特立帕肽
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 雷洛昔芬

答案：B

50. 描述是否充分、详细、准确是评价

- A: 结果
- B: 讨论
- C: 前言
- D: 摘要

答案：A

51. 维生素 B12 注射剂每次肌肉注射 50~200 μg ，每支规格标识为 0.1mg，药师应告知患者每次注射

- A: 2~6 支
- B: 1 / 2~2 支
- C: 1~2 支
- D: 4~6 支

答案：B

52. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

- A: 清晨
- B: 餐中
- C: 餐后
- D: 餐前

答案：B

53. (2019 年真题) 患者，女，67 岁，出现认知功能障碍 5 年诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是

- A: 氯化铵
- B: CYP2D6 抑制剂
- C: CYP3A4 抑制剂
- D: 碳酸氢钠

答案：D

54. 服用伐地那非后，如果舌下含服硝酸异山梨酯，建议服药间隔时间应为

- A: 48 小时
- B: 24 小时
- C: 1 周
- D: 4 小时

答案：B

55. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 维生素 C
- B: 青霉素
- C: 非那雄胺
- D: 门冬胰岛素

答案：C

56. 后记

- A: 临床诊断、费别
- B: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- C: 医师签名、药品金额
- D: 主要实验室数据

答案：C

57. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

- A: B 级
- B: E 级
- C: C 级
- D: D 级

答案：A

58. 早餐前半小时服用的药物是（）

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 雷贝拉唑
- C: 瑞巴派特
- D: 吉法酯

答案：B

59. （2015 年真题）妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是（）。

- A: 妊娠 13～27 周
- B: 妊娠 28～32 周
- C: 妊娠 3～12 周
- D: 妊娠 1～2 周

答案：C

60. （2018 年真题）患者，女，30 岁，既往体健，无癫痫病史怀孕 8 个月，突然出现抽搐，从小腹开始，发展至全身，口唇发绀，意识丧失，诊断为子痫，应选用的治疗方法是（）

- A: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- B: 50%硫酸镁溶液口服
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 50%葡萄糖注射液湿敷

答案：C

61. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：C

62. 餐前服用，可以促进胃排空的药品是

- A: 瑞舒伐他汀片
- B: 二甲双胍片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 复方铝酸铋片

答案：C

63. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 宜空腹服用
- B: 胃肠道反应
- C: 静脉炎
- D: 过敏，白细胞减少

答案：B

64. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班

D: 阿司匹林

答案: D

65. 临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

A: 5

B: 6

C: 10

D: 12

答案: B

66. 对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

A: 谷胱甘肽

B: 乙酰半胱氨酸

C: 纳洛酮

D: 二巯丁二钠

答案: B

67. 药师在指导合理用药时应正确交代给药途径和给药方法，下列交代的内容中错误的是

A: 活菌制剂不能用超过 40% 的水送服

B: 肠溶片需整片吞服，不宜嚼碎服用

C: 栓剂是外用制剂，不可口服

D: 泡腾片可以溶解于温开水中服用，也可以作为咀嚼片服用

答案: D

68. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：C

69. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

A: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱

B: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

C: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

答案：B

70. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

A: 皮脂腺囊肿

B: 晚期顽固性卵巢癌

C: 晚期顽固性膀胱癌

D: 非精原细胞性生殖细胞癌

答案：A

71. 异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 肺纤维化

C: 溶血性尿毒症

D: 心脏毒性

答案：A

72. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

- A: 必须减量应用
- B: 避免使用
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 一般无需调整剂量

答案：A

73. 复方铝酸铋

- A: 宜清晨服用
- B: 宜餐后服用
- C: 宜餐前服用
- D: 宜睡前服用

答案：C

74. 患活动性消化性溃疡，禁用的调脂药是

- A: 烟酸类
- B: 氯贝丁酯
- C: 依折麦布
- D: 辛伐他汀

答案：A

75. 归属于用药记录的是

- A: 主要实验室检查数据
- B: 对药物治疗的建设性意见
- C: 主治医师签名
- D: 同时合并应用的药品

答案：D

76. 以下抗抑郁药物的合理使用中，叙述不正确的是（）

- A: 从小剂量开始
- B: 个体化用药
- C: 显效慢即换药
- D: 尽可能单一用药

答案：C

77. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 复方利血平
- B: 甲氧氯普胺
- C: 氯苯那敏
- D: 地高辛

答案：B

78. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用二甲双胍肠溶片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案：A

79. 有家族血栓栓塞性疾病史人群禁用的痤疮药是

- A: 米诺环素
- B: 过氧化苯甲酰
- C: 维 A 酸

D: 口服短效避孕药

答案：D

80. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

A: ACEI

B: β 受体拮抗剂

C: AR

D: 利尿药

答案：A

81. 新生儿应用氯霉素可引起

A: 核黄疸

B: 新生儿溶血

C: 高胆红素血症

D: 灰婴综合征

答案：D

82. 依据“处方”的含义及其重要意义，属于处方范畴的医疗文书是

A: 病区领药单

B: 病区用药医嘱单

C: 临床诊断书

D: 药品出库单

答案：B

83. 如“齐二药事件”

A: 药品上市前风险评估

B: 发现与规避假、劣药流入市场

C: 药品上市后风险评估

D: 发现药品质量问题

答案: B

84. 心衰导致药物经肾排泄减少

A: 肾小管重吸收增加

B: 肾小球滤过减少

C: 肾小管分泌减少

D: 肾血流量减少

答案: D

85. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选择的联合用药方案是

A: β 受体阻断剂+ARB

B: 利尿剂+CCB

C: 利尿剂+AR

D: α 受体阻断剂+ACEI

答案: B

86. 可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状哺乳期妇女不宜选用的药物是 ()

A: 氯霉素

B: 左炔诺孕酮

C: 链霉素

D: 依那普利

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 应用抗生素头孢哌酮时宜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/795311210122012033>