专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024江苏省盱眙县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题真题附答案（满分必刷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.青霉素G

A：抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

B：对G+、G-球菌，特别是对G-杆菌有效

C：对支原体有效

D：对G+、G-球菌及螺旋体等有效

答案：D

2.丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

A：子宫内膜突破性出血

B：代谢加快而失效

C：抑制排酸作用

D：代谢加速而导致意外怀孕

答案：C

3.患者，男，70岁。进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

A：胶体果胶铋胶囊

B：替米沙坦

C：埃索美拉唑钠

D：美托洛尔

答案：A

4.氯霉素的抗菌作用机制是

A: 阻止氨基酰-tRNA与细菌核糖体30S亚基结合，影响蛋白质的合成

B: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

C: 与细菌核糖体50S亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

D: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

答案：C

5.对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A: 干扰叶酸合成

B: 抑制分枝菌酸的生物合成

C: 抑制DNA回旋酶

D: 抑制蛋白质合成

答案：A

6.属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 赖氨酸

答案：D

7.抑制蛋白质合成的起始阶段，使核蛋白体分解

A: 紫杉醇

B: 高三尖杉酯碱

C: 氟尿嘧啶

D: 顺铂

答案：B

8.急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用()

A：2%过氧化氮溶液

B：3%酚甘油滴耳液

C：2%酚甘油滴耳液

D：3%过氧化氢溶液

答案：C

9.司坦唑醇的禁忌证不包括

A：男性乳腺癌

B：严重心功能不全

C：前列腺增生

D：肾炎

答案：B

10.（2021年真题）关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SLG-2）抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是（）

A：降糖作用不依赖于胰岛B细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性

B：降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响

C：重度肾功能不全患者禁用

D：适用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒

答案：D

11.可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

A：克霉唑

B：环丙沙星

C：咪康唑

D: 灰黄霉素

答案：B

12.下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

A: 甲氨蝶呤

B: 西咪替丁

C: 氟尿嘧啶

D: 长春新碱

答案：B

13.下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案：B

14.呋布西林()

A: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

B: 特别对铜绿假单胞菌有效

C: 对G

D: 对G

答案：B

15.喷托维林为中枢性镇咳药。

A: 沙丁胺醇

B: 喷托维林

C: 氨溴索

D：噻托溴铵

答案：B

16.治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

A：氨氯地平

B：氯沙坦

C：比索洛尔

D：硝酸异山梨酯

答案：A

17.属于抗甲状腺药的是

A：醋酸去氨加压素

B：甲巯咪唑

C：生长抑素

D：左甲状腺素

答案：B

18.体内缺乏维生素B1会导致

A：不孕症

B：脂溢性皮炎

C：贫血

D：脚气病

答案：D

19.（2017年真题）可能导致牙龈出血的药物是（）

A：拉西地平

B：依诺肝素

C：普萘洛尔

D: 普伐他汀

答案：B

20.增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

A: 瑞格列奈

B: 阿卡波糖

C: 罗格列酮

D: 那格列奈

答案：C

21.下述药物中，不属于促动力药的是

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 氢氧化铝

答案：D

22.下列情况不应首选红霉素的是()

A: 白喉带菌者

B: 支原体肺炎

C: 肠道痢疾杆菌感染

D: 军团菌肺炎

答案：C

23.骨髓抑制较严重的是

A: 顺铂

B: 卡铂

C: 奥沙利铂

D: 亚叶酸钙

答案：B

24.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片20mg／d治疗。

A: 40mg

B: 100mg

C: 20mg

D: 80mg

答案：D

25.一日1次固定时间给药的是

A: 谷赖胰岛素

B: 门冬胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 赖脯胰岛素

答案：C

26.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次／日。

A: 多潘立酮

B: 胰酶

C: 莫沙必利

D: 甲氧氯普胺

答案：B

27.主要用于预防静脉血栓的口服药物是

A：尿激酶

B：低分子肝素

C：华法林

D：链激酶

答案：C

28.作用于微管的抗肿瘤药物是

A：来曲唑

B：紫杉醇

C：依托泊苷

D：顺铂

答案：B

29.属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

A：吗啡

B：秋水仙碱

C：布洛芬

D：哌替啶

答案：D

30.夜盲症患者应选用的维生素是

A：维生素A

B：维生素B

C：维生素D

D：维生素B

答案：A

31.对抗香豆素过量引起的出血可选用()

A：垂体后叶素

B：维生素

C：鱼精蛋白

D：维生素K

答案：D

32.（2016年真题）属于a-葡萄糖苷酶抑制剂的是

A：阿卡波糖

B：艾塞那肽

C：那格列奈

D：二甲双胍

答案：A

33.（2016年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

A：共济失调

B：血管舒张

C：心率减慢

D：血压升高

答案：D

34.胺碘酮抗心律失常的作用机制是()

A：提高窦房结和普肯耶纤维的自律性

B：阻滞心肌细胞的Na

C：缩短心房和普肯耶纤维的动作电位时程、有效不应期

D：加快普肯耶纤维和窦房结的传导速度

答案：B

35.变异型心绞痛不宜选用的是

A：硝酸甘油

B：硝苯地平

C：普萘洛尔

D：胍乙啶

答案：C

36.对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

A：利卡多因

B：奎尼丁

C：普萘洛尔

D：维拉帕米

答案：A

37.可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

A：氨基糖苷类

B：四环素类

C：氟喹诺酮类

D：大环内酯类

答案：C

38.减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是（）

A：α 受体

B：M 受体

C：H 受体

D：N 受体

答案：A

39.铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

A：头孢他啶

B：利奈唑胺

C：罗红霉素

D：头孢曲松

答案：A

40.具有强大的抗凝血因子ⅩA功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

A：那屈肝素钙

B：阿加曲班

C：华法林

D：尿激酶

答案：A

41.袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A：依他尼酸

B：托拉塞米

C：布美他尼

D：呋塞米

答案：C

42.肝功能不全、哺乳期妇女禁用()

A：利福平

B：夫西地酸

C：氯霉素

D：四环素可的松

答案：B

43.作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是()

A：克拉维酸

B：阿莫西林

C：亚胺培南

D：氨曲南

答案：B

44.使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

A：1日

B：5日

C：7日

D：3日

答案：D

45.属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

A：门冬胰岛素

B：精蛋白锌胰岛素

C：普通胰岛素

D：甘精胰岛素

答案：A

46.局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

A：先兴奋，后抑制

B：心律失常

C：心缩力增强

D：血压下降

答案：C

47.利多卡因

A：可治疗阵发性室上性心动过速

B：为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常

C：可治疗房性期前收缩

D：可用于房颤的复律治疗和复律后的维持

答案：B

48.对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

A：氯化钾、葡萄糖注射液

B：利尿剂

C：阿托品

D：苯妥英钠

答案：B

49.抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用

A：氢氧化铝

B：氢氧化镁

C：三硅酸镁

D：碳酸钙

答案：C

50.代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

A: 干扰素
B: 奥司他韦
C: 阿昔洛韦
D: 阿糖腺苷
答案：B

51.关于美罗培南使用的叙述，正确的是
A: 一天一次给药
B: 肝功能不全患者应用需调整剂量
C: 所致肾功能损害和恶心、呕吐等胃肠道反应较亚胺培南少
D: 癫痫等中枢神经系统不良反应发生率与亚胺培南相似
答案：C

52.变异型心绞痛不宜选用
A: 普萘洛尔
B: 维拉帕米
C: 地尔硫
D: 硝苯地平
答案：A

53.患者，男，55岁。1小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B型超声波检查：肾结石。
A: 镇痛和解痉作用
B: 增加解痉作用
C: 防止成瘾
D: 增加镇痛作用
答案：A

54.儿童使用阿托品最低致死量为

A：5mg

B：10mg

C：80mg～130mg

D：50mg

答案：B

55.全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

A：金刚烷胺

B：阿昔洛韦

C：阿糖腺苷

D：碘苷

答案：D

56.阿糖胞苷、吉西他滨属于()

A：DNA多聚酶抑制剂

B：核苷酸还原酶抑制剂

C：二氢叶酸还原酶抑制剂

D：胸腺核苷合成酶抑制剂

答案：A

57.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A：不会导致Q～T间期延长及室性心律失常

B：不会导致锥体外系反应

C：不会导致催乳素增多

D：不会促进乙酰胆碱的释放

答案：D

58.防止急性血栓的首选药物是

A：维生素B

B：肝素

C：维生素K

D：香豆素类

答案：B

59.中和胃酸的药物是()

A：雷尼替丁

B：氢氧化铝

C：哌仑西平

D：奥美拉唑

答案：B

60.治疗青光眼宜选用

A：左氧氟沙星滴眼液

B：毛果芸香碱滴眼液

C：碘苷滴眼液

D：复方托吡卡胺滴眼液

答案：B

61.前列腺素类似物的降眼压机制是

A：开放小梁网

B：浓缩玻璃体

C：增加巩膜葡萄膜通路房水外流

D：减少房水生成

答案：C

62.患儿，女，8岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A：头孢菌素类

B：氨基糖苷类

C：喹诺酮类

D：四环素

答案：B

63.通过降低血管平滑肌内钠离子浓度，使细胞内钙离子减少的是

A：氢氯噻嗪

B：拉贝洛尔

C：卡托普利

D：肼屈嗪

答案：A

64.下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的是

A：他克莫司

B：青霉素

C：环孢素

D：华法林

答案：B

65.下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

A：与麻黄碱合用

B：与他汀类药物合用

C：与西地那非合用

D：与硝普钠合用

答案：B

66.四环素类的主要作用靶点是

A：核糖体的30S亚基

B：核糖体的50S亚基

C：细胞内膜PBP

D：细胞壁丙氨酰丙氨酸

答案：A

67.（2018年真题）具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A：普通胰岛素注射液

B：甘精胰岛素注射液

C：预混胰岛素注射液

D：精蛋白锌胰岛素注射液

答案：B

68.唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

A：大剂量阿托伐他汀

B：小剂量阿托伐他汀

C：小剂量氟伐他汀

D：依折麦布

答案：D

69.用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A：乙胺丁醇

B：链霉素

C：异烟肼

D：利福平

答案：D

70.目前首选的口服减肥药是

A：阿仑膦酸钠

B：鲑降钙素

C：奥利司他

D：阿法骨化醇

答案：C

71.促进钙剂吸收可选用

A：依降钙素

B：阿仑膦酸钠

C：阿法骨化醇

D：葡萄糖酸钙

答案：C

72.（2017年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰脲类抗癫药的是（）

A：苯巴比妥

B：加巴喷丁

C：苯妥英钠

D：卡马西平

答案：C

73.（2017年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

A：利血平

B：阿昔莫司

C：瑞舒伐他汀

D：依折麦布

答案：C

74.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A：抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

B：抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

C：抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

D：促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素

答案：A

75.可抑制血小板聚集和释放的药物是

A：肝素

B：尿激酶

C：华法林

D：噻氯匹啶

答案：D

76.卡泊芬净属于()

A：唑类抗真菌药

B：棘白菌素类抗真菌药

C：多烯类抗真菌药

D：丙烯胺类抗真菌药

答案：B

77.通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

A：茶碱

B：华法林

C：地高辛

D：丙戊酸钠

答案：B

78.与青霉素相比，阿莫西林()

A：对革兰阴性杆菌作用强

B：对耐药金黄色葡萄球菌有效

C：对革兰阳性细菌的抗菌作用强

D：对 β-内酰胺酶稳定

答案：A

79.根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A：上午8时左右

B：中午12时左右

C：下午4时左右

D：晚餐前

答案：A

80.作用于 γ-氨基丁酸受体的药物是

A：卡马西平

B: 苯妥英钠

C: 苯巴比妥

D: 佐匹克隆

答案：D

81.入睡困难患者首选哪种催眠药物

A: 劳拉西泮

B: 艾司唑仑

C: 谷维素

D: 氯硝西泮

答案：B

82.关于茶碱给药途径叙述不正确的是

A: 空腹口服吸收快

B: 灌肠吸收慢

C: 进餐时或餐后服药，吸收较慢

D: 肌注有刺激性

答案：B

83.华法林是消旋体，由S-华法林和R-华法林组成，二者的抗凝作用是

A: 二者抗凝作用等效

B: S-华法林的抗凝作用约是R-华法林的5倍

C: 二者抗凝作用关系不确定

D: R-华法林的抗凝作用约是S-华法林的5倍

答案：B

84.口服吸收差，血药浓度低，仅适用于肠道感染及下尿路感染的是()

A：呋喃唑酮

B：诺氟沙星

C：甲氧苄啶

D：磺胺嘧啶

答案：A

85.（2021年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（）e

A：羟甲唑啉

B：氨溴索

C：西地碘

D：度米芬

答案：D

86.对抗香豆素类过量引起出血可选用

A：垂体后叶素

B：维生素

C：鱼精蛋白

D：维生素K

答案：D

87.伊曲康唑属于

A：抗生素类

B：唑类

C：吗啉类

D：丙烯胺类

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/795341323114012033