

同等学力申硕-临床病理学-系统病理学--消化系统疾病(A型题 5)

[单选题]1. 胃癌最常见的症状是

- A. 恶心、呕吐
- B. 食欲不振
- C. 上腹痛
- D. 消瘦
- E. 发热

正确答案：C

[单选题]2. 上消化道出血，（江南博哥）其粪便可呈

- A. 果酱便
- B. 鲜血便
- C. 柏油便
- D. 脓血便
- E. 洗肉水样便

正确答案：C

[单选题]3. 确定幽门螺杆菌根除的试验应在抗幽门螺杆菌治疗后何时进行

- A. 2周
- B. 治疗完成时
- C. 4周
- D. 3个月
- E. 6个月

正确答案：C

[单选题]4. 男性 45 岁，饮酒 20 余年，3 两白酒 / d，查体肝肋下 2.0cm，脾肋下 5.0cm，化验外周血三系均减少，最可能的原因为

- A. 骨髓合成抑制
- B. 脾功能亢进
- C. 营养吸收障碍
- D. 细菌感染，毒素作用
- E. 消化道少量出血

正确答案：B

[单选题]5. 男 50 岁，半年来反复出现腹泻，粪便糊样，时有腹泻和便秘交替。检查轻度贫血貌，右下腹部可扪及肿块。胃肠 X 线检查示回盲部钡剂充盈缺损，考虑最不像哪个病

- A. Crohn 病
- B. 结肠癌
- C. 血吸虫病性肉芽肿
- D. 肠结核
- E. 慢性溃疡性结肠炎

正确答案：E

[单选题]6. 男，68岁，持续性上腹部隐痛3个月，多次大便隐血阳性，消瘦，查体：上腹部压痛，未触及包块。下列哪项检查对确诊有帮助

- A. 胃镜伴活检
- B. 肝放射性核素扫描
- C. 胃酸测定
- D. B型超声检查
- E. 血清促胃液素测定

正确答案：A

[单选题]7. 男，62岁，10年前诊断为慢性乙型肝炎，3小时前突然呕鲜血约1000ml来院，既往有冠心病史10年。查体：贫血貌，BP：90/60mmHg，P120/min，肝肋下未触及，脾肋下3cm。血红蛋白60g/L，红细胞 $2.6 \times 10^9 / L$ ，血小板 $55 \times 10^9 / L$ 。应采取的紧急止血措施不包括

- A. 血管升压素静脉滴注
- B. 奥美拉唑静脉滴注
- C. 食管静脉套扎术
- D. 内镜直视注射硬化剂
- E. 奥曲肽静脉滴注

正确答案：A

[单选题]8. 男，50岁，间断性腹泻20余年，加重3个月，大便每日4~5次，不成形，近日纳差，体重明显减轻，化验便隐血阳性，确诊的最佳手段为

- A. 便找癌细胞
- B. 血液生化
- C. 结肠镜检查
- D. 腹部CT检查
- E. 腹部超声检查

正确答案：C

[单选题]9. 男，25岁，因反复上腹痛而间断服用H2RA治疗。停药数周后症状再发，医生建议其行内镜检查，在检查前1周自服PPI治疗，症状改善。胃镜提示：十二指肠球部溃疡变形，Hp尿素酶试验(-)。下列哪项叙述最恰当

- A. 该患者应行 ^{13}C -尿素呼气试验
- B. 该患者患Hp(-)的十二指肠溃疡
- C. 应从胃窦和胃体取活检标本行病理学Hp染色
- D. 该患者仅用PPI可能不能完全愈合
- E. 应行血清学Hp抗体检查

正确答案：C

[单选题]10. 男，25岁，节律性间断上腹隐痛3年，加重2天，10小时前开始黑便3次，量约1000g，P120/min，Hb90g/L，首选下列哪种治疗

- A. 输右旋糖酐
- B. 给予升压药
- C. 外科手术
- D. 上消化道造影检查
- E. 输血、补液，纠正血容量不足

正确答案：E

[单选题]11. 溃疡性结肠炎最严重的并发症是

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 结肠假息肉形成
- C. 结肠狭窄
- D. 中毒性结肠扩张
- E. 肛门直肠周围脓肿

正确答案：D

[单选题]12. 溃疡性结肠炎的完整诊断包括

- A. 临床类型、病变范围、严重程度、病情分期
- B. 严重程度、病变范围、临床类型、是否激素依赖
- C. 严重程度、病情分期、病变范围、是否激素依赖
- D. 病程、病变范围、是否激素依赖
- E. 急性或慢性、病情分期、病变范围、是否激素依赖

正确答案：A

[单选题]13. 急性胰腺炎可有

- A. 上腹部或右上腹部阵发加剧的持续疼痛
- B. 突发剑突下剧烈疼痛、阵发性伴钻顶感，间歇期不痛
- C. 上腹持续剧痛伴左肩、腰、背牵拉痛
- D. 餐后上腹胀痛、伴呕吐
- E. 与饮食有关的慢性周期性节律性上腹痛

正确答案：C

[单选题]14. 急性胰腺炎患者淀粉酶测定下列各项中不正确的是

- A. 尿淀粉酶升高比血淀粉酶晚
- B. 血淀粉酶在起病后 6~12 小时开始升高
- C. 血淀粉酶持续 3~5 天
- D. 尿淀粉酶持续 7~14 天
- E. 淀粉酶的高低一定能反映病情的轻重

正确答案：E

[单选题]15. 急性胰腺炎发病 12 小时以内，哪一项实验室检查诊断比较准确

- A. 血糖
- B. 血钙
- C. 血淀粉酶

- D. 血脂肪酶
- E. 尿淀粉酶

正确答案：C

[单选题]16. 急性胰腺炎产生休克的主要原因是

- A. 低血容量休克
- B. 失血性休克
- C. 神经性休克
- D. 心源性休克
- E. 过敏性休克

正确答案：A

[单选题]17. 急性坏死性胰腺炎时，下列哪项检查结果正确

- A. 血清脂肪酶早期升高
- B. 血清淀粉酶均升高
- C. 血糖升高
- D. 血钙升高
- E. 血白蛋白升高

正确答案：C

[单选题]18. 根据部位，下列哪种胃溃疡最为多见

- A. 后壁溃疡
- B. 小弯溃疡
- C. 高位溃疡
- D. 幽门前溃疡
- E. 复合溃疡

正确答案：B

[单选题]19. 肝硬化患者在很短时间里出现腹痛和大量血性腹腔积液，不伴有发热，应首先考虑可能并发

- A. 继发性肝癌
- B. 原发性腹膜炎
- C. 结核性腹膜炎
- D. 肝肾综合征
- E. 门静脉血栓形成

正确答案：E

[单选题]20. 肝硬化患者突然出现剧烈腹痛，发热，腹腔积液迅速增加，脾增大，最大可能并发症是

- A. 原发性腹膜炎
- B. 肝破裂
- C. 门静脉血栓形成
- D. 肝肾综合征

E. 胃肠穿孔

正确答案：C

[单选题]21. 肝细胞性黄疸的可能病因是

A. 壶腹癌

B. 胆囊炎

C. 肝硬化

D. 胰腺炎

E. 十二指肠球炎

正确答案：C

[单选题]22. 肝昏迷患者给予肠道抗生素最主要的目的是

A. 减少真菌的繁殖

B. 清除致病菌的毒素

C. 抑制肠道细菌，减少氨的形成

D. 预防自发性腹膜炎

E. 防止继发性肠道感染

正确答案：C

[单选题]23. 分泌促胃液素的主要部位是

A. 小肠上部

B. 胃窦部

C. 胃底部

D. 回肠

E. 结肠

正确答案：B

[单选题]24. 发生肠内瘘可见于

A. 肠阿米巴病

B. 溃疡性结肠炎

C. 肠结核

D. 肠 Crohn 病

E. 血吸虫病

正确答案：D

[单选题]25. 导致肠易激综合征的原因除外以下哪一项

A. 内脏感知异常

B. 胃肠动力学异常

C. 肠道器质性病变

D. 精神因素

E. 对某些食物不耐受

正确答案：C

[单选题]26. 促胃液素产生于

- A. 主细胞
- B. 壁细胞
- C. 黏液细胞
- D. G 细胞
- E. 肥大细胞

正确答案：D

[单选题]27. 癌灶直径 \leq 5mm

- A. 小胃癌
- B. 早期胃癌
- C. 微小胃癌
- D. 进展期胃癌
- E. 晚期胃癌

正确答案：C

[单选题]28. 患者，女，20岁，近日厌油，乏力，肝区疼痛，化验血结合胆红素、非结合胆红素都升高，尿中尿胆原增多，粪色变浅，考虑为

- A. 胆汁淤积性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 肝细胞性黄疸
- D. 先天性非溶血性黄疸
- E. 以上都不是

正确答案：C

[单选题]29. 关于呕血，下列哪项不正确

- A. 呕血可不伴有黑粪排出
- B. 呕吐物可呈咖啡色
- C. 呕出的血可为鲜红色
- D. 呕血前常有恶心感
- E. 呕血量大时可出现休克症状

正确答案：A

[单选题]30. 关于慢性胃窦胃炎，正确的是

- A. 可导致恶性贫血
- B. 由自身免疫反应引起
- C. 血清中可测得抗内因子抗体
- D. 维生素 B12 水平明显低下
- E. 绝大多数由幽门螺杆菌引起

正确答案：E

[单选题]31. 患者，女，55岁，近半年来反复发作胸骨后烧灼样不适或疼痛，伴反食、反酸。发作无规律，查心电图 ST-T 非特异性改变。给予患者奥美拉唑（洛赛克）20mgbid 治疗后 7 天症状明显缓解，首先考虑的诊断是

- A. 劳力性心绞痛
- B. 不稳定心绞痛
- C. 肋软骨炎
- D. 胃食管反流病
- E. 慢性胃炎

正确答案：D

参考解析：奥美拉唑（洛赛克）20mgbid 是诊断 GERD 的试验性治疗，治疗后 7 天症状明显缓解提示 GERD。

[单选题]32. 患者，女，50 岁，入院诊断为急性胰腺炎。治疗 2 周后，体温 38~39℃，左上腹部压痛，能触及包块。可能性最大的情况是

- A. 急性胰腺炎迁延不愈
- B. 急性胰腺炎合并急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎并发脓肿
- D. 急性胰腺炎合并局部腹膜炎
- E. 急性胰腺炎合并假性囊肿

正确答案：C

[单选题]33. 患者，女，45 岁。反复上腹部疼痛 10 年，伴反酸暖气，最具诊断意义的检查项目是

- A. 消化道钡餐
- B. 腹部 B 超
- C. 胃镜检查
- D. 大便隐血试验
- E. 胃液分析

正确答案：C

[单选题]34. 患者，女，40 岁，有慢性肝炎病史 10 余年，突然呕血，同时伴有头晕、心慌、出汗等症状，患者出血量至少为

- A. 800ml
- B. 100ml
- C. 50ml
- D. 1500ml
- E. >400ml

正确答案：E

[单选题]35. 患者，女，35 岁，低热 2 个月，伴有腹痛、腹胀，查体腹部移动性浊音阳性，腹腔积液为渗出液，血沉 60mm/h，最可能的诊断是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 肾病综合征
- C. 肝硬化腹腔积液
- D. 系统性红斑狼疮

E. 腹膜间皮瘤

正确答案：A

[单选题]36. 患者，女，32岁，轻度腹泻伴低热3个月，右下腹可触及包块。X线钡餐检查在回盲部可见跳跃征象。最可能的诊断是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 克罗恩病
- C. 溃疡型肠结核
- D. 结肠癌
- E. 阿米巴性结肠炎

正确答案：C

[单选题]37. 男性患者，60岁，3个月来持续上腹隐痛，多次大便外观黄色，隐血阳性；食欲不振，消瘦。查体：面色苍白，上腹部压痛，未触及包块，肝、脾未及。首选做哪项检查对确诊有帮助

- A. 胃酸测定
- B. 胃镜
- C. B超检查
- D. 血清胃泌素测定
- E. 上消化道钡餐造影

正确答案：B

参考解析：食欲不振，消瘦。查体：面色苍白，上腹部压痛，未触及包块，肝、脾未及。首先做哪项检查对确诊最有帮助

[单选题]38. 男性患者，45岁，肝硬化病史3年，突然呕血300ml，黑便3次约500ml，下列哪项不可能出现

- A. 脾缩小
- B. 血浆尿素氮升高
- C. 腹腔积液减少
- D. 出现肝肾综合征
- E. 诱发肝性脑病

正确答案：C

[单选题]39. 男性患者，30岁，低热伴腹泻半年，X线造影提示，回盲部钡剂跳跃征。下列哪种说法不正确

- A. 最容易混淆的疾病是克罗恩病
- B. 最可能的诊断是溃疡型肠结核
- C. 溃疡型肠结核最易并发肠出血
- D. 腹泻并非溃疡型肠结核的特征
- E. 低热、盗汗支持溃疡型肠结核的诊断

正确答案：C

[

单选题]40. 男性 46 岁，因腹泻、便血确诊溃疡性结肠炎，开始服用 SASP6g / d，为监测药物不良反应的发生，应定期复查

- A. 血常规
- B. 腹部 B 超
- C. ESR
- D. 便常规
- E. 结肠镜

正确答案：A

[单选题]41. 男性，45 岁，肝硬化 3 年，查体有少量腹腔积液，患者应用利尿剂，宜首选

- A. 利尿酸钠
- B. 螺内酯（安体舒通）
- C. 甘露醇
- D. 双氢克尿噻
- E. 速尿

正确答案：B

[单选题]42. 男性，42 岁，2 周来稽留热，伴有腹痛、腹泻。心率 110 / min，脾脏肋下 2 指，肝脏未触及，移动性浊音阳性，血白细胞 $3.6 \times 10^9 / L$ ，胸片两肺散在米粒样点状模糊影。最可能的诊断是

- A. 肺泡癌
- B. 伤寒
- C. 粟粒型肺结核合并结核性腹膜炎
- D. 肝硬化腹腔积液并自发性腹膜炎
- E. 肝硬化合并病毒性肺炎

正确答案：C

[单选题]43. 男，50 岁，既往体健，查体时发现肝在右肋下 2cm，质硬、压痛，脾可触及，锌浊度试验 20 单位、ALT 正常范围，肝穿刺病理有假小叶形成，应诊断为

- A. 慢性持续性肝炎
- B. 慢性活动性肝炎
- C. 代偿期肝硬化
- D. 肝淤血
- E. 肝囊肿

正确答案：C

[单选题]44. 鉴别上下消化道出血有帮助的是

- A. 腹部超声
- B. 钡餐造影
- C. 核磁共振

D. 腹部 CT

E. 消化内镜

正确答案： E

[单选题]45. 急性胰腺炎诊断分型意义不大的检查是

- A. 淀粉酶升高
- B. 血压下降
- C. 血氧分压下降
- D. 血钙降低
- E. 肋腹部及脐周出现紫色瘀斑

正确答案： A

[单选题]46. 患者，女，肝硬化6年，近日尿少，色发黄，食欲差，皮肤黏膜反复出现瘀斑及牙龈出血，化验血小板 $50 \times 10^9 / L$ ，ALB $30 g / L$ ，PT18s。患者出血倾向的最主要原因是

- A. 毛细血管脆性增加
- B. 维生素K缺乏
- C. 血小板功能不良
- D. 凝血因子合成障碍
- E. 内毒素作用

正确答案： D

[单选题]47. 下述哪项不是上消化道大出血的最常见原因

- A. 食管胃底静脉曲张破裂
- B. 消化性溃疡
- C. 胃癌
- D. 胆道出血
- E. 食管贲门黏膜撕裂综合征

正确答案： D

[单选题]48. 下述哪项不是结核性腹膜炎病人的发热特点

- A. 大多为弛张热
- B. 高热伴明显毒血症者见于干酪型
- C. 高热伴明显毒血症者见于渗出型
- D. 热型以低热与中等热为多见
- E. 高热伴明显毒血症者见于伴有粟粒型结核者

正确答案： A

[单选题]49. 下述哪项不是检验幽门螺杆菌的常用方法

- A. 血培养
- B. 呼气试验
- C. 胃黏膜组织切片染色
- D. 快速尿素酶试验
- E. 血清抗幽门螺杆菌抗体检测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796051120140010224>