

2024 年广东省廉江市《执业药师之西药学专业二》考试王牌题库及答案【易错题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 碱性磷酸酶
- B: 尿淀粉酶
- C: 乳酸脱氢酶
- D: 肌酸激酶

答案：D

2. （2015 年真题）属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是（）。

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 替罗非班
- D: 奥扎格雷

答案：C

3. 常作为根除幽门螺杆菌治疗的抗菌药物之一的是

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

4. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 曲妥珠单抗
- C: 环磷酰胺
- D: 长春新碱

答案：D

5. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是（）。

- A: 卤米松>氟轻松>地塞米松
- B: 卤米松>地塞米松>氟轻松
- C: 地塞米松>卤米松>氯轻松
- D: 地塞米松>氟轻松>卤米松

答案：A

6. 伊曲康唑与肝药酶的关系是

- A: 伊曲康唑主要经 CYP1A2 酶代谢
- B: 伊曲康唑主要经 CYP2C9 酶代谢
- C: CYP3A4 酶的诱导剂
- D: CYP3A4 酶的抑制剂

答案：D

7. （2016 年真题）铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 罗红霉素
- C: 头孢曲松
- D: 头孢他啶

答案：D

8. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次 / 分，R21 次 / 分，BP110 / 70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类
- C: 莫西沙星对非典型病原体无效
- D: 莫西沙星对厌氧菌有效

答案：C

9. 治疗血吸虫病的药物是()

- A: 吡喹酮
- B: 氯喹
- C: 甲硝唑
- D: 乙胺嗪

答案：A

10. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是

- A: 坦洛新
- B: 特拉唑嗪
- C: 十一酸睾酮
- D: 西地那非

答案：A

11. (2019 年真题) 关于外用糖皮质激素类药物的说法，错误的是()

- A: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- B: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药

C: 外用糖皮质激素可增加感染风险

D: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案: B

12. 维生素 A 缺乏时引起

A: 坏血病

B: 脚气病

C: 角膜软化症

D: 成人佝偻病

答案: C

13. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

A: 5mg/kg

B: 15mg/kg

C: 60mg/kg

D: 40mg/kg

答案: D

14. 下列药物中, 与甲氨蝶呤长期大量合用, 可引起膀胱移行细胞癌的是

A: 糖皮质激素

B: 维生素类

C: 抗生素

D: 抗病毒药物

答案: A

15. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

- A: 二甲双胍
- B: 苯乙双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 甲苯磺丁脲

答案：A

16. (2021 年真题) 由于氧吡格置部分经 CYP2C19 转化为活性代谢物，合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效，故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是 ()

- A: 兰索拉唑
- B: 泮托拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：D

17. 下列关于铁剂的叙述错误的是

- A: 儿童缺铁可能影响其行为和学习能力
- B: 最容易吸收的铁剂为三价铁
- C: 口服铁剂主要在十二指肠和空肠上段吸收
- D: 脂肪泻患者不建议使用

答案：B

18. 成人使用美罗培南一日剂量不得超过

- A: 3g
- B: 6g
- C: 4g
- D: 5g

答案：B

19. 治疗黏液性水肿的药物是

- A: 甲状腺片
- B: 硫脲类+大剂量碘
- C: 普萘洛尔
- D: 硫脲类

答案：A

20. 下述药物不属于消毒防腐药的是()

- A: 盐酸麻黄碱溶剂
- B: 过氧化氢溶剂
- C: 硼酸溶剂
- D: 酚甘油

答案：A

21. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 过敏性皮炎
- B: 严重高血压
- C: 再生障碍性贫血
- D: 类风湿性关节炎

答案：B

22. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

- A: 氟西泮
- B: 氯美扎酮
- C: 谷维素
- D: 夸西泮

答案：A

23. 激动岛受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

- A: 氨力农
- B: 地高辛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 硝普钠

答案：C

24. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

- A: 阿达帕林
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 壬二酸

答案：D

25. (2019 年真题) 长期服用呋塞米，易发生的不良反应是 ()

- A: 高钠血症
- B: 低钾血症
- C: 高氯血症
- D: 低尿酸血症

答案：B

26. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

- A: 四环素
- B: 喹诺酮类
- C: 苯唑西林
- D: 甲硝唑

答案：D

27. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：D

28. 属于长效糖皮质激素的药物是

- A: 地塞米松
- B: 曲安西龙
- C: 氢化可的松
- D: 醋酸可的松

答案：A

29. 属于血小板糖蛋白 GP IIb / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 双嘧达莫
- C: 阿司匹林
- D: 替格瑞洛

答案：A

30. 乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

- A: 阿那曲唑
- B: 氟他胺
- C: 曲妥珠单抗
- D: 他莫昔芬

答案：D

31. 与多柔比星呈现交叉耐药性的是

- A: 放线菌素
- B: 肝素
- C: 氧烯洛尔
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

32. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0. 5g，一日 3 次；阿卡波糖 0. 1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 贝那普利
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

33. 袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段，利尿作用强，其代表药物是()

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：A

34. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

- A: 泼尼松龙
- B: 泼尼松
- C: 氟替卡松
- D: 可的松

答案：A

35. 因易导致新生儿溶血,妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是 ()

- A: 呋喃妥因
- B: 庆大霉素
- C: 甲硝唑
- D: 苄星青霉素

答案：A

36. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

- A: 门冬氨酸鸟氨酸
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 复方甘草酸苷

答案：D

37. 下列关于 5α 还原酶抑制剂的描述, 错误的是

- A: 可以缩小前列腺体积
- B: 是有性生活要求的患者治疗 BPH 的一线用药的
- C: 与 $\alpha 1$ 受体阻断剂相比, 更易引起性功能障碍
- D: 对膀胱颈和平滑肌没有作用

答案：B

38. 1~5 岁儿童甲状腺功能减退症, 左甲状腺素每日完全替代剂量为

A: $6\mu\text{g} / \text{kg}$

B: $5\mu\text{g} / \text{kg}$

C: $4\mu\text{g} / \text{kg}$

D: $25\mu\text{g}$

答案：B

39. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

A: 激活磷酸二酯酶

B: 拮抗腺苷受体

C: 激活腺苷酸环化酶

D: 促进肾上腺素释放

答案：A

40. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

A: 乳酸钠

B: 碳酸氢钠

C: 氯化钠

D: 氯化铵

答案：B

41. 人工合成的第一个应用于临床的单环 β -内酰胺类抗生素是()

A: 头孢唑林

B: 氨曲南

C: 氨苄西林

D: 舒巴坦

答案：B

42. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

- A: 促进吸收
- B: 抗菌谱不相似
- C: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢
- D: 促进分布

答案：C

43. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 竞争性对抗
- D: 产生协同作用

答案：B

44. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

- A: 托瑞米芬
- B: 乙烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 氟他胺

答案：D

45. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 丙酸睾酮
- C: 阿那曲唑
- D: 他莫昔芬

答案：C

46. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

- A: 维生素 B
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B
- D: 维生素 B

答案：D

47. 容易发生双硫仑样反应的药物包括()

- A: 阿莫西林
- B: 链霉素
- C: 青霉素
- D: 头孢唑林

答案：D

48. β_3 受体激动后的影响是

- A: 脂肪分解
- B: 增加心率
- C: 肌肉震颤
- D: 支气管扩张

答案：A

49. 可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

- A: 乙胺嘧啶
- B: 甲氟喹
- C: 氯喹
- D: 伯氨喹

答案：A

50. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

- A: 表皮生长因子受体
- B: 人表皮生长因子受体-2
- C: B 淋巴细胞表面的 CD20
- D: 血管内皮生长因子

答案：B

51. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 青霉素 V
- B: 氨苄西林
- C: 苯唑西林
- D: 哌拉西林

答案：C

52. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 预防急性肾衰竭
- B: 高钾血症
- C: 充血性心力衰竭
- D: 高钠血症

答案：D

53. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 丙卡特罗
- B: 沙美特罗
- C: 特布他林

D: 福莫特罗

答案: D

54. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是

A: 埃索美拉唑

B: 泮托拉唑

C: 右兰索拉唑

D: 奥美拉唑

答案: C

55. 酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()

。

A: 曲马多

B: 哌替啶

C: 芬太尼

D: 吗啡

答案: A

56. 布美他尼属于下列哪类利尿药

A: 保钾利尿药

B: 强效利尿药

C: 中效利尿药

D: 碳酸酐酶抑制药

答案: B

57. 属于利胆类保肝药的是

A: 熊去氧胆酸

B: 还原型谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 甘草酸二铵

答案：A

58. 干扰核酸生物合成的药物是()

A: 顺铂

B: 氟尿嘧啶

C: 高三尖杉酯碱

D: 多柔比星

答案：B

59. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

B: 属于抗动力药

C: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

D: 具有吸附、收敛的作用

答案：B

60. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

A: 异甘草酸镁

B: 门冬氨酸钾镁

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 双环醇

答案：B

61. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内, 宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

- A: 十一酸睾酮 (40mg)
- B: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)
- C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)
- D: 左炔诺孕酮 (1

答案: D

62. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 普适泰
- D: 十一酸睾酮

答案: C

63. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钠
- C: 氯化钙
- D: 氯化钾

答案: D

64. (2016 年真题) 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是

- A: 右雷佐生
- B: 亚叶酸钙
- C: 二巯基丙醇
- D: 美司钠

答案: D

65. 用于甲型和乙型流感治疗的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 乙胺嘧啶
- C: 吡喹酮
- D: 拉米夫定

答案：A

66. 属于雌激素类的是

- A: 甲地孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 睾酮
- D: 己烯雌酚

答案：D

67. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 骨髓功能抑制
- B: 药物性肝炎
- C: 出血性膀胱炎
- D: 神经毒性

答案：A

68. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 环磷酰胺
- C: 顺铂
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

69. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

- A: 托拉塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 呋塞米

答案：B

70. 对乙酰氨基酚中毒可使用的解救药是

- A: 喷托维林
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：D

71. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 伐地那非
- B: 呋塞米
- C: 丙酸睾酮
- D: 坎利酮

答案：D

72. 碳酸氢钠可用于

- A: 代谢性碱中毒
- B: 呼吸性碱中毒
- C: 呼吸性酸中毒
- D: 代谢性酸中毒

答案：D

73. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

- A: 青霉素 G
- B: 万古霉素
- C: 氨曲南
- D: 头孢唑林

答案: B

74. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 脚气病
- B: 佝偻病
- C: 夜盲症
- D: 孕育异常

答案: D

75. 青霉素 ()

- A: 对 G
- B: 对 G
- C: 抗菌作用强, 对厌氧菌有效
- D: 特别对铜绿假单胞菌有效

答案: B

76. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑对曲霉菌有效
- B: 氟康唑是肝药酶诱导剂
- C: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染
- D: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量

答案：C

77. 可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是

- A: 溴己新
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氨溴索
- D: 羧甲司坦

答案：B

78. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- B: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- C: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- D: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

79. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

- A: 格列吡嗪
- B: 格列本脲
- C: 胰岛素
- D: 甲苯磺丁脲

答案：B

80. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 头孢西丁
- D: 阿奇霉素

答案：C

81. 阿司匹林的抗血小板作用机制为

- A: 促进内皮细胞中 PGI
- B: 抑制血小板中 TXA
- C: 激活环氧酶
- D: 抑制内皮细胞中 TXA

答案：B

82. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 氨基南
- B: 亚胺培南
- C: 克拉维酸
- D: 阿莫西林

答案：A

83. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

- A: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶
- B: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

D: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

答案：A

84. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

A: 红霉素

B: 氨基糖苷类

C: 氯霉素类

D: 多黏菌素 B

答案：B

85. 吸入给药中，较易掌握的方法是

A: 干粉吸入方法

B: 气雾剂

C: 口服制剂

D: 雾化吸入溶液

答案：A

86. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 链霉素

D: 吡嗪酰胺

答案：D

87. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 非洛地平缓释片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/796213113101011030>