

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习
备考题库训练—题海战术
多重模拟测试—强化记忆
高频考点汇编—精准高效
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

西医三基考试题库及答案

1、应用双气囊三腔管压迫止血每次放气的时间为:()

- A、 5分钟
- B、 10~15分钟
- C、 20~30分钟
- D、 30分钟以上

答案: C

2、使用甘露醇时错误的一项是:()

- A、 静滴时不与其他药物混合使用
- B、 心功能不全及急性肺水肿病人禁用
- C、 可用作肌肉注射
- D、 密切观察病人的血压、脉搏和呼吸,以防出现心功能不全

答案: C

3、临床上最常见的胎方位是:()

- A、 枕右前位
- B、 枕左前位
- C、 骶左前位
- D、 枕左后位

答案: B

4、有关帮助危重病人翻身时注意事项的叙述,不正确的是:()

- A、 翻身前应评估病人的病情是否允许翻身
- B、 脊柱脊髓手术后,翻身时注意轴线翻身,防止脊柱屈曲或扭转
- C、 颅脑手术后,翻身时应有人扶头部,防止颈部扭曲引起颅内压增高,只能卧于患侧或平卧
- D、 若病人身上带有多根管道,应妥善安置好各种管道,防止因牵拉导致移位和脱出

答案: C

5、确诊淋巴瘤的最主要依据是:()

- A、 脾肿大
- B、 淋巴结活检
- C、 无痛性淋巴结肿大
- D、 贫血、出血、发热

答案: B

6、下列说法哪项是正确的:()

- A、 肌无力危象是由于抗胆碱酯酶药物过量所致

- B、胆碱能危象是由于抗胆碱酯酶药物剂量不足所致
- C、注射腾喜龙后如症状减轻者为肌无力危象
- D、出现呼吸肌无力时,应用抗胆碱酯酶药物无效

答案: C

7、病室内温度一般控制在:()

- A、12~16℃
- B、18~22℃
- C、23~25℃
- D、26~28℃

答案: B

8、正常胎动每小时多少次:()

- A、1~2次
- B、2~3次
- C、3~5次
- D、5~6次

答案: C

9、关于心力衰竭的描述,错误的是:()

- A、都是由心肌收缩力下降引起的
- B、各种心脏疾病都可导致心力衰竭
- C、有组织、器官供血不足的表现
- D、有肺循环和或体循环淤血的表现

答案: A

10、紧张综合征病人最明显的临床表现是:()

- A、面色潮红
- B、手心出汗
- C、紧张性木僵
- D、手足不自主的摆动

答案: C

11、SIMV 是指下列哪种机械通气模式:()

- A、压力支持通气
- B、辅助控制通气
- C、双水平气道正压
- D、同步间歇指令通气

答案: D

12、机械通气模式中,持续气道正是指:()

- A、 BIPAP
- B、 CPAP
- C、 SIMV
- D、 PRVC

答案： B

13、食管的第三狭窄距切牙的距离约为：（ ）

- A、 15cm
- B、 25cm
- C、 40cm
- D、 60cm

答案： C

14、肾病综合征严重水肿病人禁忌：（ ）

- A、 静脉穿刺
- B、 肌内注射
- C、 口服补液
- D、 翻身

答案： B

15、胃肠道中起消化作用的最主要的消化液是（ ）

- A、 胃液
- B、 胰液
- C、 肠液
- D、 唾液
- E、 胆汁

答案： B

16、下列哪项是老年人生理功能变化引起的：（ ）

- A、 老视
- B、 高血压
- C、 糖尿病
- D、 冠心病

答案： A

17、急性心肌梗死常见的死亡原因是（ ）

- A、 心源性休克
- B、 心力衰竭
- C、 严重心律失常
- D、 电解质紊乱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796230023020010132>