北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关左房黏液瘤，正确的是（　）。A.好发于左心耳
B.是心脏内最常见的恶性肿瘤
C.可出现肺循环栓塞表现
D.手术切除后不会复发
E.以上都不是

2、单项选择题：食管旁疝患儿贲门位于（　）。A.横膈上方
B.胸腔内
C.纵隔内
D.食管裂孔上方
E.正常位置

3、单项选择题：电视胸腔镜手术时除配备胸腔镜手术设备外，还必须常规准备（　）。A.无创缝合针线
B.气管切开包
C.静脉切开包
D.常规开胸包
E.以上均是

4、单项选择题：冠心病的左主干病变是指病变位于（　）。A.发出前降支与回旋支的共同开口
B.发出钝缘支与前降支的共同开口
C.发出对角支与回旋支的共同开口
D.发出后降支与前降支的共同开口
E.发出前降支与对角支的共同开口

5、单项选择题：目前临床上应用的生物瓣膜，其主要缺陷是（　）。A.组织相容性差
B.耐久性差
C.需终生抗凝
D.易并发感染
E.血栓栓塞率高

6、单项选择题：有关食管内镜超声检查食管癌的描述错误的是（　）。A.可判断肿瘤侵犯深度
B.可观察局部淋巴结大小
C.可观察局部淋巴结内部结构
D.可观察食管周围组织有无受侵

E.可适用于几乎所有食管癌病例

7、单项选择题：急性脓胸变为慢性脓胸是指病程达到（　）。A.3～6 周

B.6 周～3 个月

C.3 周～2 个月

D.3～6 个月

E.6 个月以上

8、单项选择题：急性脓胸彻底排除脓液有以下几种方法，除了（　）。A.反复胸腔穿刺抽脓液

B.经肋间胸腔闭式引流

C.经肋床胸腔闭式引流

D.开放引流

E.经胸腔镜清除脓液

9、单项选择题：心脏黏液瘤最好发生于（　）。A.右心房

B.右心室

C.左心房

D.左心室

E.三尖瓣

10、单项选择题：治疗阿米巴脓胸，首选药物为（　）。A.灭滴灵

B.氧氟沙星

C.氟哌酸

D.大扶康

E.庆大霉素

11、单项选择题：急性脓胸最常继发于（　）。A.肺内感染

B.膈下脓肿

C.脓毒血症

D.胸膜腔积液

E.开胸手术污染胸膜腔

12、单项选择题：男，7 岁。入学查体胸透，发现左侧胸腔第 6 胸椎旁有直径 6mm 圆形肿块影。最可能的诊断是（　）。A.胸腺瘤

B.畸胎瘤

C.中央型肺癌

D.神经源性肿瘤

E.淋巴源性肿瘤

13、单项选择题：在我国，二尖瓣狭窄关闭不全最常见的病因（　）。A.细菌性心内膜炎

B.先天性

C.风湿热

D.外伤引起

E.心肌梗死后

14、单项选择题：低心排综合征的主要治疗措施是（　）。A.增加心脏前负荷

B.降低心脏后负荷

C.增强心肌收缩力

D.以上有一项不是

E.以上全都是

15、单项选择题：关于纵隔巨大淋巴结增生症，叙述错误的是（　）。A.透明血管型最常见，占90%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/797035141016006102