


内科食管癌护理查房



目录

- 食管癌概述
- 食管癌的诊断
- 食管癌的治疗
- 食管癌的护理
- 食管癌的预防和保健

contents



01

食管癌概述





食管癌的定义



食管癌是发生在食管上皮组织的恶性肿瘤，占有恶性肿瘤的2%。



食管癌的发病年龄多在40岁以上，男性多于女性。




食管癌的发病率和死亡率在我国均较高，是常见的恶性肿瘤之一。



食管癌的病因和发病机制

01



长期慢性炎症刺激



如反流性食管炎、食管溃疡等，可能导致食管黏膜上皮细胞异常增生，最终发展为食管癌。

02



饮食因素



摄入过多亚硝胺类化合物、霉变食品、烟酒等会增加食管癌的患病风险。

03



遗传因素



部分食管癌患者有家族聚集现象，可能与遗传有关。



食管癌的症状和体征



早期症状

吞咽食物时出现哽咽感、
胸骨后疼痛或不适。




中晚期症状

进行性吞咽困难、消瘦、
乏力、持续胸痛或背痛等。



体征

中晚期患者可能出现消瘦、
贫血、营养不良等表现，
以及肿瘤转移引起的相应
体征。




02

食管癌的诊断





诊断方法



01

胃镜检查

通过胃镜观察食管内部情况，发现异常组织并进行病理学诊断。



02

X线钡剂造影

通过吞服含有钡剂的物质，在X线下观察食管的形态和蠕动情况，发现病变。



03

CT和MRI检查




通过影像学检查，观察食管肿瘤的大小、浸润深度以及是否有淋巴结转移。



04

细胞学诊断

通过病理学检查，对食管内脱落细胞进行染色和观察，以确定是否存在癌细胞。



组织病理学诊断

通过胃镜或手术获取食管组织样本，进行显微镜下观察，确定肿瘤的性质和分化程度。



细胞病理学诊断

通过细胞学检查，观察食管内脱落细胞的形态和染色情况，判断是否存在癌细胞。


分期

根据食管癌的侵犯范围、淋巴结转移情况和远处转移情况，将食管癌分为早期、中期和晚期。

分级


根据食管癌细胞的分化程度和恶性程度，将食管癌分为高、中、低级别。





03

食管癌的治疗



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797115054121006050>