

2024 河北省孟村回族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全 (网校专用)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 能降 LDL 也降 HDL 的药物是

- A: 普罗布考
- B: 非诺贝特
- C: 烟酸
- D: 塞伐他汀

答案: A

2. 可能导致血清总胆固醇升高的药物是

- A: 氯氮平
- B: 胰岛素
- C: 阿司匹林
- D: 苯妥英钠

答案: A

3. 患者,男,53 岁,因纳差、食欲减退来药店购药,药师应推荐的药品是
()

- A: 多潘立酮片
- B: 酵母片
- C: 乳酶生片
- D: 甲氧氯普胺片

答案: B

4. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

- A: 需要终身服药
- B: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- C: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶
- D: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

答案：C

5. 对胃肠刺激较小，体内分解为两种解热镇痛药、作用时间长的是

- A: 阿司匹林
- B: 布洛芬
- C: 吲哚美辛
- D: 贝诺酯

答案：D

6. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 避免与克服细菌耐药
- B: 采用间歇疗法
- C: 采用短程疗法
- D: 采用大剂量

答案：A

7. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 指令方式
- B: 主动方式
- C: 质问方式
- D: 被动方式

答案：D

8. 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致 ()

- A: 溶液变色
- B: 产生胶状不溶物
- C: 微浑浊或沉淀
- D: 产生气体

答案: C

9. 患者,女,27岁,妊娠4个月,因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性,患者应补充

- A: 维生素 B6
- B: 维生素 K1
- C: 维生素 C
- D: 维生素 D

答案: A

10. 长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现 ()

- A: 淋巴细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞减少
- D: 淋巴细胞减少

答案: D

11. 在治疗痔疮的药物中,作为硬化剂或萎缩剂的是

- A: 地奥司明
- B: 九华膏
- C: 苯酚甘油-水溶液
- D: 草木犀流浸液片

答案：C

12. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法，错误的是

- A: 禁食富含碘的食物
- B: 避免使用含碘药物
- C: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- D: 哺乳期伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑

答案：D

13. 以下所列物质中，一旦误服中毒，忌用硫酸镁导泻的是

- A: 磷化锌等灭鼠药
- B: 有机氮类杀虫药
- C: 香豆素类灭鼠药
- D: 拟除虫菊酯类杀虫药

答案：A

14. 高血压合并心肌梗死首选（）

- A: 卡托普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硫酸镁
- D: 特拉唑嗪

答案：A

15. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理
- B: 氨溴索片给药剂量不合理
- C: 维生素 C 片用法用量不合理

D: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案：D

16. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

A: 阿戈美拉汀

B: 唑吡坦

C: 艾司唑仑

D: 米氮平

答案：B

17. (2017 年真题) 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是 ()

A: 美托洛尔

B: 依那普利

C: 氢氯地平

D: 氢氯噻嗪

答案：D

18. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 甘油果糖

B: 呋塞米

C: 尼莫地平

D: 硝普钠

答案：A

19. 药名词干为 "-penem" 的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

20. 具有留钾作用的利尿药是

A: 非那雄胺

B: 阿米洛利

C: 乙酰唑胺

D: 坦洛新

答案：B

21. 患者女,56 岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周,伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡,幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常

A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 十枸橼酸铋钾+阿莫西林十甲硝唑

B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 十阿莫西林+克拉霉素

C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) +枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素

D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A

答案：A

22. (2019 年真题) 能减轻眼部平滑肌及血管痉挛, 改善局部微循环, 缓解视疲劳的药物是

A: 硫酸锌滴眼液

B: 聚乙烯醇滴眼液

C: 山莨菪碱滴眼液

D: 可的松滴眼液

答案: C

23. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: STB $34.2\mu\text{mol/L}$ ~ $171\mu\text{mol/L}$

B: STB $>342\mu\text{mol/L}$

C: STB $17.1\mu\text{mol/L}$ ~ $34.2\mu\text{mol/L}$

D: STB $17.1\mu\text{mol/L}$ ~ $171\mu\text{mol/L}$

答案: D

24. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T 38°C ，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15\times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

C: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

D: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

答案: C

25. 微粒型非诺贝特的用量是（）

A: 0.2g, qd

B: 0.2g, tid

C: 0.6g, bid

D: 0.1g, tid

答案: A

26. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

- A: 撒网式给药
- B: 盲目联合用药
- C: 有禁忌症用药
- D: 超适应症给药

答案：D

27. 提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

- A: 特殊剂型用法
- B: 特殊装置药品
- C: 药品贮存
- D: 药品有效期

答案：C

28. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

- A: 20.89，800ml
- B: 12.69，485ml
- C: 22.19，850ml
- D: 24.79，950ml

答案：B

29. (2017 年真题) 患者女 45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是 ()

- A: 阿莫西林
- B: 氨溴索

C: 头孢呋辛酯

D: 莫西沙星

答案: D

30. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A: 维生素 B2

B: 磺胺醋酰钠

C: 色甘酸钠

D: 碘苷

答案: D

31. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

A: 毛果芸香碱

B: 亚甲蓝

C: 阿托品

D: 碘解磷定

答案: C

32. 可引起尿液碱度增高的疾病是

A: 糖尿病

B: 痛风

C: 代谢性碱中毒

D: 呼吸性酸中毒

答案: C

33. 低盐饮食、避免情绪大波动，最适合于

A: 骨质疏松

B: 焦虑障碍

C: 糖尿病

D: 高血压

答案：D

34. 不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

A: 高警示药品

B: 麻醉药品和第一类精神药品

C: 第二类精神药品

D: 贵重药品

答案：C

35. 对缺铁性贫血者应选用（）

A: 维生素 K1

B: 富马酸亚铁

C: 甲磺酸去铁胺

D: 叶酸+维生素 B12

答案：B

36. （2018 年真题）患者，女，47 岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是（）

A: 麦角胺咖啡因

B: 布洛芬

C: 山莨菪碱

D: 卡马西平

答案：D

37. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 阿达帕林凝胶
- B: 克霉唑栓
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 复方角菜酸酯栓

答案：B

38. 可引起驾驶员嗜睡的药物是

- A: 抗过敏药
- B: 双嘧达莫
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：A

39. 关于尿路感染的说法，不正确的是

- A: 大肠杆菌感染最为常见
- B: 由细菌感染引起
- C: 多见于育龄期和绝经后女性
- D: 男性发病率稍高

答案：D

40. I 期临床试验

- A: 以特殊人群为给药对象
- B: 以目标适应证患者为给药对象
- C: 以健康志愿者为给药对象
- D: 以患者为给药对象

答案：C

41. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1℃，腋下温度超过

A: 37.6℃

B: 37.0℃

C: 36.7℃

D: 37.3℃

答案：B

42. 适用于 1-dopa 治疗伴疗效减退、症状波动患者的是

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案：B

43. 患者，女，54 岁。诊断为类风湿关节炎 2 年，目前服用甲氨蝶呤 (15mgqw) 和塞来昔布 (200mgqd)。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

A: 早期治疗、遵医嘱规律用药

B: 一旦症状改善,应即刻停药

C: 定期就诊评估病情,调整治疗方案

D: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松

答案：B

44. 最方便、最安全、最经济的给药途径是

A: 口服给药

B: 静脉注射

C: 直肠给药

D: 肌肉注射

答案：A

45. 一般不会改变血红蛋白正常值的药物是

- A: 维生素 K
- B: 伯氨喹
- C: 维生素 B
- D: 硝酸甘油

答案：C

46. 最容易吸湿的药品是

- A: 叶酸
- B: 乙醇
- C: 甘油
- D: 鱼肝油乳

答案：C

47. 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是()

- A: $BMI \geq 24.0$
- B: $BMI < 21.5$
- C: $BMI \geq 28.0$
- D: $BMI \leq 18.5$

答案：C

48. 1g 葡萄糖可提供机体的能量是

- A: 1kcal
- B: 2kcal
- C: 4kcal
- D: 3kcal

答案：C

49. 抗真菌药

- A: 血红蛋白量增多
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 血小板减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：D

50. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其 ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 待评价
- D: 可能

答案：C

51. （2020 年真题）药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中，会发生相互影响，不能同时服药”，但没有明示服药间隔时间，通常建议的间隔时间是（）

- A: 0.5 小时
- B: 3 小时
- C: 1 小时
- D: 2 小时

答案：D

52. 卡马西平使环孢菌素疗效降低属于（）。

- A: 酶诱导作用

B: 排泄

C: 作用于同一受体的拮抗作用

D: 与血浆蛋白结合

答案：A

53. 以质量调整生命年或者质量调整预期寿命为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于查

A: 成本-效益分析

B: 成本-效用分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效果分析

答案：B

54. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

A: 硝苯地平联用普萘洛尔

B: 铁剂联用维生素

C: 阿托品联用普萘洛尔

D: 阿托品联用吗啡

答案：B

55. 患者,女,25 岁,临床诊断为癫痫,给予丙戊酸钠 200mg tid 治疗。关于患者用药教育的说法错误的是 ()

A: 不要随意增减剂量

B: 应于每日三餐前服用药物

C: 发作次数增多时应及时复诊

D: 必要时监测血药浓度

答案：B

56. (2017 年真题) 患者到药店购买鱼肝油, 药师应给予 ()

- A: 维生素 A
- B: 鱼油
- C: 维生素 AD
- D: 维生素

答案: C

57. 下列药物中, 可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是 ()

- A: 叶酸
- B: 口服避孕药
- C: 银杏叶片
- D: 阿司匹林

答案: B

58. 口服氨苄西林吸收率比成人高 1 倍, 即

- A: 药物吸收
- B: 药物代谢
- C: 药物中毒
- D: 药物分布

答案: A

59. 弥漫性青铜色色素沉着的是

- A: 博来霉素
- B: 白消安
- C: 柔红霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案: B

60. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 90mg
- B: 100mg
- C: 50mg
- D: 75mg

答案：B

61. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

- A: 异丙托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：B

62. 代表乙型肝炎病毒表面抗体的是

- A: HBeAb
- B: HBcAb
- C: HBsAb
- D: HBeAg

答案：C

63. 不宜肌内注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

- A: 万古霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 链霉素
- D: 磷霉素

答案：A

64. 肠外营养液中 1g 氮能提供的热量是

A: 3kcal

B: 9kcal

C: 4kcal

D: 7kcal

答案：C

65. 以下论述哪项是错误的（）

A: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，以提高疗效、减少不良反应

B: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

C: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

D: 普萘洛尔可抑制肾素的分泌

答案：B

66. 患者，男，40 岁，因感冒所致鼻塞到药店购药，药师应推荐的药品是（）

A: 对乙酰氨基酚片

B: 酚麻美敏片

C: 氯苯那敏片

D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：D

67. 下列应用强心苷类药物治疗心力衰竭患者心律失常的描述，哪一项是错误的

A: 用于治疗心房扑动

B: 用于治疗心房纤颤

C: 用于治疗阵发性室上性心动过速

D: 可使心房扑动转为心房纤颤

答案: C

68. 易诱发致残性运动并发症的帕金森病治疗药为 ()

A: 金刚烷胺

B: 普拉克索

C: 复方左旋多巴

D: 苯海索

答案: C

69. 下列组合中，属于联合化疗的是 ()

A: CHOP 方案 (环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)

B: MTX 方案 (甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注)

C: CTX+美司钠 (环磷酰胺+美司钠)

D: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂 (贝伐珠单抗+奥希替尼)

答案: A

70. 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是:

A: 骨骼发育不良或骨软化

B: 横纹肌溶解或肌痛

C: 间质性胃炎或肾结石

D: 骨质疏松症或骨桥

答案: C

71. (2017 年真题) 患者，女，54 岁。诊断为类风湿关节炎 2 年，目前服用甲氨蝶呤 (15mgqw) 和塞来昔布 (200mgqd)。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

- A: 定期就诊评估病情, 调整治疗方案
- B: 早期治疗、遵医嘱规律用药
- C: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松
- D: 一旦症状改善, 应即刻停药

答案: D

72. 以下注射给药途径中，最常用于新生儿的是

- A: 静脉注射
- B: 动脉注射
- C: 腹腔注射
- D: 肌肉注射

答案: A

73. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 肾间质纤维化
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 肾小管坏死

答案: D

74. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

- A: 硝酸咪康唑
- B: 甲硝唑
- C: 制霉菌素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 曲古霉素

答案：D

75. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 对促进营养物质的吸收没有帮助
- B: 维持肠道正常菌群的平衡
- C: 减少肠内毒素的生成
- D: 可制约致病菌的生长繁殖

答案：A

76. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 孟鲁司特咀嚼片
- B: 茶碱片
- C: 雾化沙丁胺醇
- D: 沙丁胺醇静脉注射

答案：C

77. （2017 年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

- A: 仔细核对药品
- B: 严格审核处方
- C: 自行修改错误处方

D: 进行用药指导

答案：C

78. 阿米洛利及复方制剂

A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

B: 可导致驾驶员多尿或多汗

C: 可使驾驶员出现定向力障碍

D: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

答案：B

79. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: 成人静脉血 4.3×10

B: 成人静脉血 3.0×10

C: 成人末梢血 8.0×10

D: 新生儿 16.0×10

答案：B

80. (2018 年真题) 患者,女,71 岁,2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白(HbA1c) 9.2%,空腹血糖 10.5mmol/L,餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo,格列美脲片 2mgtidpo,罗格列酮片 2mgbidpo,甲钴胺片 0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

A: 普通胰岛素餐前 30min,皮下注射,qd

B: 门冬胰岛素餐前 30~60min,皮下注射,tid

C: 甘精胰岛素睡前 30min,皮下注射,qd

D: 低精蛋白锌胰岛素餐前 30min,皮下注射

答案：C

81. 患者，女，50 岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

- A: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能
- B: 从第 2 周起，每次给药 100mg，静脉滴注 30min
- C: 用药前应进行 RAS 基因筛查
- D: 每周给药 1 次，第 1 周给药剂量 200mg，静脉滴注 90min

答案：C

82. 药学服务的对象涉及面广，其服务中心是（）。

- A: 以患者为中心的药学服务
- B: 以药师为中心的药学服务
- C: 以医院为中心的药学服务
- D: 以医师为中心的药学服务

答案：A

83. （2018 年真题）瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是（）

- A: 40~200mg
- B: 5~20mg
- C: 10~80mg
- D: 10~20mg

答案：D

84. （2016 年真题）患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

- A: 痛风

B: 心力衰竭

C: 双侧肾动脉狭窄

D: 冠心病

答案：B

85. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 D 级的是

A: 卡马西平

B: 二甲双胍

C: 泮托拉唑

D: 雷尼替丁

答案：A

86. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 右美沙芬

B: 乙酰半胱氨酸

C: 可待因

D: 溴己新

答案：A

87. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

A: 青霉素？

B: 布地奈德？

C: 异烟肼？

D: 特布他林？

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/797146156046010024>