

2024 年河北省平山县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题王牌题库附答案（达标题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 三叉神经痛，应选的药物是

- A: 羟考酮缓释片
- B: 卡马西平片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 芬太尼透皮贴剂

答案：B

2. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 醋酸锌
- B: 阿昔洛韦
- C: 葡萄糖辛含片
- D: 布洛芬

答案：D

3. “-巴坦”的药名词干缩写是

- A: #NAME?
- B: #NAME?

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: #NAME?

D: eef-

答案：C

4. 查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是

A: 《药物治疗学》

B: 《新编药理学》

C: 《药物流行病学》

D: 《中华人民共和国药典》

答案：A

5. (2018 年真题) 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性, 将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估, 此药物经济学评价方法是 ()

A: 成本-效果分析

B: 成本-效益分析

C: 成本-效用分析

D: 最小成本分析

答案：B

6. 适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 恩托卡朋

B: 司来吉兰

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案：D

7. 用白色处方纸书写, 右上角无标注的是

- A: 第二类精神药品处方
- B: 急诊处方
- C: 普通处方
- D: 第一类精神药品处方

答案：C

8. (2015 年真题) 中成药血脂康中含有的化学成分是 ()。

- A: 洛伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 依折麦布

答案：A

9. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

- A: 病毒型
- B: 肺炎型
- C: 神经型
- D: 胃肠型

答案：D

10. 以下药物中，可以导致血钾升高的药物不包括 ()

- A: 卡托普利
- B: 呋达帕胺
- C: 阿米洛利
- D: 螺内酯

答案：B

11. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 丙咪嗪
- B: 苯巴比妥
- C: 奋乃静
- D: 硝西泮

答案：D

12. 具有肾毒性，需要大量输注时，需同时给予利尿药的是

- A: 多柔比星
- B: 氨氯地平
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：D

13. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

- A: 科学发展
- B: 知识培训
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 管理规范到位

答案：C

14. 下列临床试验分期中，上市后药品临床评价阶段属于

- A: IV 期临床试验
- B: II a 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：A

15. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 万古霉素
- C: 沙利度胺
- D: 葡萄糖

答案：A

16. 用于慢性胆囊炎患者改善胆源性消化不良症状的药物是

- A: 匹维溴铵
- B: 复方阿嗪米特
- C: 头孢曲松与甲硝唑联用
- D: 脂肪乳

答案：B

17. 痛风缓解期在关节炎症控制 1~2 周开始使用

- A: 阿司匹林
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 丙磺舒

答案：C

18. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 提高用药顺应性
- B: 警惕与防范用药错误
- C: 使患者获得有关用药的指导
- D: 增进患者对药师工作的信任

答案：D

19. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 1 周频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 阿托品
- B: 电复律
- C: 苯海拉明
- D: 胺碘酮

答案：D

20. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

- A: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素
- B: 钙剂+维生素 D+雌激素
- C: 钙剂+维生素 D+降钙素
- D: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐

答案：A

21. 服药时饮酒可引起低血糖的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 西咪替丁
- C: 维生素 A
- D: 格列本脲

答案：D

22. 苯二氮类药物过量或者中毒，特异性解救药物是

- A: 氟奋乃静
- B: 碘解磷定

C: 氟马西尼

D: 新斯的明

答案: C

23. (2015 年真题) 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是 ()。

A: 红霉素

B: 磺胺甲噁唑

C: 头孢呋辛

D: 阿奇霉素

答案: B

24. 退热或缓解疼痛都“不宜同时应用两种以上解热镇痛药”的主要依据是

A: 可能引起哮喘发作

B: 可能导致酸中毒

C: 可能引起肝、肾、胃肠道的损伤

D: 可能导致血管性水肿

答案: C

25. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予 ()。

A: 氯苯那敏片

B: 奥司他韦片

C: 更昔洛韦片

D: 阿昔洛韦片

答案: A

26. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 缓和治疗
- B: 对症治疗
- C: 对因治疗
- D: 姑息治疗

答案：B

27. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。

- A: 甲氧氯普胺注射液
- B: 葡萄糖酸钙注射液
- C: 硫酸镁注射液
- D: 尼莫地平注射液

答案：C

28. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的为

- A: 需监测 INR
- B: 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）
- C: 与食物和药物相互作用小
- D: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

答案：A

29. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

- A: 麻黄碱滴鼻剂
- B: 布地奈德鼻喷雾剂
- C: 羟甲唑啉鼻喷雾剂
- D: 萘甲唑啉鼻喷雾剂

答案：B

30.（2019 年真题）患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 吡格列酮

答案：B

31.（2015 年真题）用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是（）。

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：B

32. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 泼尼松
- B: 痰液稀释剂

C: 氨茶碱

D: 吗啡

答案: C

33. 用药错误 A 级（1 级）的标准

A: 患者已使用，但未造成伤害

B: 差错造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施

C: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

D: 客观环境或条件可能引发差错

答案: D

34. 强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

A: 磷化锌

B: 磷化氢

C: 氯化锌

D: 氯化钠

答案: C

35. 儿童便秘并发生粪便嵌塞可选用的泻药是

A: 硫酸镁

B: 聚乙二醇 4000

C: 比沙可啶

D: 双歧杆菌

答案: B

36. 属于 PH 依耐性药物的是

A: 多黏菌素

B: 美沙拉秦肠溶片

C: 青霉素

D: 林可霉素

答案: B

37. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 苯溴马隆

B: 泼尼松

C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案: A

38. 具有心脏毒性，治疗期间每 3 个月进行一次心脏评估，且在治疗后每 6 个月重复一次，直至停止治疗后 24 个月的靶向药是

A: 贝伐珠单抗

B: 曲妥珠单抗

C: 帕博利珠单抗

D: 利妥昔单抗

答案: B

39. 慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

A: 脾功能

B: 肾功能

C: 呼吸功能

D: 肝功能

答案: B

40. 肾移植术后发生排斥反应时，会使淋巴细胞

A: 前期减少后期增多

B: 不稳定

C: 减少

D: 增多

答案: D

41. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 <6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 避免高脂饮食

B: 控制体重

C: 餐中多饮水

D: 戒烟酒

答案: C

42. 用于前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂是 ()

A: 索利那新

B: 坦索罗辛

C: 特拉唑嗪

D: 托特罗定

答案: B

43. 肺炎药物治疗时应注意

A: 肺炎的抗菌药物疗程大多数为 5 天，极少数需要 7~10 天或更长疗程

B: 抗菌药一般不良反应较少，不需要注意与预防

C: 观察抗菌药物疗效应在药物治疗后 12~24 小时对病情进行评价

D: 一旦怀疑为细菌性肺炎应给予首剂抗菌药物，病情稳定后可从静脉途径改为口服治疗

答案：D

44. 大剂量或连续使用顺铂导致

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾间质纤维化

C: 肾小管坏死

D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：C

45. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 维生素 B6

B: 雷尼替丁

C: 奥美拉唑

D: 昂丹司琼

答案：D

46. 清洁手术的预防用药时间不超过

A: 12 小时

B: 24 小时

C: 48 小时

D: 6 小时

答案：B

47. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 中药饮片和化学药物在同一处方中开写
- B: 处方字迹模糊不易辨识
- C: 无正当理由超药品说明书用药
- D: 处方中使用了“遵医嘱”字样

答案：C

48. 用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于

- A: 妊娠期药物分布容积明显增加
- B: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
- C: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢
- D: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多

答案：A

49. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- B: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药
- C: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主
- D: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

答案：A

50. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 泪液减少
- B: 复视
- C: 眼睑沉重、痉挛
- D: 视物时症状加重

答案：D

51. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸钠
- D: 布洛芬

答案：A

52. 急性荨麻疹伴休克或严重的荨麻疹伴血管性水肿患者的治疗药物是

- A: 肾上腺糖皮质激素
- B: 第一代抗组胺药
- C: 1: 1000 肾上腺素注射液
- D: 第二代非镇静抗组胺药

答案：C

53. 关于尿路感染的说法，不正确的是

- A: 由细菌感染引起
- B: 多见于育龄期和绝经后女性
- C: 大肠杆菌感染最为常见
- D: 男性发病率稍高

答案：D

54. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 白血病
- B: 巨幼细胞性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 缺铁性贫血

答案：B

55. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

56. 妊娠期禁用的药物是

A: 青霉素钠

B: 链霉素

C: 苯妥英钠

D: 雌二醇

答案：D

57. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 低血糖

B: ALT 升高

C: 腹胀

D: 心律失常

答案: C

58. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 0.8g，2 次 / 日

B: 0.8g，5 次 / 日

C: 0.8g，3 次 / 日

D: 0.8g，4 次 / 日

答案: C

59. 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

A: 可能无关

B: 很可能

C: 可能

D: 肯定

答案: B

60. 关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 用 1: 1000 高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

B: 每隔 15~20min 放松带子 1~2min. 以防止肢体缺血坏死

C: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

D: 用绳索将伤口的近心端 5cm 处捆住，以防止毒液在体内扩散

答案: A

61. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

- A: 利尿剂
- B: 麻醉药品
- C: 肽类激素
- D: 蛋白同化激素

答案：B

62. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 贝特类
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸
- D: 烟酸

答案：B

63. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

- A: 弱轻度
- B: 重度
- C: 中度
- D: 轻度

答案：B

64. 高血压合并心力衰竭者慎用下列哪种药物

- A: 普萘洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

答案：A

65. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 柔红霉素
- C: 氟尿嘧啶
- D: 白消安

答案：D

66. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 缬沙坦
- B: 卡托普利
- C: 拉贝洛尔
- D: 福辛普利

答案：C

67. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

- A: 40mg
- B: 20mg
- C: 80mg
- D: 60mg

答案：C

68. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

- A: 甲状腺切除后的患者
- B: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- C: 合并高胆固醇血症的患者
- D: 合并轻度高血压的患者

答案：B

69. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

- A: 维生素 B
- B: 利血平
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

答案：D

70. 下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是：

- A: 甘露醇注射剂
- B: 卡前列甲酯栓剂
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 氯化钠注射液

答案：C

71. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 阿昔洛韦
- B: 依非韦伦
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：B

72. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 不宜与 MAOIs 类药物联合使用
- B: 如以上药物治疗无效，可考虑更换为同类的其他药物
- C: 从最大有效剂量开始，逐步递减剂量

D: 药物治疗至少 2 周才会有显著的情绪反应

答案: C

73. 粪外观所对应的疾病, 霍乱

A: 柏油便, 黑色有光泽

B: 白陶土便

C: 暗红果酱色

D: 米泔水样

答案: D

74. 下列药物中, 驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 哌替啶

B: 金刚烷胺

C: 氟桂利嗪

D: 双氯芬酸

答案: A

75. 以下毒物一旦误服中毒, 须用硫酸铜洗胃、导泻的是

A: 地西泮中毒

B: 可待因中毒

C: 香豆素类杀鼠药

D: 杀鼠药磷化锌

答案: D

76. 患者女 58 岁, 有 2 型糖尿病史, 因头疼、头晕就诊, 体征和实验室检查, 餐前血糖 7.8mmol/L, 餐后血糖 11.2mmol/L, 糖化血红蛋白 8.8%, 血压 166/96mmHg, 蛋白尿 >1g/24h, 推荐在降糖的基础上, 合并选用

- A: 二甲双胍
- B: 赖诺普利
- C: 氢氯塞嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：B

77. 混合型高脂血症，首选用的药物是

- A: 烟酸
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸
- D: 贝特类

答案：B

78. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 番泻叶
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：B

79. 妊娠期间，药物致畸的高敏感期是

- A: 妊娠 3 天
- B: 受精后 3 周以内
- C: 妊娠 18 天
- D: 受精后 3 周~3 个月

答案：D

80. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 菠萝蛋白酶
- B: 伪麻黄碱
- C: 颠茄浸膏片
- D: 阿司匹林

答案：B

81. 中枢性降压药是

- A: 可乐定
- B: 胍苯哒嗪
- C: 拉贝洛尔
- D: 利血平

答案：A

82. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

- A: 托特罗定
- B: 坦索罗辛
- C: 多沙唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：A

83. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,妊娠早期服用甲氨蝶呤

- A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 导致新生儿血钙过高
- D: 可能致胎儿畸形

答案：D

84. 审核发现用药失误的处方，药师应该

- A: 修改、调配此处方并发出药品
- B: 拒绝调配此处方
- C: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
- D: 依照此处方调配药品、发出药品

答案：C

85. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是()

- A: 绝经后 5 年之内
- B: 大于 60 岁
- C: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁
- D: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

答案：D

86. 沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

- A: 注意语言的表达
- B: 关注特殊人群
- C: 注意掌握时间
- D: 认真聆听

答案：C

87. 运动员在比赛前使用可快速降低体重，但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

- A: 苯丙酸诺龙
- B: 人促红细胞生成素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 可待因

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/798012035045007022>