# 2024甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县《执业药师之西药学专业二》考试通关秘籍题库附答案（突破训练）

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A：阿托品

B：东莨菪碱

C：后马托品

D：新福林

**答案：D**

2.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A：药物性肝炎

B：肺纤维化

C：出血性膀胱炎

D：骨髓抑制

**答案：B**

3.用于器官移植的抗排异反应的药物是()

A：甲泼尼龙

B：硫唑嘌呤

C：环孢素

D：环磷酰胺

**答案：C**

4.（2016 年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 重组人促红素

B: 维生素 B12

C: 人血白蛋白

D: 硫酸亚铁

**答案：A**

5.轻症糖尿病患者宜选用

A: 正规胰岛素

B: 二甲双胍

C: 格列喹酮

D: 珠蛋白锌胰岛素

**答案：B**

6.可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

A: 螺内酯

B: 阿米洛利

C: 甘油果糖

D: 甘露醇

**答案：C**

7.患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38．9℃，P90 次／分，R21 次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞 16．9×109／L，中性粒细胞百分比 84．6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15～20mg／L 并且长疗程的患者

B: 老年人

C: 肾功能不全者

D: 肝功能不全者

**答案：D**

8.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释

B: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌内注射

C: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

D: 静脉用药剂量为口服的1／2时即可达到同样疗效

**答案：A**

9.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 格雷司琼

C: 阿瑞吡坦

D: 甲地孕酮

**答案：A**

10.患者，女，54岁。患风湿性二尖瓣关闭不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持治疗。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗()

A: 硝普钠

B: 米力农

C: 氨力农

D: 多巴胺

**答案：A**

11.可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

A: 氯霉素

B: 多西环素

C: 四环素

D: 青霉素

**答案：C**

12.甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A: 二氢叶酸合成酶

B: 四氢叶酸还原酶

C: 四氢叶酸合成酶

D: 二氢叶酸还原酶

**答案：D**

13.可能降低甲氨蝶呤血浆药物浓度的药物是

A: 顺铂

B: 碳酸氢钠

C: 丙磺舒

D: 磺胺类

**答案：B**

14.常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

A: 美罗培南

B: 他唑巴坦

C: 克拉维酸

D: 氨曲南

**答案：D**

15.静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 氯化钙

B: 氯化钾

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钠

**答案：D**

16.可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

A: 甲硝唑

B: 苯唑西林

C: 四环素

D: 喹诺酮类

**答案：A**

17.恶心性祛痰药尤其适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰患者的药物是

A: 溴己新

B: 氯化铵

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氨溴索

**答案：B**

18.急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

A：鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用2%酚甘油滴耳序贯治疗
B：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染
C：鼓膜穿孔前可使用2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
D：鼓膜穿孔前可使用3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
**答案：C**

19.可使维生素B
A：糖皮质激素
B：异烟肼
C：丙磺舒
D：雌激素
**答案：D**

20.使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是
A：阿司匹林
B：双嘧达莫
C：替格瑞洛
D：替罗非班
**答案：B**

21.对视觉起作用的是
A：视黄醛
B：视黄酸
C：维生素A

D: 视黄醇

**答案：A**

22.使用后可出现口腔苦味

A: 更昔洛韦

B: 氯霉素

C: 四环素可的松

D: 利巴韦林

**答案：B**

23.常用的外用痤疮治疗药不包括

A: 特比萘芬

B: 维 A 酸

C: 阿达帕林

D: 过氧苯甲酰

**答案：A**

24.洛伐他汀的作用是()

A: 主要影响胆固醇吸收

B: 主要影响胆固醇合成

C: 主要影响甘油三酯合成

D: 影响脂蛋白合成、转运及分解

**答案：B**

25.长期大量服用维生素 A 会出现

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

C：视物模糊、疲乏、乳腺肿大

D：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

**答案：B**

26.可使血小板内环磷腺苷(cAMP)浓度增高而产生抗血小板作用的药品是()。

A：替罗非班

B：双嘧达莫

C：阿司匹林

D：氯吡格雷

**答案：B**

27.治疗子宫内膜异位症的药物是

A：达那唑

B：氯地孕酮

C：左炔诺孕酮

D：他达拉非

**答案：A**

28.（2021年真题）属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是（）

A：厄洛替尼

B：来曲唑

C：长春新碱

D：环磷酰胺

**答案：C**

29.（2021年真题）血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是（）

A: 左氧氟沙星
B: 青霉素 G
C: 头孢唑林
D: 万古霉素
**答案：D**

30.（2017 年真题）可用于治疗重度痤疮,但妊娠期妇女避免使用的药物是（）
A: 异维 A 酸
B: 克拉霉素
C: 特比萘芬
D: 克罗米通
**答案：A**

31.对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是
A: 伯氨喹
B: 三苯双脒
C: 葡萄糖酸锑钠
D: 氯硝柳胺
**答案：B**

32.（2016 年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是
A: 血压升高
B: 共济失调
C: 心率减慢
D: 血管舒张

**答案：A**

33.主要用于疟疾的预防，也可用于治疗弓形虫病的药物是

A：蒿甲醚

B：乙胺嘧啶

C：双氢青蒿素

D：奎宁

**答案：B**

34.噻嗪类利尿药略增加HCO3-的排泄，是因为其可以抑制

A：Na+-Cl⁻共转运子

B：磷酸二酯酶

C：Na+-K+-2Cl⁻同向转运子

D：碳酸酐酶

**答案：D**

35.属于 α-葡萄糖苷酶抑制剂的药物是

A：那格列奈

B：利拉鲁肽

C：伏格列波糖

D：阿格列汀

**答案：C**

36.属于促凝血因子活性药的是

A：卡巴克洛

B：凝血酶

C：氨苯甲酸

D：酚磺乙胺

**答案：D**

37.（2019年真题）对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是（）

A：特拉唑嗪

B：坦洛新

C：十一酸睾酮

D：西地那非

**答案：B**

38.关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

A：与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性

B：可静脉快速推注或静脉滴注给药

C：应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆

D：避免该药耳部滴用

**答案：B**

39.疥疮及阴虱病可选用()

A：林旦霜

B：维A酸

C：酮康唑

D：阿达帕林

**答案：A**

40.变异型心绞痛不宜选用的是

A：普萘洛尔

B：硝酸甘油

C: 胍乙啶

D: 硝苯地平

**答案：A**

41.2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A: 双八面体蒙脱石散

B: 盐酸洛哌丁胺胶囊

C: 双歧三联活菌胶囊

D: 地衣芽孢杆菌胶囊

**答案：B**

42.诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 链霉素

D: 异烟肼

**答案：B**

43.（2015 年真题）李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是（）。

A: 辛伐他汀

B: 阿司匹林

C: 米氮平

D: 二甲双胍

**答案：C**

44.异丙托溴铵的作用机制是

A: 阻断 α 受体

B: 阻断白三烯受体

C: 抑制磷酸二酯酶

D: 阻断 M 受体

**答案：D**

45.患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

B: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效

C: 定期监测血清维生素 B12 水平

D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

**答案：B**

46.下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

A: 过氧苯甲酰

B: 苯甲酸苄醇

C: 硫黄软膏

D: 林旦霜

**答案：A**

47.雷尼替丁在使用中应注意

A: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

B: 对食管有刺激性，需整片吞服

C: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

D: 糖尿病患者避免使用

**答案：D**

48.下列属于超短效胰岛素的是()

A：门冬胰岛素

B：精蛋白锌胰岛素

C：甘精胰岛素

D：低精蛋白锌胰岛素

**答案：A**

49.新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A：双环醇

B：多烯磷脂酰胆碱注射剂

C：甘草酸二铵注射剂

D：硫普罗宁注射剂

**答案：B**

50.（2018 年真题）可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是（）

A：华法林

B：低分子肝素

C：达比加群酯

D：肝素钠

**答案：C**

51.降低肾素活性最强的药物是

A：可乐定

B：硝苯地平

C：卡托普利

D：普萘洛尔

**答案：D**

52.下述不属于抗血小板类药物的是

A：磷酸二酯酶抑制剂

B：非特异性纤溶酶原激活剂

C：二磷酸腺苷 P2Y12 受体激动剂

D：血栓素 A2（TXA2）抑制剂

**答案：B**

53.下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

A：毒毛花苷 K

B：地高辛

C：洋地黄毒苷

D：毛花苷丙

**答案：C**

54.呋塞米的利尿作用部位在()

A：远曲小管初段

B：肾小球

C：集合管

D：髓袢升支粗段

**答案：D**

55.血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

A：β 受体阻断剂

B：人促红素

C：噻嗪类利尿剂

D：留钾利尿剂

**答案：D**

56.服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是（）

A: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

B: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

C: 应长期合用质子泵抑制剂

D: 不推荐65岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

**答案：A**

57.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g／L，RBC3.0×1012／L，Ret2．0%，WBC、P1t均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 进食促进铁剂的吸收

B: 维生素C与本品同服，有利于吸收

C: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定

D: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶

**答案：A**

58.颅内压增高和颅脑损伤、支气管哮喘、肺源性心脏病代偿失调患者禁用()。

A: 吗啡

B: 芬太尼

C: 哌替啶

D: 曲马多

**答案：A**

59.链激酶的作用机制是

A: 抑制维生素K在肝细胞合成凝血因子

B：抑制血小板聚集

C：加速抗凝血酶III的作用

D：促进纤维蛋白溶解

**答案：D**

60.（2015年真题）可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是（）。

A：甲巯咪唑片

B：卡比马唑片

C：甲状腺片

D：复方碘口服液

**答案：A**

61.红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

A：罗红霉素

B：万古霉素

C：克拉霉素

D：红霉素

**答案：D**

62.长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

A：血小板减少症

B：应激性大出血

C：动脉粥样硬化

D：骨质疏松性骨折

**答案：D**

63.患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:（1）心绞痛急性发作;（2）心功能不全、心功能III级;（3）高血压病3级;（4）高脂血症。

A: 美托洛尔

B: 呋塞米

C: 氨氯地平

D: 阿托伐他汀

**答案：A**

64.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿哕音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖

B: 氟康唑抑制卡马西平代谢

C: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿

D: 氟康唑可使华法林代谢加快

**答案：D**

65.与PABA竞争细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的是

A: 青霉素类

B: 磺胺类

C: 喹诺酮类

D: 氨基糖苷类

**答案：B**

66.用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 黄体酮

B: 米非司酮

C: 地塞米松

D: 雷洛昔分

**答案：D**

67.因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

A: 塞来昔布

B: 吲哚美辛

C: 阿司匹林

D: 双氯芬酸

**答案：A**

68.不良反应多,治疗窗窄个体差异大,与很多药物存在不良相互作用,已降为二线用药的平喘药物是（）

A: 孟鲁司特

B: 茶碱

C: 沙美特罗

D: 氟替卡松

**答案：B**

69.地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

A：双歧杆菌

B：葡萄球菌

C：乳酸杆菌

D：拟杆菌

**答案：B**

70.患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A：中间代谢型患者

B：超快代谢型患者

C：快代谢型患者

D：慢代谢型患者

**答案：D**

71.头孢菌素类药的主要作用靶点是

A：核糖体的 30S 亚基

B：细胞壁丙氨酰丙氨酸

C：细胞内膜 PBP

D：核糖体的 50S 亚基

**答案：C**

72.（2018 年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

A：依他尼酸

B：乙酰唑胺

C：依托塞米

D：布美他尼

**答案：A**

73.阻断 H

A：奥美拉唑

B：氢氧化铝

C：哌仑西平

D：雷尼替丁

**答案：D**

74.可以防治夜盲症的是

A：叶酸

B：维生素 A

C：维生素

D：维生素 K

**答案：B**

75.（2020 年真题）患者，男，66 岁。BMI24kg/m2，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为:(1)心绞痛急性发作;(2)心功能不全、心功能 III 级;(3)高血压病 3 级;(4)高脂血症。

A：贝那普利

B：呋塞米

C：氨氯地平

D：阿托伐他汀

**答案：B**

76.关于红霉素使用的叙述，错误的是

A：重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险

B：主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出

C：在明确需要的情况下可在妊娠期使用

D：老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加

**答案：B**

77.氢氯噻嗪的药理作用是

A：与醛固酮受体结合

B：抑制近曲小管碳酸酐酶活性

C：抑制远曲小管Na+-Cl-共转运子的功能

D：提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

**答案：C**

78.可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物()

A：维A酸

B：壬二酸

C：阿达帕林

D：异维A酸

**答案：B**

79.心律失常发生的机制是

A：心肌兴奋过度导致异常

B：潜在起搏点搏动频率加快

C：心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

D：心肌兴奋冲动形成异常或传导异常

**答案：D**

80.利福平抗结核杆菌的作用原理是

A：抑制蛋白质合成

B：与锌离子络合、影响戊糖代谢

C：抑制 RNA 多聚酶

D：抑制分枝菌酸合成

**答案：C**

81.洛伐他汀的作用是

A：影响脂蛋白合成、转运及分解的药物

B：主要影响甘油三酯合成

C：主要影响胆固醇吸收

D：主要影响胆固醇合成

**答案：D**

82.合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

A：双环醇

B：多烯磷脂酰胆碱

C：还原型谷胱甘肽

D：异甘草酸镁

**答案：A**

83.（2016 年真题）可抑制细菌 β-内酰胺酶的是

A：舒巴坦

B：利福平

C：磷霉素

D：替考拉宁

**答案：A**

84.阿司匹林抗血栓形成的机制是

A：环氧酶失活，减少 TXA2 生成，产生抗血栓形成作用

B：激活抗凝血酶

C：降低凝血酶活性

D：直接对抗血小板聚集

**答案：A**

85.用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能够出现寒战、咽痛、心率加快等症状，其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应，这种反应称为

A：金鸡纳反应

B：青霉素脑病

C：吉海反应

D：瑞夷综合征

**答案：C**

86.患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2．5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A：新生儿对头孢曲松不敏感

B：新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松

C：新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

D：新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

**答案：B**

87.（2021 年真题）患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片（100mg/d）预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/798054064042007022