

全国护师类考试重点试题精编

注意事项：

1. 全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。
4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

- 1、不符合医院健康教育特点的是
A. 又称临床健康教育
B. 又称患者健康教育
C. 是有目的、有计划、有系统的健康教育活动
D. 促使职业人群自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式
E. 目的是防治疾病，促进身心康复
- 2、“苦笑面容”主要见于（ ）。
A. 新生儿脑膜脑炎
B. 新生儿败血症
C. 新生儿破伤风
D. 新生儿颅内出血
E. 新生儿缺氧缺血性脑病
- 3、固定子宫颈以维持子宫正常位置的韧带是（ ）。
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 骶结节韧带
E. 宫骶韧带
- 4、有关上呼吸道感染的护理措施，不正确的是（ ）。
A. 适当休息，多饮水
B. 清淡饮食
C. 作必要的对症处理
D. 中医中药治疗
E. 常规应用抗菌药物
- 5、关于小儿特异性免疫特征的叙述，正确的是（ ）。

编号：

姓名：

地区：

省市：

密封线

密封线

- A. 补体系统功能差
- B. 粘膜屏障作用不成熟
- C. 皮肤的屏障作用不成熟
- D. T淋巴细胞免疫功能不健全
- E. 中性粒细胞吞噬作用弱

6、心脏停搏最常见的原因是（ ）。

- A. 药物中毒或过敏
- B. 酸碱平衡失调
- C. 冠心病
- D. 电解质紊乱
- E. 意外事件

7、灭菌后的治疗巾包打开后，剩余的治疗巾有效期为（ ）。

- A. <4h
- B. <24h
- C. <48h
- D. <12h
- E. <36h

8、胃壁细胞可分泌（ ）。

- A. 胃液
- B. 碱性黏液
- C. 促胃液素
- D. 胃蛋白酶原
- E. 盐酸和内因子

9、患儿女，13个月。生后3个月起青紫逐渐加重，活动后气急，查体：生长发育明显落后，青紫明显，伴杵状指，胸骨左缘3~4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音。

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

10、治疗急性感染性喉炎时，为减轻症状，除控制感染外，还应同时应用的药物是（ ）。

- A. 镇静剂
- B. 甘露醇
- C. 止咳剂
- D. 吠喃苯胺酸
- E. 肾上腺皮质激素

11、紫外线灯消毒时，灯管距离地面的距离不应超过（ ）。

- A. 2m

- B. 2. 2m
- C. 3m
- D. 3. 5m
- E. 4m

12、会阴侧切伤口愈合不良需坐浴，实施的时间为

- A. 产后 1 天
- B. 产后 2 天
- C. 产后 3 天
- D. 产后 7 天
- E. 产后 5 天

13、女，出生 20 天。上腭见一白色乳凝块状物，不易擦去，不影响吃奶。

- A. 营养不良与口腔黏膜炎症疼痛拒食有关
- B. 口腔黏膜改变与感染有关
- C. 知识缺乏与家属对有关疾病卫生了解较少有关
- D. 疼痛与口腔黏膜炎症有关
- E. 体温升高与感染有关

14、食管癌早期诊断简易而有效的方法是（ ）。

- A. X 线食管钡透
- B. 食管镜检查
- C. 食管拉网脱落细胞学检查
- D. 气管镜检查
- E. 同位素扫描

15、高血压病人发生慢性心力衰竭的主要原因是（ ）。

- A. 血流缓慢
- B. 心室后负荷过重
- C. 心室前负荷过重
- D. 心肌收缩力减弱
- E. 心室舒张充盈受限

16、下列关于医院感染常见病原体的叙述错误的是

- A. 常为多重耐药菌株
- B. 大部分为人体正常菌群的转移菌或条件致病菌
- C. 常侵犯免疫功能低下的宿主
- D. 大肠埃希菌是泌尿道感染的主要病原菌
- E. 同一种细菌，医院外分离出的病原体菌株的耐药性更强、更广

17、目前流行性腮腺炎的主要治疗是

- A. 抗病毒治疗
- B. 抗生素治疗
- C. 流质饮食

- D. 隔离休息
- E. 对症治疗

18、引起慢性肾衰竭患者贫血最重要的原因是

- A. 铁的摄入量减少
- B. 血液透析失血及频繁抽血化验导致失血
- C. 红细胞生存周期缩短
- D. 叶酸缺乏
- E. 肾脏生成的红细胞生成素减少

19、亚急性感染性心内膜炎超声检查最典型的表现是

- A. 二尖瓣开放、关闭异常
- B. 主动脉瓣开放受限，关闭有裂隙
- C. 瓣膜上出现赘生物
- D. 左房、左室扩大
- E. 心室壁活动减弱

20、“在实施健康教育计划或评价过程中，目标人群由于各种原因中断了被干预或评价。”此现象属于哪种偏倚因素（ ）。

- A. 时间因素
- B. 测试或观察因素
- C. 回归因素
- D. 选择因素
- E. 失访

21、护士与患者交谈时，患者问及护士私生活，护士不好意思的随口道：“哦”。这属于反馈技巧的（ ）。

- A. 模糊性反馈
- B. 肯定性反馈
- C. 语言性反馈
- D. 否定性反馈
- E. 错误性反馈

22、门诊教育的主要内容是有（ ）。

- A. 患者病因的教育
- B. 医院环境的教育
- C. 常见病防治的教育
- D. 医院生活制度的教育
- E. 患者治疗原则的教育

23、引起变态反应性疾病（ ）。

- A. 败血症
- B. 支气管肺炎
- C. 胃肠炎

- D. 风湿热
- E. 咽后壁脓肿

24、化脓性脑膜炎常见并发症有（ ）。

- A. 硬脑膜下积液
- B. 颅内血肿
- C. 肺部感染
- D. 肠道感染
- E. 泌尿系感染

25、传播的分类不包括（ ）。

- A. 自我传播
- B. 组织传播
- C. 大众传播
- D. 群体传播
- E. 社团传播

26、下列哪项引起糖尿病出现多尿

- A. 饮水量过多
- B. 尿渗透压增高
- C. 葡萄糖大量丢失
- D. 血液循环系统障碍
- E. 糖尿病性肾病

27、小儿糖尿病最主要的治疗措施为（ ）。

- A. 适当调节饮食
- B. 心理治疗
- C. 格列本脲（优降糖）
- D. 甲苯磺丁脲
- E. 胰岛素治疗

28、病毒性脑炎最常见的病原体是

- A. 肠道病毒
- B. 科萨奇病毒
- C. EB 病毒
- D. 腺病毒
- E. 疱疹病毒

29、男，42岁，6小时前头部外伤后当即意识丧失，20分钟后清醒，诉头痛，呕吐3次。1小时前病人再次出现昏迷，格拉斯哥7分，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，膝腱、跟腱反射亢进。

格拉斯哥昏迷评分项目包括（ ）。

- A. 瞳孔变化、言语反应、运动反应
- B. 库欣反应、言语反应、睁眼反应

- C. 睁眼反应、言语反应、运动反应
- D. 库欣反应、睁眼反应、运动反应
- E. 瞳孔变化、睁眼反应、库欣反应

30、患者男，47岁。反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽，近两天受凉后上述症状加重，为进一步诊治收入院。查体：胸部呈过度充气征象；双肺可闻及广泛的哮鸣音，呼吸音延长。实验室检查：痰涂片可见嗜酸性粒细胞增多。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性上呼吸道感染
- B. 急性器官-支气管炎
- C. 支气管扩张症
- D. 支气管哮喘
- E. 自发性哮喘

31、各种灭菌后的内窥镜、活检钳和灭菌物品不得检出（ ）。

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 致病微生物
- C. 细菌繁殖体
- D. 任何微生物
- E. 细菌芽孢

32、注意缺陷多动障碍的两大主要症状是注意力缺陷和（ ）。

- A. 兴奋过度
- B. 动作不协调
- C. 活动过度
- D. 小动作多
- E. 情绪冲动

33、患儿，8个月。发热咳喘7天，惊厥昏迷1天，前囟膨隆，左肺有细湿啰音，胸片左下肺小点状和大片融合性阴影，脑脊液除颅压升高外无其它变化。患儿可能的诊断是（ ）。

- A. 肺炎合并高热惊厥
- B. 肺炎合并中毒性脑病
- C. 粟粒性肺结核合并结脑
- D. 肺炎合并化脓性脑炎
- E. 肺炎合并佝偻病性低钙惊厥

34、肾脏分泌的激素是（ ）。

- A. 促甲状腺激素
- B. 肾上腺素
- C. 生长激素
- D. 促红细胞生成因子
- E. 缓激肽

35、下列表述最能全面反映伦理学概念内涵的是

- A. 研究职业道德现象的科学

- B. 研究政治道德现象的科学
- C. 研究道德现象的科学
- D. 研究婚姻家庭道德现象的科学
- E. 研究社会公德的科学

36、心脏瓣膜病最常见的病因是（ ）。

- A. 先天性畸形
- B. 退行性改变
- C. 缺血性坏死
- D. 风湿热
- E. 感染性心内膜炎

37、肠道正常菌群参与合成叶酸，体现的是其（ ）。

- A. 营养作用
- B. 免疫调节作用
- C. 定植抵抗力作用
- D. 生物屏障作用
- E. 抗衰老作用

38、正常足月妊娠脐带的平均长度是（ ）。

- A. 75cm
- B. 10cm
- C. 55cm
- D. 20cm
- E. 90cm

39、儿童期下尿路感染的典型症状

- A. 水肿少尿高血压
- B. 水肿蛋白尿低蛋白血症高胆固醇血症
- C. 血尿高血压氮质血症补体低下
- D. 尿频、尿急、尿痛
- E. 循环充血高血压脑病急性肾衰

40、和患者正式交谈的主要特点是（ ）。

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语句表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

41、评价计划设计阶段进行目标人群选择、策略确定、方法设计是（ ）。

- A. 形成评价
- B. 过程评价
- C. 效应评价

- D. 结局评价
- E. 总结评价

42、患儿男，9岁。因病毒性心肌炎入院治疗2个月。今突然出现烦躁不安，面色苍白，呼吸困难，心音低钝的现象且在安静状态下也不能缓解。查体：体温38.5℃，心率130次/分，呼吸32次/分，诊断该患儿为充血性心力衰竭。患儿发病的主要发病机制是

- A. 原发性心肌收缩力下降
- B. 容量负荷过重
- C. 梗阻性疾病
- D. 继发性心肌收缩力下降
- E. 压力负荷过重

43、选择传播途径的原则不包括（）。

- A. 准确性
- B. 针对性
- C. 速度快
- D. 经济性
- E. 统一性

44、产房的空气卫生学标准是

- A. $\leq 10\text{cfu/m}$
- B. $\leq 100\text{cfu/m}$
- C. $\leq 200\text{cfu/m}$
- D. $\leq 500\text{cfu/m}$
- E. $\leq 20\text{cfu/m}$

45、10岁男孩，因发热、咳嗽5天，伴胸闷、气促，既往无先心病史。查体：体温38.5℃，气促、口周轻度发绀、精神萎靡，呼吸30次/分、两肺呼吸音粗、少量中湿啰音，心率160次/分、S1明显低钝，肝脏肋下3.0cm。X线检查和心电图示左右心室扩大，WBC $7.0 \times 10^9/L$ 。

- A. 支气管肺炎合并心力衰竭
- B. 病毒性心肌炎合并心力衰竭
- C. 先心病合并心力衰竭
- D. 心内膜弹力纤维增生症合并心力衰竭
- E. 病毒性脑炎合并心力衰竭

46、医院健康教育的最终目的是（）。

- A. 改善病人生活方式
- B. 指导病人家属正确护理
- C. 促进病人身心康复
- D. 引导病人准确服药
- E. 增强病人战胜疾病信心

47、PICC插管首选的静脉是（）。

- A. 无名静脉
- B. 上腔静脉
- C. 锁骨下静脉
- D. 贵要静脉
- E. 头静脉

48、猩红热隔离医学观察需要多久？（ ）

- A. 3天
- B. 一周
- C. 两周
- D. 一个月
- E. 两个月

49、诊断呼吸衰竭的确切依据是（ ）。

- A. 肺通气功能明显减退
- B. 呼吸的节律、频率和幅度发生改变
- C. 发绀，呼吸困难
- D. 结膜充血、水肿和精神、神经症状
- E. $\text{PaCO}_2 > 6.6\text{kPa}$ (50mmHg)、 $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ (60mmHg)

50、失恋的小张每当想起以前的女友，就用皮筋弹自己的手腕，以此希望忘记不快。这种方式是

- A. 强化法
- B. 脱敏法
- C. 厌恶法
- D. 想象法
- E. 示范法

二、多选题

51、炭疽杆菌繁殖体在日光下可存活（ ）。

- A. 2h
- B. 4h
- C. 8h
- D. 10h
- E. 12h

52、下列属于婴儿颅内压增高的典型表现是

- A. 进食后呕吐
- B. 呕吐物中必含胆汁
- C. 常因呕吐导致脱水
- D. 为喷射性呕吐
- E. 为非喷射性呕吐

53、免疫抑制剂常见的毒副作用，错误的是（ ）。

- A. 机会感染
- B. 肝炎病毒复发
- C. 新生肿瘤
- D. 呼吸抑制
- E. 骨髓抑制

54、患者女，51岁。近2年用力屏气时，子宫颈脱出阴道外口，但子宫体未脱出。应诊断为（）。

- A. 子宫脱垂一度轻型
- B. 子宫脱垂一度重型
- C. 子宫脱垂二度轻型
- D. 子宫脱垂二度重型
- E. 子宫脱垂三度

55、类风湿关节炎的基本病理改变是（）。

- A. 滑膜炎
- B. 血管炎
- C. 骨质增生
- D. 软骨增生
- E. 免疫复合物沉积

56、患者女，33岁。经产妇，孕3产2，无难产史，孕39周。4小时前开始规律宫缩，查体：宫缩持续40~50秒，间隙3分钟，胎心140次/分，头先露，宫口开大4cm，羊膜囊鼓，骨盆正常。此时最佳处理方法是（）。

- A. 急诊室留观
- B. 立即住院待产
- C. 急送产房消毒接生
- D. 待破膜后住院
- E. 灌肠促进产程

57、在我国造成肝窦型门静脉高压症的常见病因是（）。

- A. 肝炎肝硬化
- B. 肝血管先天性畸形
- C. 肝内肿瘤
- D. 血吸虫
- E. 肝外门静脉血栓形成

58、与慢性胃炎的发生有密切关系的细菌是（）。

- A. 大肠杆菌
- B. 沙门氏菌
- C. 嗜盐杆菌
- D. 幽门螺杆菌
- E. 粪链球菌

59、患儿男，1岁半。发热，咳嗽4天，曾用青霉素肌注治疗无效。昨天起拒食，呕吐，尿量减少。入院查体：体温39.8℃，脉率180次/分，呼吸65次/分，精神萎靡，烦躁不安，口唇发绀，鼻翼扇动，三凹征(+)，两肺散在中小水泡音，肝脏右肋下3cm。血白细胞 $2.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%。

- A. 体温升高
- B. 有腹胀的可能
- C. 气体交换受损
- D. 营养失调
- E. 体液不足

60、根据我国计划生育政策规定晚婚是指()。

- A. 男22周岁，女20周岁
- B. 男23周岁，女21周岁
- C. 男26周岁，女25周岁
- D. 男26周岁，女24周岁
- E. 男25周岁，女23周岁

61、有关计划的步骤，排序正确的是()。

- A. 评估形势-确定目标-比较方案-发展可选方案-选定方案-编制预算
- B. 评估形势-确定目标-发展可选方案-比较方案-选定方案-编制预算
- C. 确定目标-评估形势-发展可选方案-比较方案-选定方案-编制预算
- D. 确定目标-评估形势-比较方案-发展可选方案-选定方案-编制预算
- E. 确定目标-评估形势-比较方案-发展可选方案-编制预算-选定方案

62、临床诊断新生儿低血糖标准为：血糖<

- A. 1.2mmol/L
- B. 1.67mmol/L
- C. 2.2mmol/L
- D. 3.2mmol/L
- E. 3.67mmol/L

63、等渗性脱水水和钠丢失的成分是()。

- A. 水和钠等比例丢失
- B. 失钠大于失水
- C. 失钠小于失水
- D. 水和钠不丢失
- E. 只丢失水

64、患者女，29岁。孕40周，足月顺产一男婴，体重3500g，该产妇产后持续恶露4周，且量多有臭味。该种情况可能是()。

- A. 急性输卵管炎
- B. 脓毒血症
- C. 浆液性恶露

D. 子宫复旧欠佳

E. 宫腔感染

65、洁净手术部（室）和其他洁净场所日常监测时，空气中的细菌菌落总数（ ）。

- A. $\leq 6\text{CFU}/(30\text{分钟}\cdot\text{直径}9\text{cm}\text{平皿})$
- B. $\leq 5\text{CFU}/(30\text{分钟}\cdot\text{直径}9\text{cm}\text{平皿})$
- C. $\leq 4\text{CFU}/(15\text{分钟}\cdot\text{直径}9\text{cm}\text{平皿})$
- D. $\leq 3\text{CFU}/(30\text{分钟}\cdot\text{直径}9\text{cm}\text{平皿})$
- E. $\leq 2\text{CFU}/(15\text{分钟}\cdot\text{直径}9\text{cm}\text{平皿})$

66、原发性肝癌肝外血行转移最常见的是（ ）。

- A. 脑
- B. 肺
- C. 肾
- D. 盆腔
- E. 肾上腺

67、关于儿童急性白血病的描述，不正确的是

- A. 急性淋巴细胞白血病在小儿中的发病率较急性非淋巴细胞白血病高
- B. 白血病是造血系统的恶性增生性疾病
- C. 儿童急性白血病的治疗首选造血干细胞移植
- D. 同卵孪生儿中一个患急性白血病，另一个患白血病的几率较双卵孪生患病的几率高
- E. 目前常用MICM综合分型，有利于指导治疗和提示预后

68、3岁小儿身长95cm，体重15kg，牙20个，属于

- A. 体重、身长超过正常范围
- B. 身材异常高大
- C. 肥胖症
- D. 正常范围
- E. 营养不良

69、激励机制的源头是（ ）。

- A. 洞察需要
- B. 明确动机
- C. 满足需要
- D. 激励与反馈、约束相互补充
- E. 生理需要

70、添加蛋黄的月龄是

- A. 1~3个月
- B. 4~6个月
- C. 7~9个月
- D. 10~11个月
- E. 11~12个月

71、脓胸患者感染布满全胸腹腔称为（ ）。

- A. 全脓胸
- B. 局限性脓胸
- C. 包裹性脓胸
- D. 脓气胸
- E. 多房脓胸

72、左膈下脓肿最常见的原因是（ ）。

- A. 阑尾穿孔术后
- B. 胃切除术后
- C. 脾切除术后
- D. 左半结肠切除术后
- E. 胆囊切除术后

73、患儿女，10个月。奶粉喂养，未加任何辅食。近2个月来食欲差、面色苍白，精神不振，体重6.0kg，皮下脂肪0.3cm。

- A. 口服胃蛋白酶助消化
- B. 补充维生素
- C. 做好皮肤护理
- D. 预防低血糖
- E. 尽快给予正常饮食

74、碘伏用于消毒会阴部时应含有效碘

- A. 100mg/L
- B. 200mg/L
- C. 500mg/L
- D. 5000mg/L
- E. 5mg/L

75、以上经消化道传播感染几率最高的疾病是（ ）。

- A. 甲肝
- B. 流脑
- C. 狂犬病
- D. 梅毒
- E. 肺结核

76、食管癌多发于（ ）。

- A. 食管胸上段
- B. 食管胸中段
- C. 食管胸下段
- D. 食管胸中上段
- E. 食管颈段

77、儿童期下尿路感染的典型症状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/798061076141006116>