专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖北省伍家岗区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库大全有完整答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.氯丙嗪常见的不良反应

A：细胞缺氧、酸中毒、休克

B：恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

C：过敏反应

D：锥体外系反应

答案：D

2.青霉素可杀灭()

A：立克次体

B：病毒

C：支原体

D：螺旋体

答案：D

3.噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A：血氨

B：血钾

C：血氯

D：血钠

答案：A

4.抑制核苷酸还原酶

A：氟尿嘧啶

B：甲氨蝶呤

C：羟基脲

D：阿糖胞苷

答案：C

5.用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A：红霉素

B：克林霉素

C：克拉霉素

D：万古霉素

答案：A

6.（2019年真题）易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素B合用的抗真菌药物是（）

A：氟胞嘧啶

B：氟康唑

C：卡泊芬净

D：特比萘芬

答案：A

7.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A：黄体酮

B：米非司酮

C：左炔诺孕酮

D：甲地孕酮

答案：B

8.（2019年真题）患者，男，67岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是（）

A: 肌肉震颤

B: 抗生素相关性腹泻

C: 急性溶血性贫血

D: 红人综合征

答案：C

9.氯霉素的最严重的不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 二重感染

C: 肝脏损害

D: 抑制骨髓造血功能

答案：D

10.伊伐布雷定发挥作用特异性针对

A: 心室传导

B: 窦房结

C: 心房传导

D: 房室传导

答案：B

11.服用时必须坐位或立位、空腹、服后30分钟内不宜进食和卧床的药品是

A: 阿仑膦酸钠

B: 依普黄酮

C：依降钙素

D：雷洛昔芬

答案：A

12.患哪种疾病禁用吡喹酮

A：血吸虫病

B：囊虫病

C：绦虫病

D：眼囊虫病

答案：D

13.婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

A：2周

B：3～5天

C：3天

D：5～7天

答案：D

14.氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A：来曲唑

B：喜树碱

C：卡莫氟

D：甲氨蝶呤

答案：C

15.维拉帕米的药理作用是

A：降低窦房结和房室结的自律性

B：直接抑制Na

C：增加心肌收缩力

D：促进Ca

答案：A

16.血肌酐升至

A：大于265μmol/L

B：大于6mmol/L

C：大于7μmol/L

D：大于172μmol/L

答案：A

17.与细菌核糖体的30S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是()

A：四环素

B：青霉素

C：万古霉素

D：林可霉素

答案：A

18.通过降低血管平滑肌内钠离子浓度，使细胞内钙离子减少的是

A：肼屈嗪

B：拉贝洛尔

C：卡托普利

D：氢氯噻嗪

答案：D

19.大量用药可致球后视神经炎的药物是

A：异烟肼

B：红霉素

C：吡嗪酰胺

D：乙胺丁醇

答案：D

20.干扰肿瘤细胞转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药是

A：氟胞嘧啶

B：博来霉素

C：紫杉醇

D：多柔比星

答案：D

21.阿司匹林预防血栓形成的机制是

A：促进PG的合成

B：抑制PABA的合成

C：抑制GABA的合成

D：抑制TXA2的合成

答案：D

22.主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后2～28日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为146小时的是

A：依替膦酸二钠

B：帕米膦酸二钠

C：阿仑膦酸钠

D：唑来膦酸

答案：D

23.以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

A：预激综合征伴心房颤动或扑动

B：梗阻性肥厚型心脏病

C：慢性收缩性心力衰竭

D：室性心动过速、心室颤动

答案：C

24.夜盲症患者应选用的维生素是

A：维生素B

B：维生素D

C：维生素B

D：维生素A

答案：D

25.用于先兆性流产和习惯性流产

A：黄体酮

B：米非司酮

C：雷洛昔分

D：地塞米松

答案：A

26.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A：烟酸

B：非诺贝特

C：辛伐他汀

D：依折麦布

答案：C

27.维A酸类药物不能用于下述哪种疾病()

A：银屑病

B：角化性皮肤病

C：光敏性皮肤病

D：扁平疣

答案：C

28.磺酰脲类药物最常见的不良反应

A：腹痛、腹泻

B：低血糖

C：共济失调

D：眩晕嗜睡

答案：B

29.为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

A：VLDL

B：HDL

C：LDL

D：IDL

答案：B

30.散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A：左氧氟沙星滴眼液

B：复方托吡卡胺滴眼液

C：毛果芸香碱滴眼液

D：碘苷滴眼液

答案：B

31.以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

A：同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应

B：酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用

C：用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出

D：注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗

答案：C

32.（2018年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

A：乙酰唑胺

B：布美他尼

C：依他尼酸

D：依托塞米

答案：C

33.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：呋塞米

B：氨苯蝶啶

C：吲达帕胺

D：乙酰唑胺

答案：A

34.决定皮肤外用药物临床疗效的关键因素是

A：剂型

B：皮肤温度

C：药物浓度

D: 经皮吸收

答案：D

35.下列药物组合有协同作用的是

A: 青霉素+螺旋霉素

B: 青霉素+氯霉素

C: 青霉素+四环素

D: 青霉素+庆大霉素

答案：D

36.哌拉西林

A: 对G+、G-球菌及螺旋体等有效

B: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

C: 对G+、G-球菌，特别是对G-杆菌有效

D: 对支原体有效

答案：B

37.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸人、氨茶碱静脉滴注治疗。

A: 惊厥

B: 支气管痉挛

C: 血压下降

D: 心律失常

答案：D

38.低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 每日化疗前，应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松

B: 5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

C：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松

D：奥美拉唑+口服地塞米松

答案：A

39.不属于减鼻充血药的是()

A：麻黄碱

B：色甘酸钠

C：羟甲唑啉

D：伪麻黄碱

答案：B

40.卡泊三醇治疗银屑病的作用机制是

A：能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

B：与维A酸细胞核受体有较高亲和力

C：通过角蛋白表达正常化，促进角朊细胞末端分化

D：可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常

答案：A

41.患者，女，55岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率120次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A：老年高血压患者一般首选β受体阻断剂

B：长期应用者突然停药可发生反跳现象

C：糖脂代谢异常时首选β受体阻断剂

D：作为一级预防，降低心肌梗死死亡率

答案：B

42.泛昔洛韦口服后代谢为

A：阿昔洛韦

B：西多福韦

C：喷昔洛韦

D：更昔洛韦

答案：C

43.对合并有高氨血症的便秘患者,适宜使用的泻药是

A：乳果糖

B：聚乙二醇4000

C：硫酸镁

D：甘油

答案：A

44.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A：特拉唑嗪

B：双氯芬酸

C：氢氯噻嗪

D：美托洛尔

答案：C

45.阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

A：普适泰

B：度他雄胺

C：依立雄胺

D：非那雄胺

答案：A

46.可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

A：沙丁胺醇

B：氨茶碱

C：可待因

D：布地奈德

答案：C

47.伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

A：西多福韦

B：更昔洛韦

C：阿昔洛韦

D：喷昔洛韦

答案：B

48.掩盖低血糖反应的抗心律失常药是()

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：利多卡因

D：普萘洛尔

答案：D

49.（2021年真题）可干扰转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药物是（）

A：顺铂

B: 丝裂霉素

C: 多柔比星

D: 塞替派

答案：C

50.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

B: 复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

C: 左炔诺孕酮（1

D: 十一酸睾酮（40mg）

答案：C

51.代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性()

A: 巯嘌呤

B: 环磷酰胺

C: 纳武利尤单抗

D: 氟尿嘧啶

答案：B

52.眼底散瞳检查宜选用

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 氯霉素滴眼剂

答案：A

53.正在使用氯吡格雷的患者如需同时使用质子泵抑制剂，应选择()

A：埃索美拉唑

B：奥美拉唑

C：泮托拉唑

D：兰索拉唑

答案：C

54.（2021年真题）乙内酰脲类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制Na+通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是（）

A：左乙拉西坦

B：卡马西平

C：苯妥英钠

D：加巴喷丁

答案：C

55.可同时作用于胰岛α、β细胞的是

A：胰岛素

B：西格列汀

C：二甲双胍

D：格列本脲

答案：B

56.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A：抑制免疫功能只抗炎不抗菌

B：促进胃酸分泌

C：抑制蛋白质合成

D：水钠潴留

答案：D

57.普通感冒患者,有单纯性咳嗽症状,宜选用的药物是()

A: 对乙酰氨基酚滴剂

B: 茶碱缓释片

C: 右美沙芬片

D: 氯苯那敏片

答案：C

58.患者，男，29岁。因反酸、烧心、胸骨后隐痛1个月余就诊。胃镜检查提示，反流性食管炎。最适用于该患者的药物是

A: 奥美拉唑

B: 尼扎替丁

C: 西咪替丁

D: 雷尼替丁

答案：A

59.可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是()

A: 吡嗪酰胺

B: 对氨基水杨酸

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案：C

60.与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

A: 甲睾酮

B: 丙酸睾酮

C: 非那雄胺

D: 硝酸甘油

答案：D

61.干扰核酸生物合成的药物是()

A：顺铂

B：氟尿嘧啶

C：高三尖杉酯碱

D：多柔比星

答案：B

62.抑制胃酸分泌作用最强的是()

A：法莫替丁

B：雷尼替丁

C：西咪替丁

D：奥美拉唑

答案：D

63.（2020年真题）患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A：双氯芬酸

B：华法林

C：氯吡格雷

D：奥美拉唑

答案：B

64.通过抑制HMG-CoA还原酶调血脂的药物是

A：阿昔莫司

B：洛伐他汀

C：烟酸

D：依折麦布

答案：B

65.稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

A：维拉帕米

B：硝苯地平

C：地尔硫

D：普萘洛尔

答案：A

66.口服存在首关效应的药物是

A：羧甲司坦

B：溴已新

C：氨溴索

D：乙酰半胱氨酸

答案：D

67.非选择性NSAID可引起胃黏膜损伤的原因是

A：抑制COX-1

B：阻滞ARB

C：抑制COX-2

D：抑制AC

答案：A

68.抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反是()。

A：急性肾衰竭

B：胰腺坏死

C: 肺部纹理加重

D: 急性肝衰竭

答案：A

69.大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

A: 藻酸双酯钠

B: 阿伐他汀

C: 普伐他汀

D: 氟伐他汀

答案：B

70.应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

A: 青霉素

B: 四环素

C: 氯霉素

D: 多西环素

答案：D

71.可用肝病的氨基酸制剂是

A: 复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

B: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液

D: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

答案：B

72.下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

A: 谷氨酸

B: 精氨酸

C：门冬氨酸

D：赖氨酸

答案：B

73.氯霉素的抗菌作用机制是()

A：干扰细菌的细胞壁合成

B：干扰细菌的RNA转录

C：抑制细菌的DNA合成

D：抑制细菌的蛋白质合成

答案：D

74.螺内酯临床常用于()

A：脑水肿

B：尿崩症

C：醛固酮升高引起的水肿

D：急性肾衰竭

答案：C

75.西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

A：阻断CTZ的D

B：阻断H

C：抗幽门螺杆菌

D：抑制胃壁细胞的H

答案：B

76.伊曲康唑属于

A：吗啉类

B：丙烯胺类

C：唑类

D：抗生素类

答案：C

77.存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A：卡莫司汀

B：表柔比星

C：泼尼松

D：多西他赛

答案：B

78.服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

A：链霉素

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：吡嗪酰胺

答案：B

79.下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体阻断剂的是

A：替罗非班

B：硫酸亚铁

C：阿司匹林

D：双嘧达莫

答案：A

80.主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

A：依西美坦

B：他莫昔芬

C：氟维司群

D：来曲唑

答案：B

81.治疗阴道滴虫病的首选药物是()

A：甲硝唑

B：多黏菌素

C：克林霉素

D：呋喃妥因

答案：A

82.选择性COX-2抑制剂引起心脑血管不良反应的机制是

A：负性肌力作用，造成心衰

B：抑制前列腺素的生成，使血栓素升高，促进血栓形成

C：促进TXA2的合成，促进血小板聚集

D：降低腺苷环化酶的活性，促进血小板聚集

答案：B

83.适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的2型糖尿病患者的药物是

A：瑞格列奈

B：利拉鲁肽

C：骨化三醇

D：葡萄糖酸钙

答案：A

84.可用于治疗青光眼的是

A：哌替啶

B：阿托品

C：新斯的明

D：毛果芸香碱

答案：D

85.若无禁忌,冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是

A：肝素

B：阿司匹林

C：氯吡格雷

D：依诺肝素

答案：B

86.属于第四代头孢菌素的药物是

A：头孢克洛

B：头孢噻肟

C：头孢吡肟

D：头孢拉定

答案：C

87.抑制细菌核酸合成的抗菌药物是

A：磺胺甲噁唑甲氧苄啶

B：利福喷丁

C：头孢米诺

D：头孢吡肟

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/798076007042007022