

西医综合（骨折）历年真题试卷汇编 1 (题后含答案及解析)

题型有：1. X 型题 2. A1 型题 3. A3/A4 型题

1. (2012 年第 180 题)典型性先天性髋脱位的主要发病因素有
- A. 髋臼发育不良
 - B. 股骨颈前倾角增大
 - C. 关节囊、韧带松弛
 - D. 股骨头发育不良

正确答案：A,C

解析：先天性髋脱位的病因仍不十分清楚，与种族、地域、基因异常及内分泌等因素有关，且约 20% 患儿有家族史。其中，原发性髋臼发育不良及关节囊、韧带松弛是髋关节脱位的重要病因。而股骨颈前倾角增大、股骨头发育不良为先天性髋脱位的病理改变。

知识模块：骨折

2. (2013 年第 180 题)关于先天性肌性斜颈，下列描述不正确的有
- A. 头部向健侧倾斜
 - B. 下颌转向健侧
 - C. 患侧面部发育较大
 - D. 健侧面部发育较大

正确答案：A,C

解析：先天性肌性斜颈(cMT)是指一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩，导致颈部和头面部向患侧偏斜畸形。病因至今仍不完全清楚，考虑与先天性或遗传因素有关。主要表现为婴儿出生一侧胸锁乳突肌出现肿块，质硬、椭圆形或圆形，不活动，无压痛。半年左右肿块逐渐消失，但胸锁乳突肌出现纤维性挛缩、变短，呈条索状，导致头偏向患侧，下颌转向健侧肩部。随病情继续发展，双侧面部发育不对称，健侧长而圆、患侧短而扁，双眼、双耳不在同一水平，严重者可有颈椎侧凸畸形。

知识模块：骨折

3. (2012 年第 180 题)典型性先天性髋脱位的主要发病因素有
- A. 髋臼发育不良
 - B. 股骨颈前倾角增大
 - C. 关节囊、韧带松弛
 - D. 股骨头发育不良

正确答案：A,C

解析：先天性髋脱位的病因仍不十分清楚，与种族、地域、基因异常及内分泌等因素有关，且约 20% 患儿有家族史。其中，原发性髋臼发育不良及关节囊、韧带松弛是髋关节脱位的重要病因。而股骨颈前倾角增大、股骨头发育不良为先天性髋脱位的病理改变。

知识模块：骨折

4. (2013 年第 180 题)关于先天性肌性斜颈，下列描述不正确的有
- A. 头部向健侧倾斜
 - B. 下颌转向健侧
 - C. 患侧面部发育较大
 - D. 健侧面部发育较大

正确答案：A,C

解析：先天性肌性斜颈(cMT)是指一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩，导致颈部和头面部向患侧偏斜畸形。病因至今仍不完全清楚，考虑与先天性或遗传因素有关。主要表现为婴儿出生一侧胸锁乳突肌出现肿块，质硬、椭圆形或圆形，不活动，无压痛。半年左右肿块逐渐消失，但胸锁乳突肌出现纤维性挛缩、变短，呈条索状，导致头偏向患侧，下颌转向健侧肩部。随病情继续发展，双侧面部发育不对称，健侧长而圆、患侧短而扁，双眼、双耳不在同一水平，严重者可有颈椎侧凸畸形。

知识模块：骨折

5. (2002 年第 91 题)下列各项中，哪项更有助于鉴别股骨颈骨折与股骨粗隆间骨折

- A. 髋关节压痛
- B. 患肢轻度内收
- C. Bryant 三角底边短缩
- D. 患肢外旋角度 E. 患肢短缩程度

正确答案：D

解析：经股骨颈骨折检查时可发现患肢出现外旋畸形，一般在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间。这是由于骨折远端失去了关节囊及髂股韧带的稳定作用，附于大转子的臀中、小肌和臀大肌的牵拉和附于小转子的髂腰肌和内收肌群的牵拉，而发生外旋畸形。若外旋畸形达到 90° ，应怀疑有转子间骨折，又称股骨粗隆间骨折。故鉴别这两者的要点在于外旋的角度，大于 90° 是转子间骨折。

知识模块：骨折

6. (2003 年第 90 题)下列骨折中，最不稳定的是
- A. L2 椎体 1 / 4 压缩骨折
 - B. 股骨干螺旋形骨折
 - C. 肱骨干青枝骨折
 - D. 胫骨上端横形骨折 E. 肩胛骨裂纹骨折

正确答案：B

解析：骨折根据骨折端的稳定程度可分为稳定性骨折和不稳定性骨折。稳定性骨折是在生理外力作用下，骨折端不易发生移位的骨折，如裂缝骨折、青枝骨折、横行骨折、压缩性骨折、嵌插骨折等；不稳定性骨折是在生理外力作用下，骨折端极易发生移位的骨折，如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

知识模块：骨折

7. (2003 年第 92 题)肱骨干中段骨折反复手法复位易导致
- A. 桡神经损伤
 - B. 正中神经损伤
 - C. 尺神经损伤
 - D. 腋神经损伤 E. 肌皮神经损伤

正确答案：A

解析：在肱骨干中下 1 / 3 段后外侧有桡神经沟，有由臂丛神经后束发出的桡神经经内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。此处骨折容易发生桡神经损伤。

知识模块：骨折

8. (2004 年第 90 题)Smith 骨折桡骨远端的移位畸形是
- A. 向尺侧及背侧移位
 - B. 向桡侧及背侧移位
 - C. 向尺侧及掌侧移位
 - D. 向桡侧及掌侧移位 E. 只向掌侧移位

正确答案：D

解析：屈曲型桡骨远端骨折(Smith 骨折)常由于跌倒时，腕关节屈曲、手背着地受伤引起。X 线拍片可见典型移位，近折端想背侧移位，远折端向掌侧、桡侧移位。

知识模块：骨折

9. (2005 年第 104 题)下列骨折中，最不稳定的是
- A. 裂缝骨折
 - B. 横形骨折
 - C. 螺旋骨折
 - D. 青枝骨折 E. 嵌插骨折

正确答案：C

解析：根据骨折端稳定程度分类：(1)稳定性骨折：骨折端不易移位或复位后不易再发生移位者。如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩性骨折、嵌插骨折等。(2)不稳定性骨折：骨折端易移位或复位后易再移位者，如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

知识模块：骨折

10. (2005 年第 106 题)女性，70 岁，行走时不慎滑倒，即感右髋部疼痛，2 小时后来院，查体右髋部有皮下淤血、局部压痛、右下肢较左下肢短缩3 cm，右下肢外旋 80° 畸形。最可能的诊断是

- A. 髋关节脱位
- B. 股骨转子间骨折
- C. 髋臼骨折
- D. 股骨大转子骨折 E. 骨盆骨折

正确答案：B

解析：中、老年人有摔倒受伤史，伤后感髋部疼痛，下肢活动受限，不能站立和行走，最常见的是股骨颈骨折和转子间骨折。两者的鉴别点是下肢外旋的角度，若外旋畸形在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间，考虑股骨颈骨折；而转子间骨折为关节外骨折，外旋畸形更明显，可达 90° 左右。故该患者最可能的诊断是股骨转子间骨折。而骨盆骨折、髋关节脱位及髌臼骨折为高能量、强暴力创伤所致，好发生于年轻患者；股骨大转子骨折不会产生肢体的短缩，均不符合题意。
知识模块：骨折

11. (2006 年第 103 题)桡骨远端骨折，骨折线经关节面，远端骨折片向背侧移位，该骨折诊断为

- A. Colles 骨折
- B. Smith 骨折
- C. Barton 骨折
- D. Monteggia 骨折 E. Galeazzi 骨折

正确答案：C

解析：桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位(Barton 骨折)是桡骨远端骨折的一种特殊类型。在腕背伸、前臂旋前位跌倒，手掌着地，暴力通过腕骨传导，撞击桡骨关节背侧发生骨折，腕关节也随之而向背侧移位。临床上表现为与 Colles 骨折相似的“银叉”畸形及相应的体征，X 线拍片可发现典型的移位。而 Colles 骨折、Smith 骨折分别是指伸直型、屈曲型桡骨下端骨折；尺骨上 $1/3$ 骨干骨折可合并桡骨小头脱位，称为孟氏(Monteggia)骨折；桡骨干下 $1/3$ 骨折合并尺骨小头脱位，称为盖氏(Galeazzi)骨折。
知识模块：骨折

12. (2006 年第 105 题)下列哪种骨折发生后，容易发生缺血性骨坏死

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨转子间骨折
- C. 股骨干骨折
- D. 股骨远端骨折 E. 胫骨平台骨折

正确答案：A

解析：骨折使某一骨折段的血液供应被破坏，而发生该骨折段缺血性坏死。常见的有腕舟状骨骨折后近侧骨折段缺血性坏死，股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死。成人股骨头的血供来源有：(1)股骨头圆韧带内的小凹动脉，提供股骨头凹部的血液循环；(2)股骨干滋养动脉升支，沿股骨颈进入股骨头；(3)旋股内、外侧动脉的分支，是股骨头、颈的重要营养动脉。旋股内侧动脉发自股深动脉，在股骨颈基底部分为：髂外侧动脉，干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉。而髂外侧动脉供应股骨头 $4/5 \sim 2/3$ 区域的血液循环，是股骨头最主要的供血来源。股骨颈头下型骨折仅有小凹动脉供血，故最易导致股骨头缺血坏死。
知识模块：骨折

13. (2007 年第 104 题)男性，22 岁，车祸致骨盆骨折，不会发生的并发损伤是

- A. 直肠损伤

- B. 膀胱损伤
- C. 脊髓损伤
- D. 坐骨神经损伤

正确答案：C

解析：骨盆骨折是严重创伤，复杂的骨盆骨折治疗困难，伤残率和死亡率均较高。骨盆骨折的并发症有(1)腹膜后血肿：可有血管损伤；(2)盆腔内脏损伤：膀胱、后尿道与直肠损伤，尿道的损伤远比膀胱损伤多见；(3)脂肪栓塞与静脉栓塞：盆腔内静脉丛破裂可引起脂肪栓塞，发生率可高达35%~50%；(4)神经损伤：主要是腰骶神经丛与坐骨神经损伤。因正常人脊髓终止于第1腰椎体的下缘，故腰2水平以下的脊柱损伤不可能发生脊髓损伤。知识模块：骨折

14. (2007年第106题)下列骨折中，属稳定骨折的是

- A. 粉碎骨折
- B. 螺旋骨折
- C. 横形骨折
- D. 斜形骨折

正确答案：C

解析：根据骨折端稳定程度分为两类(1)稳定性骨折：骨折端不易移位或复位后不易再发生移位者，如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩性骨折、嵌插骨折等。(2)不稳定性骨折：骨折端易移位或复位后易再移位者。如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。骨折分类用于指导治疗方法的选择，稳定性骨折多选择保守治疗方法，不稳定骨折多需要手术治疗。知识模块：骨折

15. (2007年第162题)骨筋膜室综合征多见于

- A. 腰部
- B. 上臂
- C. 大腿
- D. 小腿

正确答案：D

解析：骨筋膜室综合征即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期征候群。最多见于前臂掌侧和小腿。根据其缺血的不同程度而导致：(1)濒临缺血性肌挛缩——缺血早期，及时处理恢复血液供应后，可不发生或仅发生极小量肌肉坏死，可不影响肢体功能；(2)缺血性肌挛缩——较短时间或程度较重的不完全缺血，恢复血液供应后大部分肌肉坏死，形成挛缩畸形，严重影响患肢功能；(3)坏疽——广泛、长时间完全缺血，大量肌肉坏疽，常需截肢。知识模块：骨折

16. (2008年第89题)患者，女，72岁。股骨颈头下骨折，有移位1天。其最佳治疗方法是

- A. 胫骨结节骨牵引

- B. 闭合复位，穿丁字鞋，卧床休息
- C. 闭合复位，空心螺钉固定
- D. 全髋人工关节置换术

正确答案：D

解析：股骨颈骨折按骨折线部位分为：(1)股骨头下骨折；(2)经股骨颈骨折；(3)股骨颈基底骨折。其手术指征：(1)内收型和有移位的骨折；(2)65 岁以上老年人的股骨头下型骨折，股骨头坏死率很高，多采用人工关节置换术；(3)青少年的股骨颈骨折，需要达到解剖复位；(4)早期误诊、漏诊，或治疗方法不当，导致股骨颈陈旧骨折不愈合，股骨头缺血坏死，或合并髋关节骨关节炎。该女性患者，72 岁，诊断股骨颈头下骨折，并有移位，故首选全髋人工关节置换术治疗。
知识模块：骨折

17. (2008 年第 90 题)下列骨折临床愈合标准中，错误的是
- A. 局部无压痛及纵向叩击痛
 - B. 局部无异常活动
 - C. X 线摄片显示骨折断端塑形良好
 - D. X 线摄片显示有连续骨痂通过骨折线

正确答案：C

解析：临床愈合是骨折愈合的重要阶段，其标准为：(1)局部无压痛及纵向叩击痛；(2)局部无异常活动；(3)X 线片显示骨折处有连续性骨痂，骨折线已模糊；(4)拆除外固定后，如为上肢能向前平举 1kg 重物持续达 1 分钟；如为下肢不扶拐能在平地连续步行 3 分钟，并不少于 30 步；连续观察 2 周骨折处不变形(注：第 8 版教材已经把第(4)点删除)。而骨折断端的塑形多在骨折临床愈合后的较长时间内(1~2 年)进行，因此不属于骨折临床愈合的标准。
知识模块：骨折

患者，男，17 岁。半小时前因跳马比赛不慎颈部受伤，初步检查：患者可主动做肩前屈、肘屈运动，但不能主动做肘伸运动，双下肢软瘫。

18. (2009 年第 88 题)胫骨下 1 / 3 处骨折，愈合较慢的原因是
- A. 附近的主要血管损伤
 - B. 附近的周围神经损伤
 - C. 远侧骨折段完全丧失血液供应
 - D. 远侧骨折段血液供应减弱

正确答案：D

解析：胫骨的营养血管从胫骨干上、中 1 / 3 交界处进入骨内，在中、下 1 / 3 的骨折使营养动脉损伤，供应下 1 / 3 段胫骨的血循环显著减少；同时下 1 / 3 段胫骨几乎无肌附着，由胫骨远端获得的血循环很少，因此下 1 / 3 段骨折愈合较慢，容易发生延迟愈合或不愈合。
知识模块：骨折

19. (2010 年第 90 题)女性, 72 岁, 因车祸来院。查体: 右下肢外旋、短缩畸形, X 线平片示: 右股骨颈头下型骨折, 部分移位。既往有高血压, 服药控制在 130~140 / 80-90mmHg。最适宜的治疗方法是

- A. 右下肢持续牵引、对症治疗
- B. 切开复位内固定
- C. 手法复位, 石膏固定
- D. 人工关节置换

正确答案: D

解析: 该女性老年(72 岁)患者, 有高血压史, 已诊断为股骨颈头下骨折伴部分移位(提示股骨头的血循环已严重破坏, 骨折不愈合及缺血性坏死发生率均很高), 可根据患者的全身情况和对手术的耐受能力, 选择人工股骨头置换术或全髋关节置换术。股骨颈骨折的手术指征: (1)内收型和有移位的骨折; (2)65 岁以上老年人的股骨头下型骨折, 股骨头坏死率很高, 多采用人工关节置换术; (3)青少年的股骨颈骨折, 需要达到解剖复位; (4)早期误诊、漏诊, 或治疗方法不当, 导致股骨颈陈旧骨折不愈合。股骨头缺血坏死, 或合并髋关节骨关节炎。知识模块: 骨折

20. (2011 年第 88 题)下列关于股骨颈骨折的叙述. 错误的是

- A. 老年股骨颈骨折不易发生缺血坏死
- B. 头下型骨折易出现缺血坏死
- C. 基底型骨折不易出现缺血坏死
- D. 缺血坏死可发生在骨折数年后

正确答案: A

解析: (1)成人股骨头的血供来源有: ①股骨头圆韧带内的小凹动脉, 提供股骨头凹部的血液循环; ②股骨干滋养动脉升支, 沿股骨颈进入股骨头; ③旋股内、外侧动脉的分支, 是股骨头、颈的重要营养动脉。旋股内侧动脉又可分为髂外外侧动脉, 干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉。髂外外侧动脉供应股骨头 2 / 3~4 / 5 区域的血液循环, 是股骨头最主要的供血来源。旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因。旋股内、外侧动脉的分支互相吻合, 在股骨颈基底部形成动脉环。(2)头下型骨折骨折线位于头下, 股骨头仅存小凹动脉供血, 发生缺血坏死的机会很大; 经股骨颈骨折骨折线位于颈中部, 股骨干滋养动脉升支被损伤, 也易发生股骨头缺血坏死; 股骨颈基底骨折骨折线位于股骨颈与大、小转子间连线处, 由于有旋股内、外侧动脉分支吻合形成的动脉环提供血液循环, 骨折容易愈合, 不易出现缺血坏死。(3)股骨颈骨折是否出现缺血坏死与骨折部位、骨折类型、移位程度、治疗方式等有关, 可发生在骨折数年后。(4)股骨颈骨折好发于老年人, 青少年较少发生, 且年龄过高是影响愈合的一个因素(与骨质疏松有关), 65 岁以上老年人股骨颈头下型骨折, 由于股骨头的血液循环已严重破坏, 股骨头坏死率很高, 多采用人工关节置换术。知识模块: 骨折

21. (2012 年第 88 题)患儿 2 岁, 某母在牵位患儿双手做游戏时, 患儿突然大哭, 诉上肢疼痛, 其左上肢屈曲, 不肯用该手取物。患儿最有可能的是诊断是

- A. 肩关节脱位

- B. 肘关节脱位
- C. 桡骨小头半脱位
- D. 腕关节脱位

正确答案：C

解析：桡骨小头半脱位多发生在5岁以下的儿童，一般桡骨头为向桡侧的半脱位。儿童的腕、手有被向上的牵位受伤史；患儿感肘部疼痛，活动受限，前臂处于半屈位及旋前位；检查肘部外侧有压痛，即应诊断为桡骨小头半脱位。桡骨小头半脱位X线摄片常阴性。肩、肘、腕关节脱位均需较大的间接暴力，很少由牵拉双手引起，且肩关节脱位、腕关节脱位与本患儿的发病部位不相符。

知识模块：骨折

22. (2012年第89题)某篮球运动员，在起跳抢球时与对方球员相撞，即感左髌部疼痛，下肢活动受限。X线显示右髌前上棘撕脱骨折。其骨折成因为

- A. 直接暴力所致
- B. 间接暴力所致
- C. 疲劳性骨折
- D. 病理性骨折

正确答案：B

解析：骨折可由创伤和骨骼疾病所致，后者如骨髓炎、骨肿瘤所致骨质破坏，受轻微外力即发生的骨折，称为病理性骨折。而前者包括(1)直接暴力：暴力直接作用使受伤部位发生骨折，常伴有不同程度的软组织损伤。(2)间接暴力：暴力通过传导、杠杆、旋转和肌收缩使肢体远处发生骨折。(3)积累性劳损：长期、反复、轻微的直接或间接损伤可致使肢体某一特定部位骨折，如远距离行军易致第2、3跖骨及腓骨下1/3骨干骨折，称为疲劳性骨折。而缝匠肌起于髌前上棘，止于胫骨上端内侧面，主要作用是屈髋、屈膝。故当运动员起跳抢球时，屈髋屈膝，缝匠肌猛烈收缩，可导致髌前上棘撕脱性骨折。此为间接暴力所致。

知识模块：骨折

23. (2013年第88题)儿童肘部外伤后，鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠的体征是

- A. 肿胀明显
- B. 活动明显受限
- C. 畸形
- D. 肘后三角关系改变

正确答案：D

解析：肱骨髁上骨折和肘关节脱位均是常见的肘部损伤，伤后两者都可出现局部肿痛、活动受限、畸形等临床表现，但肘后三角关系是否改变两者不同。肘后三角关系是指肱骨内外上髁与尺骨鹰嘴的解剖关系，正常人当肘关节伸直时，三点在一直线上；肘关节在任何角度屈曲时，三点呈一底边向上的等腰三角形。肱骨髁上骨折时骨折线在髁上，三者关系未受影响，肘后三角关系未改变；但肘关节脱位时，尺骨鹰嘴和桡骨头与肱骨下端位置关系改变，肘后三角关系改

变。

知识模块：骨折

24. (2014 年第 90 题)男性, 34 岁。1 年前打篮球受伤后膝关节经常隐痛, 检查发现: 右膝前内侧关节间隙处有压痛, McMurray 试验阳性, 最可能的诊断是

- A. 内侧副韧带损伤
- B. 内侧半月板损伤
- C. 前十字韧带损伤
- D. 创伤性关节炎

正确答案: B

解析: 该患者于打篮球受伤后出现膝关节经常性隐痛, 检查示右膝前内侧关节间隙处有压痛, 提示半月板损伤可能性大。而半月板旋转挤压试验(McMurray 试验)是指患者仰卧, 患侧髌膝完全屈曲, 检查者一手放在关节外间隙处作触诊, 另一手握住足跟后作小腿大幅度环转运动。内旋环转试验外侧半月板, 外旋环转试验内侧半月板。因该患者右膝前内侧有压痛, 应做外旋环转试验, 结果阳性, 故最可能的诊断是内侧半月板损伤。

知识模块：骨折

25. (2002 年第 91 题)下列各项中, 哪项更有助于鉴别股骨颈骨折与股骨粗隆间骨折

- A. 髋关节压痛
- B. 患肢轻度内收
- C. Bryant 三角底边短缩
- D. 患肢外旋角度 E. 患肢短缩程度

正确答案: D

解析: 经股骨颈骨折检查时可发现患肢出现外旋畸形, 一般在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间。这是由于骨折远端失去了关节囊及髂股韧带的稳定作用, 附于大转子的臀中、小肌和臀大肌的牵拉和附于小转子的髂腰肌和内收肌群的牵拉, 而发生外旋畸形。若外旋畸形达到 90° , 应怀疑有转子间骨折, 又称股骨粗隆间骨折。故鉴别这两者的要点在于外旋的角度, 大于 90° 是转子间骨折。

知

识模块：骨折

26. (2003 年第 90 题)下列骨折中, 最不稳定的是

- A. L2 椎体 1 / 4 压缩骨折
- B. 股骨干螺旋形骨折
- C. 肱骨干青枝骨折
- D. 胫骨上端横形骨折 E. 肩胛骨裂纹骨折

正确答案: B

解析: 骨折根据骨折端的稳定程度可分为稳定性骨折和不稳定性骨折。稳定性骨折是在生理外力作用下, 骨折端不易发生移位的骨折, 如裂缝骨折、青枝骨折、横行骨折、压缩性骨折、嵌插骨折等; 不稳定性骨折是在生理外力作用下, 骨折端极易发生移位的骨折, 如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

知识模块：骨折

27. (2003 年第 92 题)肱骨干中段骨折反复手法复位易导致

- A. 桡神经损伤
- B. 正中神经损伤
- C. 尺神经损伤
- D. 腋神经损伤 E. 肌皮神经损伤

正确答案：A

解析：在肱骨干中下 1 / 3 段后外侧有桡神经沟，有由臂丛神经后束发出的桡神经经内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。此处骨折容易发生桡神经损伤。

知识模块：骨折

28. (2004 年第 90 题)Smith 骨折桡骨远端的移位畸形是

- A. 向尺侧及背侧移位
- B. 向桡侧及背侧移位
- C. 向尺侧及掌侧移位
- D. 向桡侧及掌侧移位 E. 只向掌侧移位

正确答案：D

解析：屈曲型桡骨远端骨折(Smith 骨折)常由于跌倒时，腕关节屈曲、手背着地受伤引起。X 线拍片可见典型移位，近折端向背侧移位，远折端向掌侧、桡侧移位。

知识模块：骨折

29. (2005 年第 104 题)下列骨折中，最不稳定的是

- A. 裂缝骨折
- B. 横形骨折
- C. 螺旋骨折
- D. 青枝骨折 E. 嵌插骨折

正确答案：C

解析：根据骨折端稳定程度分类：(1)稳定性骨折：骨折端不易移位或复位后不易再发生移位者。如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩性骨折、嵌插骨折等。(2)不稳定性骨折：骨折端易移位或复位后易再移位者，如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

知识模块：骨折

30. (2005 年第 106 题)女性，70 岁，行走时不慎滑倒，即感右髋部疼痛，2 小时后来院，查体右髋部有皮下淤血、局部压痛、右下肢较左下肢短缩3 cm，右下肢外旋 80° 畸形。最可能的诊断是

- A. 髋关节脱位
- B. 股骨转子间骨折
- C. 髋臼骨折
- D. 股骨大转子骨折 E. 骨盆骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798114011137006053>