专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024江苏省盱眙县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库附答案（培优B卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.他汀类药物引起的典型药源性疾病是

A：胃肠道疾病

B：神经系统疾病

C：血液系统疾病

D：肌病

答案：D

2.患者男,70岁高血压病史14年,服用依那普利20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为190/100mHg，头颅CT检查结果为左侧脑出血,出血量约10ml，拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是（）

A：静脉滴注硝酸甘油注射液

B：静脉滴注甘露醇注射液

C：口服氨氯地平片

D：肌内注射利血平注射液

答案：B

3.下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

A：自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型

B：常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病

C：患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状

D: 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

答案：C

4.大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 肾小管阻塞

C: 直接肾毒性

D: 肾间质纤维化

答案：A

5.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47．5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他汀片40mgpoqd。

A: 氯吡格雷片

B: 双嘧达膜片

C: 华法林片

D: 对乙酰氨基酚片

答案：A

6.季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

A: 热

B: 花粉

C: 冷

D: 光线

答案：B

7.患者，女，32岁，妊娠20周。1天前发热，体温39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

A：阿昔洛韦片

B：金刚烷胺片

C：利巴韦林片

D：奥司他韦胶囊

答案：D

8.枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A：神经毒性

B：性功能减退

C：皮炎

D：腹痛

答案：A

9.使血液黏度增加、血容量增多，引起高血压的药物是

A：重组人促红细胞生成素

B：伪麻黄碱

C：咖啡因

D：糖皮质激素

答案：A

10.（2017年真题）患毒,27岁,妊娠20周,出现发热体温最高达38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是（）

A：阿奇霉素

B：甲硝唑

C：头孢噻肟钠

D: 阿米卡星

答案：C

11.易产生过敏反应，如出现全身反应需要给予抗组胺药和激素进行处理的是

A: 顺铂

B: 氨氯地平

C: 多柔比星

D: 紫杉醇

答案：D

12.骨髓增生病

A: 血小板增多

B: 淋巴细胞增多

C: 白细胞增多

D: 红细胞沉降率减慢

答案：A

13.患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5～6g，分2～3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16～30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

A: 40ml/min

B: 25.5ml/min

C: 34ml/min

D: 30ml/min

答案：B

14.可引起血红蛋白减少的疾病为

A: 胃溃疡

B: 糖尿病

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：A

15.作为预防用药错误策略，制定新药新知识培训制度，归属于

A: 人员知识培训

B: 科学发展

C: 管理规范到位

D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

16.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 药动学相互作用

B: 药理作用

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案：D

17.（2017年真题）患者,女,24岁。一周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不适，来药店购药,药师可推荐的药物是（）

A: 酞丁安滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 玻璃酸钠滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：A

18.患者，女，60岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度己L1～L4椎体T值-2．7SD，BMD749(mg／cm2)；股骨颈T值-2．2SD，BMD602(mg／cm2)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

A: 绝经期超过2年以上的妇女可以应用

B: 患有血栓栓塞性疾病者禁用

C: 肝、肾功能不全者可应用

D: 妊娠期妇女禁用

答案：C

19.沟通医药患的重要纽带的是

A: 处方调配

B: 参与临床药物治疗

C: 静脉药物配置

D: 治疗药物监测

答案：A

20.一日一次用药的外文规范缩写是

A: q.d

B: q.n

C: q.h

D: q.o.d

答案：A

21.开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏反应、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属于用药错误预防策略中的

A: 环境与流程的优化与持续改进

B: 管理规范到位

C: 科学发展

D: 人员培训

答案：A

22.患者,男,60岁,坏死性胰腺炎剖腹探查术术后2年,恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是（）

A: 干酵母片

B: 蒙脱石散

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：C

23.孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

A: 复合营养素

B: 钙剂

C: 复合维生素

D: 中草药制剂

答案：B

24.服药时，应该限制饮水的药品是

A：阿仑膦酸盐

B：苯溴马隆

C：口服补液盐

D：硝酸甘油

答案：D

25.患者，女，8岁，体重22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在2天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3天。在过去的2年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在3个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸30次／分、血压110／83mmHg、心率130次／分、体温37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO2）90％。

A：沙丁胺醇静脉注射

B：雾化沙丁胺醇

C：茶碱片

D：孟鲁司特咀嚼片

答案：B

26.关于尿路感染的说法，不正确的是

A：由细菌感染引起

B：男性发病率稍高

C：多见于育龄期和绝经后女性

D：大肠埃希菌感染最为常见

答案：B

27.急性汞中毒出现
A：恶心、呕吐、视力模糊
B：腐蚀性口腔炎
C：恶心、呕吐、口内有金属味
D：肌肉震颤、抽搐
答案：B

28.糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是
A：培氟沙星
B：加替沙星
C：培高利特
D：头孢哌酮
答案：B

29.药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈
A：替加色罗
B：培高利特
C：钆贝葡胺
D：塞来昔布
答案：A

30.中度药品不良反应是指
A：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗
B：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
C：没有临床症状，无须治疗
D：指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：D

31.观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

A: Ⅱ期临床试验

B: Ⅳ期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：C

32.连续规律用药2日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 短效β

B: 非甾体抗炎药

C: 吸入型糖皮质激素

D: β受体拮抗剂

答案：C

33.易风化的药物是()。

A: 硫酸镁

B: 硝酸甘油

C: 青霉素

D: 胃蛋白酶

答案：A

34.乳母服用青霉素，乳汁中青霉素的量低于总用药量1%的机制是其

A: 在母体血浆中处于结合状态

B: 呈弱碱性

C: 呈弱酸性

D: 解离度大

答案：C

35.（2018年真题）患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数14.6×109L,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 阿莫西林

B: 莫西沙星

C: 头孢吡肟

D: 氨苄西林

答案：B

36.抗真菌药

A: 血红蛋白量增多

B: 血小板减少

C: 中性粒细胞减少

D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：C

37.（2019年真题）患者，男，72岁。诊断:高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

A: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔

B: 应注意观察是否有黑便

C: 应定期监测血压、心率

D: 应定期监测地高辛血药浓度

答案：A

38.上市后药品再评价阶段属于

A: Ⅲ期临床试验
B: Ⅳ期临床试验
C: Ⅰ期临床试验
D: Ⅱ期临床试验
答案：B

39.美金刚的作用机制为（）
A: 抑制胆碱酯酶
B: 抑制N-甲基天冬氨酸受体
C: 脑循环改善剂
D: 钙通道阻滞剂
答案：B

40.过量服用维生素D所发生中毒的典型临床表现是：
A: 骨质疏松症或骨桥
B: 间质性骨炎或肾结石
C: 骨骼发育不良或骨软化
D: 横纹肌溶解或肌痛
答案：B

41.在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）
A: 原发性蛛网膜下腔出血
B: 缺血性脑卒中
C: 脑梗死
D: 脑出血
答案：B

42.患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压160／100mmHg。

A: AR

B: ACEI

C: β 受体阻断药

D: 钙通道阻滞药

答案：B

43.患者，女，60岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度己L1～L4椎体T值-2．7SD，BMD749(mg／cm2)；股骨颈T值-2．2SD，BMD602(mg／cm2)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

A: 氟制剂

B: 甲状旁腺素

C: 钙制剂

D: 双膦酸盐

答案：D

44.冠心病患者入不能耐受ACEI，可考虑给予（）

A: α 受体拮抗剂

B: 地高辛

C: β 受体激动剂

D: AR

答案：D

45.可提示肝硬化、慢性肝炎的是

A: 血清碱性磷酸酶升高

B: γ-谷氨酰转移酶升高

C: A/G值低于1

D: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

答案：C

46.患者，男，65岁，慢性咳嗽、喘息10余年，活动后症状明显，近7天症状加重入院，伴便秘，每周2次排便。既往有高血压病史12年；长期口服硝苯地平控释片30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温36．6℃，P82次／分，R22次／分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规WBC11．2×109／L，肺功能FEV1／FVC60％，FEV155％。治疗方案如下：氨溴索注射液30mgtidivgtt，莫西沙星氯化钠注射液0.4gbidivgtt，异丙托溴铵溶液0.5mgbid雾化吸入，布地奈德混悬液1mgbid雾化吸入

A: 异丙托溴铵注射液

B: 氨溴索注射液

C: 布地奈德混悬液

D: 硝苯地平控释片

答案：A

47.肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

A: 避免使用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 必须减量应用

D: 一般无需调整剂量

答案：B

48.采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

A: 冷性荨麻疹

B: 幼小荨麻疹

C: 人工荨麻疹

D: 热性荨麻疹

答案：C

49.（2018年真题）由带状疱疹所致的严重后遗神经痛,应选的药物是（）

A: 对乙酰氨基酚片

B: 羟考酮缓释片

C: 卡马西平片

D: 芬太尼透皮贴剂

答案：C

50.嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A: 过敏性疾病如荨麻疹

B: 感染性疾病如肺结核

C: 病毒感染性腹泻

D: 铅、铋中毒

答案：A

51.（2018年真题）患者,男,65岁,临床诊断:2型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

A: 选用美托洛尔缓释片不合理

B: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理

C: 瑞格列奈片用量不合理

D: 选用阿卡波糖片不合理

答案：B

52.治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A：选择性 α1 激动剂

B： α1 阻断剂

C：5α 还原酶抑制剂

D：抗胆碱能药物

答案：D

53.如应用利福平、异烟肼时检查肝功能，用氨基糖苷类检查听力、肾功能等，是遵照

A：了解患者及家族的过敏史

B：注意定期监测器官功能

C：注意ADR症状，尤其是迟发反应

D：注意特殊人群用药

答案：B

54.前列腺增生症治疗药物特拉唑嗪的不良反应是

A：加重闭角型青光眼

B：心动过缓

C：性功能障碍

D：体位性低血压

答案：D

55.患者，男，72岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A：解热

B: 防止冠状动脉血栓形成

C: 抗炎

D: 镇痛

答案：B

56.I类手术切口应用第三代头孢菌素，属于

A: 无适应证用药

B: 不合理联合用药

C: 超适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：A

57.运动员禁用药物中，β 受体阻断剂产生的危害是

A: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

B: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

C: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

D: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

答案：A

58.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC：5×10

A: 药用炭可吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

B：首选口服补液，必要时静脉补液

C：小柴碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

D：腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充

答案：A

59.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98％，肺部可闻及喘鸣音。

A：沙丁胺醇

B：阿莫西林

C：右美沙芬

D：喷托维林

答案：C

60.（2019年真题）湿疹患者的实验室检查结果常会出现

A：淋巴细胞减少

B：嗜酸性粒细胞增多

C：中性粒细胞减少

D：淋巴细胞增多

答案：B

61.具有缩瞳和降低眼压的拟M胆碱药是

A：噻吗洛尔

B：拉坦前列素

C：溴莫尼定

D：毛果芸香碱

答案：D

62.一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

A：6.1mmol／L

B：5.2mmol／L

C：6.2mmol／L

D：5.1mmol／L

答案：B

63.表现为“牛肉样舌”的疾病为

A：巨幼红细胞贫血

B：再生障碍性贫血

C：白血病

D：缺铁性贫血

答案：A

64.对于铁剂的使用，错误的是

A：口服铁剂宜选用2价铁?

B：口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法?

C：钙剂可促进铁剂吸收?

D：为了补足储存铁，铁剂治疗应该在Hb正常后至少再补充铁剂4～6个月?

答案：C

65.血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A：成人<40U/L

B：男性11～50U/L

C：男性<40U/L

D：成人<50U/L

答案：A

66.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A：血糖不降

B：血压升高

C：过敏反应

D：低血糖反应

答案：D

67.儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

A：4.2～6.5mmol/L

B：3.3～5.0mmol/L

C：3.3～5.5mmol/L

D：3.9～6.1mmol/L

答案：C

68.药师应当主动对药物的风险/效益进行定量评估和分析，将全部信息进行反馈，改进相关监督、管理及所使用的法律、法规这一药学服务工作属于

A：药物治疗管理

B：药物重整

C：药物评价

D: 药物警戒

答案：D

69.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别。头孢曲松属于()

A: C级

B: B级

C: D级

D: A级

答案：B

70.（2019年真题）可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，哺乳期妇女不宜选用的药物是

A: 左炔诺孕酮

B: 依那普利

C: 链霉素

D: 氯霉素

答案：A

71.欲用95%乙醇和蒸馏水配置70%乙醇1000ml，所取95%乙醇体积约为：

A: 737ml

B: 665ml

C: 700ml

D: 500ml

答案：A

72.下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

A：利尿药

B：ACEI

C：非二氢吡啶类钙拮抗剂

D：哌唑嗪

答案：D

73.对于尿液的描述正确的是

A：尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

B：正常人的新鲜尿液呈弱碱性

C：正常人每日排出尿液1～2L，其中50％为水分

D：正常人的尿量变化幅度不大

答案：A

74.患儿，3岁，因发热就诊，体温38.8℃。药师应推荐的治疗药物是

A：布洛芬混悬液

B：20％安乃近滴鼻剂

C：塞来昔布缓释片

D：阿司匹林肠溶片

答案：A

75.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见WBC15X109／L，中性粒细胞百分比85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A：如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

B：首选针对革兰阳性菌的药物

C：抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

D：选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

答案：B

76.痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

A：秋水仙碱

B：泼尼松龙

C：苯溴马隆

D：别嘌醇

答案：C

77.（2017年真题）可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是（）

A：头孢克洛

B：复方磺胺甲噁唑

C：诺氟沙星

D：阿莫西林

答案：B

78.关木通事件，关木通会导致严重的肾毒性，是因为

A：其含有甲氨蝶呤

B：其含有二甘醇

C：其含有马兜铃酸

D：其含有刺五加

答案：C

79.以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

A：硝西泮

B：丙咪嗪

C：苯巴比妥

D：奋乃静

答案：A

80.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）

A：应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

B：血小板计数<100×109/L时禁用溶栓药物

C：急性脑梗死的溶栓时间窗是48小时内

D：甘油果糖的脱水作用较甘露醇强且快

答案：B

81.脂质体药物属于

A：B级高危药品

B：C级高危药品

C：E级高危药品

D：D级高危药品

答案：B

82.轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

A：不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

B：稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

C：步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

D：休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30次/分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120次/分，奇脉，Pa0

答案：C

83.长期慢性便秘者不宜长期大量使用的是

A：番泻叶

B：硫酸镁

C：乳果糖

D：开塞露

答案：A

84.处方中外文缩写mcg代表（）

A：必要时

B：餐后

C：临睡时

D：微克

答案：D

85.患者李某，男，45岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为160／100mmHg。

A：硝酸甘油

B：维拉帕米

C：呋塞米

D：卡托普利

答案：D

86.中度支气管哮喘疾病的临床表现为

A：稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

B：步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

C：休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30次／分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120次／分，奇脉，Pa0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/798140123042007022