

## 2025 护师类之外科护理主管护师题库附答案（典型题）

### 单选题（共 50 题）

1、男性，23 岁，因第 4 胸椎椎体单纯压缩骨折卧床休息。骨折后早期胸腰部的功能锻炼方法是

- A. 三点法
- B. 四点法
- C. 五点法
- D. 俯卧挺胸法
- E. 飞燕点水法

【答案】 C

2、女性，49 岁，胸部外伤致开放性气胸，出现呼吸抑制和发绀，立即封闭胸壁伤口，行闭式胸膜腔引流术。该病人闭式性胸膜腔引流护理中，促使胸内气体排出的措施是

- A. 取半卧位
- B. 水封瓶低于引流口 60cm
- C. 保持长玻璃管在水面下 3cm
- D. 鼓励病人咳嗽和深呼吸
- E. 定时挤捏引流管

【答案】 D

3、患者，女性，胃溃疡史 3 年，今日突发腹痛，呈刀割样持续性剧痛，X 线见膈下游离气体；有移动性浊音，肠鸣音消失。患者考虑可能为

- A. 胃穿孔

- B. 肝破裂
- C. 胰腺损伤
- D. 脾破裂
- E. 肝损伤

【答案】 A

4、女性，68岁，因右腿外展型股骨颈骨折入院，拟行保守治疗。牵引期间，护士可以指导病人进行右侧患肢

- A. 膝关节伸屈活动
- B. 髋关节伸屈活动
- C. 股四头肌等长运动
- D. 助力运动
- E. 手法治疗

【答案】 C

5、患者，男性，26岁。偶尔发现尿血来院就诊。泌尿系肿瘤多数为恶性肿瘤，根据此患者情况，考虑可能性最小的是

- A. 肾癌
- B. 膀胱癌
- C. 肾盂癌
- D. 肾母细胞瘤
- E. 输尿管肿瘤

【答案】 D

6、患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。手法复位纠正该畸形时，应将骨折远端

- A. 向手背侧挤压
- B. 向手掌侧挤压
- C. 向手臂桡侧挤压
- D. 向手臂尺侧挤压
- E. 轻柔旋转复位

【答案】 D

7、男性，55岁，因咳嗽、咯血来医院就医，经检查确诊为肺癌，需入院手术。术后第一天，病人应采取适宜的体位是

- A. 左侧半卧位
- B. 头低脚高位
- C. 右侧半卧位
- D. 右1/4侧半卧位
- E. 俯卧位

【答案】 D

8、患者，女性，30岁，半年前扭伤左膝关节，后左膝关节内侧疼痛，肿胀逐渐加重，X线见左胫骨上段4cm×5cm大小的透光区，中央有肥皂泡阴影，骨端膨大。近1个月来肿胀明显，但夜间疼痛加剧，关节活动受限，再次拍X线片示胫骨上段病变扩大，肥皂泡沫阴影消失，呈云雾状阴影，肿瘤组织已侵入软组织。最恰当的处理是

- A. 截肢
- B. 刮骨术+植骨
- C. 肿块切除

- D. 刮除+骨水泥填充
- E. 广泛切除+关节置换

【答案】 A

9、患者，女性，58岁，颈肩痛伴右手麻木1年，咳嗽时加重，疼痛向左上肢放射，右手握力减退，用筷子夹菜、扣扣子等精细动作困难。检查：颈部活动受限，左拇指及前臂桡侧感觉减退。若患者接受了颈椎前路手术，术后病情观察中最重要的

- A. 脉搏
- B. 体温
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 意识

【答案】 C

10、患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。造成该患者骨折的原因为

- A. 间接暴力
- B. 直接暴力
- C. 肌肉牵拉
- D. 骨骼劳损
- E. 病理性骨折

【答案】 A

11、一男性，68岁，午餐时进食鲜肉水饺约半斤，不久即感上腹不适，胸闷，大汗，心前区压迫样疼痛，来院急诊。下列哪项不属于急性心肌梗死的临床表现

- A. 舌下含化硝酸甘油后疼痛消失
- B. 面色苍白，烦躁不安
- C. BP10.7/6.8kPa(81/45mmHg)
- D. 端坐呼吸，发绀
- E. 上腹胀，呃逆

【答案】 A

12、患者，钱女士，38岁，因外伤致脊髓损伤，口温34.5℃。该患者体温分期是

- A. 正常体温波动范围内
- B. 轻度体温过低
- C. 中度体温过低
- D. 重度体温过低
- E. 致死温度

【答案】 B

13、4岁患儿，3天前突发高热，体温39.5℃，伴寒战，述右侧膝上部疼痛，患肢屈曲，拒绝主动活动和任何检查，发病后每天只进少量饮食。现患儿膝上部皮肤发红发热，肿胀和疼痛逐渐明显，膝关节浮髌试验可疑阳性，血白细胞计数 $20.5 \times 10^9$

- A. 输液瓶应高于床面30cm
- B. 引流液澄清后即可拔除引流管
- C. 每日滴注约1000ml溶液

- D. 冲洗液为含抗生素的生理盐水
- E. 正常情况下引流液的颜色逐渐加深

【答案】 D

14、患者，男性，32岁，轻度膀胱刺激症状1个月就诊，尿常规检查：白细胞4~5个/HP，红细胞2~3个/HP；尿结核菌培养阳性。假如该患者X线检查示右肾散在斑点状钙化，右输尿管上段见钙化影，膀胱及左肾无异常发现。此时处理上应考虑

- A. 抗结核治疗+右肾切除
- B. 抗生素治疗+右肾盂、输尿管切开放石
- C. 抗生素治疗+体外震波碎石
- D. 抗生素治疗+输尿管镜碎石、取石
- E. 抗结核治疗

【答案】 A

15、女性，28岁，原发性甲状腺功能亢进，术前用碘剂及硫氧嘧啶类治疗无效，改用心得安奏效。甲状腺功能亢进术后如发生甲状腺危象，主要原因是

- A. 术后出血
- B. 感染
- C. 精神紧张
- D. 术前准备不充分
- E. 术中补液不够

【答案】 D

16、男性，23岁，因第4胸椎椎体单纯压缩骨折卧床休息。双下肢的功能锻炼方法是

- A. 按摩
- B. 主动活动
- C. 起床活动
- D. 关节被动活动
- E. 使用被动功能运动器械

【答案】 B

17、女性，68岁，因右腿外展型股骨颈骨折入院，拟行保守治疗。牵引期间，护士可以指导病人进行右侧患肢

- A. 膝关节伸屈活动
- B. 髋关节伸屈活动
- C. 股四头肌等长运动
- D. 助力运动
- E. 手法治疗

【答案】 C

18、对于出血坏死性胰腺炎最具有诊断价值的化验室检测指标是

- A. 血淀粉酶升高
- B. 血清胆红素升高
- C. 血糖降低
- D. 血钙降低
- E. 血镁降低

【答案】 D

19、患者男性，62岁。高血压史20年，情绪激动后突发剧烈头痛，头晕，呕吐继而出现意识障碍，立即送医院行立即开颅血肿清除术，术中置入脑室外引流管一根。若引流管无脑脊液流出，其常见的原因不包括

- A. 颅内压低于10~15cmH
- B. 管口吸附于脑室壁
- C. 引流管放入脑室过短
- D. 引流管被小血块阻塞
- E. 引流管放入脑室过长而盘曲成角

【答案】 C

20、患者男性，42岁。于5小时前发生车祸，当时昏迷，无呕吐，急诊收治入院。入院后患者神志恢复清醒，瞳孔左:右=2.5mm:2.5mm，光反应(+)，颈无抵抗，四肢自主活动，躁动不安，头颅CT片示：右颞硬膜外血肿，出血量约15ml，中线未偏移，严密观察病情，给予止血等对症支持治疗。入院后4小时患者再次昏迷，瞳孔左:右=2.5mm:3.5mm，光反应左侧(+)右侧(±)，右侧肢体刺激可动，左侧肢体无活动，并伴有喷射状呕吐。患者术后护理不妥的是

- A. 患者术后清醒6~8小时可进食
- B. 术后6小时内平卧位，头偏向健侧
- C. 术后6小时后床尾抬高15~30℃，利于颅内静脉回流
- D. 密切监测生命体征，注意病情变化，观察用药效果
- E. 预防并发症的发生

【答案】 C

21、患者，男性，36岁。3小时前髌部被汽车撞伤，伤后不能自行排尿。查体：血压110/75mmHg，体温37.8℃。下腹膨隆，会阴部肿胀，紫红色瘀斑，直肠指诊：直肠前方软感，前列腺尖部浮动，导尿管不能插入膀胱。骨盆X线检查示有耻骨骨折。因条件限制，目前无法安排急诊手术，当前最恰当的处理措施是

- A. 输注利尿剂

- B. 行尿道扩张
- C. 继续试行导尿
- D. 耻骨上膀胱穿刺
- E. 耻骨上膀胱造瘘

【答案】 D

22、患者，男性，32岁，轻度膀胱刺激症状1个月就诊，尿常规检查：白细胞4~5个/HP，红细胞2~3个/HP；尿结核菌培养阳性。假如该患者X线检查示右肾散在斑点状钙化，右输尿管上段见钙化影，膀胱及左肾无异常发现。此时处理上应考虑

- A. 抗结核治疗+右肾切除
- B. 抗生素治疗+右肾盂、输尿管切开取石
- C. 抗生素治疗+体外震波碎石
- D. 抗生素治疗+输尿管镜碎石、取石
- E. 抗结核治疗

【答案】 A

23、女性，38岁，阵发性腹痛3天伴肠鸣、恶心、未吐，12小时未排便、排气，4年前因节段性肠炎行末端回肠切除术，曾有切口感染，术后1年开始多次腹痛发作，情况与本次相似，检查皮肤弹性差，腹稍胀，可见肠型及蠕动波，肠鸣音活跃，偶闻气过水声。最有可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 节段性肠炎
- E. 节段性肠炎癌变

【答案】 C

24、患者，男性，74岁。无痛间歇性血尿2年，反复左肋隙部剧痛三个月。膀胱镜检查膀胱侧壁三角区散在菜花状肿瘤带蒂，左输尿管口喷血。该患者首选的检查是

- A. CT
- B. 肾盂造影+膀胱造影
- C. 尿脱落细胞检查
- D. B超
- E. 腹部平片

【答案】 B

25、患者，男性，32岁。运动后突然出现右上腹部剧痛，疼痛放射至右侧中下腹部，伴恶心、呕吐，尿液呈浓茶色，查体：腹软，右下腹部深压痛，右肾区叩击痛。若X线检查发现结石大小约0.4cm，则该患者较适宜的治疗方法是

- A. 保守治疗
- B. 体外冲击波碎石
- C. 输尿管肾镜取石
- D. 输尿管切开取石
- E. 经皮肾镜取石

【答案】 A

26、患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。造成该患者骨折的原因为

- A. 间接暴力
- B. 直接暴力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805004324041012034>