

ICU 护理知识竞赛试题及答案（精选 100 题）

ICU 护理知识竞赛题库及答案（精选 100 题）

- 1、左心衰竭病人在临床上最突出的表现是（）
 - A、咳泡沫痰
 - B、反复咯血
 - C、呼吸困难（正确答案）
 - D、肝脾大
 - E、下肢水肿
- 2、下列哪项不是右心衰的临床表现 0
 - A、颈静脉充盈或怒张
 - B、肝脏肿大和压痛
 - C、周围型发组
 - D、咳粉红色泡沫痰（正确答案）
 - E、下垂性凹陷性水肿
- 3、患者，男性，55 岁，诊断为高血压，入院后应给予 0
 - A、低蛋白饮食
 - B、低盐饮食（正确答案）
 - C、低糖饮食
 - D、要素饮食
 - E、少渣饮食
- 4、下列可引起右心室前负荷增大的是 0

A、肺动脉高压

B、肺动脉栓塞

C、室间隔缺损（正确答案）

D、心肌炎

E、肺动脉瓣狭窄

5、以下哪项检查为发现心肌缺血、诊断心绞痛最常用简便的方法 0

A、心电图（正确答案）

B、心尖搏动图

C、心脏 B 超

D、冠状动脉造影

E、 ^{201}Tl 心肌显像

6、对首次发现收缩压 140mmHg 和（或）舒张压 90mmHg 的居民，在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，经 0 次血压高于正常，可初步诊断为高血压。

A、1

B、非同日 2 次

C、3

D、非同日 3 次（正确答案）

E、4

7、某窦性心动过缓病人近年晕厥 3 次，可选用下列哪项最安全而又简便的方法协助诊断 0

A、动态心电图

B、心电图阿托品试验（正确答案）

C、窦房传导时间测定

D、希氏束电图

E、窦房结恢复时间测定

8、脂质代谢异常是动脉粥样硬化最重要的危险因素，下列说法错误的是（）

A、总胆固醇增高

B、甘油三酯增高

C、低密度脂蛋白胆固醇增高

D、极低密度脂蛋白增高

E、高密度脂蛋白增高（正确答案）

9、我国发病率最高的先心病是

A、动脉导管未闭

B、心房间隔缺损（正确答案）

C、心室间隔缺损

D、法洛四联症

E、主动脉缩窄

10、患者，李某，60岁，诊断为心内膜炎，需混合注射红霉素和青霉素，皮试结果均为阴性，此时护士首先应考虑的是

A、药物有无配伍禁忌（正确答案）

B、药物的有效期限

C、各种药物的剂量

D、药物的刺激性

E、各种药物的浓度

11、患者，女性，60岁，胸闷心悸气促2年，多于劳累后发生，昨晚半夜突起呼吸困难，不能平卧，咳大量粉红色泡沫痰。查体：唇发绀，心尖区触及舒张期震颤，心尖区闻及舒张期隆隆样杂音，第一心音增强，肺部布满大量哮鸣音及湿性啰音，双下肢水肿。该患者的诊断为（）

A、二尖瓣狭窄、COPD、电解质紊乱

B、二尖瓣狭窄、肺部感染、心力衰竭

C、二尖瓣狭窄、心力衰竭（有急性肺水肿症状）（正确答案）

D、二尖瓣脱垂、高血压危象、电解质紊乱

E、二尖瓣关闭不全、ARDS、心力衰竭

12、患者，男性，65岁。因“右侧肢体活动不便6h”入院。患者意识清楚，右侧肢体肌力为2级。既往有高血压和糖尿病病史，曾发生过TIA。对于该患者，最有价值的确诊辅助检查是（）

A、颈部血管超声

B、肌电图

C、腰椎穿刺

D、脑血管造影

E、头颅CT或MRI（正确答案）

13、患者，男性，65岁。因“右侧肢体活动不便6h”入院。患者意识清楚，右侧肢体肌力为2级。既往有高血压和糖尿病病史，曾发生过

TIA 如头 CT 检查无高密度影，该患者可能的诊断为（）

A、脑出血

B、脑梗死（正确答案）

C、蛛网膜下腔出血

D、颅内肿瘤

E、硬膜下血肿

14、脉压减小不见于 0

A、心包积液

B、末梢循环衰竭

C、主动脉关闭不全（正确答案）

D、缩窄性心包炎

E、主动脉狭窄

15、再灌注时发生钙超负荷与下列哪一项有关（）

A、细胞膜通透性减弱

B、细胞膜外板与糖被分离（正确答案）

C、钙泵功能加强

D、线粒体功能加强

E、以上均不是

16、患者，男性，66 岁，晨起时自觉上下肢麻木，但可自行去厕所，回卧室时因左下肢无力而跌倒。查体：神清，左侧上下肢瘫痪，口眼不歪斜。应首先考虑 0

A、基底节出血

B、脑栓塞

C、脑血栓形成（正确答案）

D、蛛网膜下腔出血

E、脑外伤

17、三腔气囊管使用过程中发生窒息的原因是 0

A、喉头水肿

B、牵引过紧

C、胃气囊阻塞咽喉（正确答案）

D、血液反流至气管

E、食管气囊充气过多

18、患者，60岁，颈椎骨折术后第5天，既往有脑血栓病史，持续卧床。查体：体温38℃，右下肢较左下肢明显增粗，皮温高，无明显压痛。最可能的诊断是 0

A、切口感染

B、右下肢深静脉血栓（正确答案）

C、右股动脉栓塞

D、右下肢丹毒

E、右下肢蜂窝织炎

19、急性前壁心肌梗死病人心电示波出现心室颤动时，护士应先采取的措施是 0

A、静脉推注利多卡因

B、进行非同步电复律（正确答案）

C、进行同步电复律

D、进行心脏按压

E、上氧

20、诊断为梗阻性肥厚型心肌病的病人，一般不宜应用 0

A、地尔硫

B、普蔡洛尔

C、维拉帕米

D、地高辛（正确答案）

E、地西洋

21、临床最常见的心律失常 0

A、阵发性心动过速

B、阵发性心动过缓

C、室颤

D、房颤

E、过早搏动（正确答案）

22、急性心肌梗死最突出的症状是 0

A、休克

B、心前区疼痛（正确答案）

C、心律失常

D、充血性心力衰竭

E、胃肠道症状

23、患者，女，55岁，患高血压心脏病10年，近半年病人体力活动

明显受限，轻于日常活动即可引起呼吸困难、心悸。此病人目前心功能处于 0

- A、代偿期
- B、I 级
- C、II 级
- D、In 级（正确答案）
- E、IV 级

24、下列与心力衰竭时心肌收缩功能障碍有关的是 0

- A、肌浆网 Ca^{2+} 释放量下降（正确答案）
- B、肌浆网 Ca^{2+} 摄取能力减弱
- C、钠钙交换体 Ca^{2+} 亲和力下降
- D、肌膜钙 ATP 酶活性下降
- E、肌球-肌动蛋白复合体解离障碍

25、左心衰竭主要临床表现的病理基础为 0

- A、肺循环淤血（正确答案）
- B、体循环淤血
- C、心排血量降低
- D、心排血量增多
- E、体循环静脉淤血

26、下列可引起左心室后负荷增大的疾病是 0

- A、甲状腺功能亢进症
- B、严重贫血
- C、心肌炎
- D、心肌梗死
- E、高血压病（正确答案）

27、非同步直流电复律适用于 0

- A、心房扑动
- B、心房颤动
- C、室性期前收缩
- D、心室纤颤（正确答案）
- E、阵发性室性心动过速

28、二尖瓣狭窄的重要体征是 0

- A、心尖区隆隆样舒张期杂音（正确答案）
- B、右室增大
- C、肺动脉瓣第二音亢进
- D、Austin-Flint 杂音
- E、三尖瓣区收缩期杂音

29、急性心肌梗死常见的死亡原因是 0

- A、心源性休克
- B、心力衰竭
- C、严重心律失常（正确答案）
- D、电解质紊乱

E、发热

30、患者，女性，45岁，因胸部压榨样疼痛，伴大汗平车入院，诊断为急性心肌梗死，行急诊PCI，术中心电图波形、振幅、频率均极不规则，无法辨认QRS波群、ST段与T波，此时最可能的是（）

A、窦性心律不齐

B、室性期前收缩

C、心室颤动（正确答案）

D、心室扑动

E、交接区期前收缩

31、患者，男性，25岁，因心悸、心率快，来医院就诊，下列检查可明确诊断心律失常的是 0

A、心电图（正确答案）

B、心音图

C、超声心动图

D、放射性核素检查

E、心脏X线

32、引起猝死最常见的心律失常是 0

A、心房颤动

B、心房扑动

C、心室颤动（正确答案）

D、阵发性室上性心动过速

E、频发性室性期前收缩

33、患者，李某，男，56岁，于3天前因心前区疼痛入院，诊断为

冠心病。嘱患者不宜饱餐是为了（）

- A、减少消化道出血
- B、加快胃液分泌
- C、减少消化和吸收
- D、防止心绞痛发作（正确答案）
- E、增强交感神经兴奋性

34、风湿性心脏病最常见的并发症是 0

- A、心律失常
- B、亚急性细菌性心内膜炎
- C、充血性心力衰竭（正确答案）
- D、合并肺部感染
- E、急性肺水肿

35、引起亚急性细菌性心内膜炎的主要致病菌是 0

- A、肺炎链球菌
- B、金黄色葡萄球菌
- C、腐生葡萄球菌
- D、甲型溶血性链球菌（正确答案）
- E、乙型溶血性链球菌

36、被 HIV 阳性患者血液、体液污染的锐器刺伤时，应进行血源性传播疾病的血清学水平基线检查，在 0 内抽血查 HIV 抗体，报告医院感染管理部门、保健科，进行登记；根据暴露级别及病毒载量水平实施预防性用药方案。

- A、4 小时
- B、8 小时
- C、12 小时
- D、24 小时（正确答案）
- E、36 小时

37、64 岁男性病人，上班时突起持续剧烈左胸痛 2 小时，心电图示 VI?VST 波明显变为高尖，心室率 110 次 / min, 室性期前收缩 7 次 / min, 为安全起见将病人转送至某医院急救。以下哪项措施最为重要

- OA、静脉滴注硝酸甘油
- B、肌肉注射哌替啶
- C、静脉注射利多卡因继以持续滴注（正确答案）
- D、吸氧
- E、滴注极化液

38、高血压患者每天钠盐摄入量应不超过 0

- A、1g
- B、2g
- C、4g
- D、6g（正确答案）
- E、7g

39、护理高血压的患者，下列哪项措施不正确（）

- A、协助用药尽快将血压降至较低水平（正确答案）
- B、改变体位时动作宜缓慢

- C、沐浴时水温不宜过高
- D、头晕、恶心时协助其平卧并抬高下肢
- E、保持大便通畅

40、曹某，男，78岁。因急性心肌梗死并发休克入院。病人休克的主要原因因为 0

- A、心律失常
- B、血容量不足
- C、过敏
- D、心排血量下降（正确答案）
- E、疼痛

41、患者，男性，64岁，因胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难、尿少1个月就诊，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。考虑患者出现了心力衰竭，护士告诉患者要低盐饮食，其原因是 0

- A、提高心肌收缩力
- B、减轻肾脏负担
- C、减轻肺水肿
- D、减少液体潴留（正确答案）
- E、避免肝脏受损

42、病危患者，男，65岁，突发血压高，胸闷气促不适，护士遵医嘱予以上硝普钠组液体 250ml 泵入。6小时患者血压下降，病情好转，护士遵医嘱予以撤下硝普钠组液体。护士应在护理记录单哪一栏内注明丢弃量？ 0

- A、出量栏
- B、入量栏（正确答案）
- C、护理措施栏
- D、其他栏
- E、不需要记录

43、患者 56 岁女性，风湿性心脏病，二尖瓣狭窄伴关闭不全病史 26 年，入睡时无呼吸困难，可以平卧，入睡两小时后突然从噩梦中憋醒，伴有呼吸困难，被迫坐起，听诊两肺可及哮鸣音，10 分钟后呼吸困难逐渐缓解，此病人的情况属于 0

- A、噩梦后的正常反应
- B、支气管哮喘急性发作
- C、夜间阵发性呼吸困难（正确答案）
- D、劳累性呼吸困难
- E、睡眠呼吸暂停综合征

44、再灌注时氧自由基主要由下列哪一种细胞产生 0

- A、淋巴细胞
- B、中性粒细胞
- C、单核细胞
- D、血管内皮细胞（正确答案）
- E、巨噬细胞

45、病员王某某，注射青霉素过程中，觉头晕、胸闷、面色苍白，脉细弱，血压下降，应立即注射的药物是 0

A、盐酸肾上腺素（正确答案）

B、氢化可的松

C、异丙嗪

D、去甲肾上腺素

E、尼可刹米

46、 陈某，男，64岁，心绞痛病史2年，4pm左右无明显诱因出现心前区疼痛，含服硝酸甘油效果不佳，疼痛逐渐加剧，5pm患者突发心跳呼吸骤停，科内立即组织抢救，下列措施中有误的是：（）

A、 责任护士立即行胸外心脏按压，并通知医生进行抢救

B、 立即通知科主任、护士长，成立抢救小组，明确分工，紧密配合，听从指挥。

C、 抢救完毕后4小时内完善抢救记录，记录时间具体到分，主持抢救人员应审核签字。（正确答案）

D、 及时与患者家属及单位联系，患者病情变化及病危情况随时告知家属。

E、 日夜守护患者，严格执行交接班制度，对病情变化、抢救经过、用药情况要详细交待。

47、 蔡某，男，66岁。因冠心病入院。心电监护突然发现室性心动过速，血压80/50mmHg（平时血压120/70mmHg）。此时应迅速采取的措施是（）

A、 开放气道

B、 电起搏

C、电复律（正确答案）

D、使用肾上腺素

E、人工呼吸

48、大量输入库存血后要防止发生 0

A、酸中毒和高钾血症（正确答案）

B、酸中毒和低钾血症

C、碱中毒和高钾血症

D、碱中毒和低钾血症

E、低血钾和低血钠

49、. 高血压病患者睡眠时突感极度胸闷，气急，大汗淋漓，咳嗽，咯大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，血压 200/110mmHg，心率 110 次 / min。下列哪项护理是错误的 0

A、安慰患者，稳定情绪

B、置患者于两腿下垂坐位

C、酒精湿化吸氧 6—8l/min

D、建立静脉通路

E、静脉滴注给药宜快速（正确答案）

50、高血压心脏病病人，突发呼吸困难，咳吐粉红色泡沫痰，血压为 180 / 120mmHg（24.0/16.0kPa），以下哪种药物可作为首选治疗用药（） A、利血平

B、疏甲丙脯酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805123002024011101>