

骨科一病区理论考试

您的姓名： [填空题] *1. 以下哪项护理措施可防止患者牵引过度（） [单项选择题] *

A. 针孔处滴 75%乙醇 B. 每日测量肢体长度（正确答案）

C. 床脚抬高 15-30cmD. 防止牵引针移动

E. 保持功能位 2. 骨折患者发生关节僵硬的主要原因是（） [单项选择题] *

A. 神经损伤 B. 血管损伤

C. 关节腔破坏 D . 缺乏功能锻炼（正确答案）

E. 关节面骨折 3. 关于皮肤牵引特点的描述，错误的选项是（） [单项选择题] *

A. 时间短 B. 承受力量大 1（正确答案）

C. 易于为患者接受 D. 操作简便，无创

E. 常常只能应用 2-4 周 4. 关于胶布牵引的描述，错误的选项是（） [单项选择题] *

A. 大于 50 度 B. 小于 50 度

C. 大于 30 度 D. 小于 30 度 (正确答案)

E. 大于 70 度 36. 关于股骨颈骨折的描述，错误的选项是 () [单项选择题] *

A. 主要由间接暴力引起 B. 不易发生骨折不愈合 (正确答案)

C. 多发生于中老年女性 D. 较小的暴力即可导致老年人骨折

E. 青年人多在受到较大暴力发生骨折 37. 无明显移位外展型的股骨颈骨折宜选择 () [单项选择题] *

A. 骨牵引 B. 持续皮牵引 (正确答案)

C. 人工股骨头置换 D. 全髋关节置换

E. 经皮或切开加压螺旋钉固定 38. 股骨上 1/3 骨折，近端骨折段因肌肉萎缩，在 x 线上的移位方向是 () [单项选择题] *

A. 内收 B. 向前，向外 (正确答案)

C. 向外成角 D. 向后成角

E. 中立位

39. 关于骨折合并神经血管损伤，错误的选项是（） [单项选择题] *A. 腓骨颈骨折可合并腓总神经损伤

B. 股骨下段骨折可合并坐骨神经和胫动脉损伤 C. 肱骨中段骨折可合并桡神经损伤

D. 胫骨上 1/3 骨折可合并胫前后动脉损伤 E. 股骨颈骨折可合并坐骨神经损伤〔正确答案〕

40 . 患儿，2 岁，股骨干上 1/3 斜形骨折，治疗宜采用（） [单项选择题] A. 水平位皮牵引

B. 水平位骨牵引 C. 切开复位固定

D. 垂直悬吊皮牵引 |（正确答案） E. 手法复位小夹板固定

41 . 关于股骨干骨折护理的表达，错误的选项是（） [单项选择题] *A. 注意患肢远端动脉搏动

B. 观察患肢远端的血运和感觉 C. 观察患肢活动有无异常

D. 牵引后期应进行股四头肌功能锻炼（正确答案） E. 密切观察生命体征

42 . 长骨骨折最常见的是（） [单项选择题] *A. 股骨干骨折

B. 胫腓骨干骨折，正确答案） C. 股骨颈骨折

D. 肱骨骨果上骨折

E. 桡骨远端伸直型骨折. 桡骨骨折后因局部血运供应差, 易造成延迟愈合或不愈合的部位是 () [单项选择题] *

A. 桡骨上段骨折 B. 桡骨平台骨折

C. 桡骨中段骨折 D. 桡骨中下 1/3 骨折 (正确答案)

E. 髌上骨折. 桡骨干中下 1/3 骨折容易引起的并发症是 () [单项选择题] *

A. 骨折延迟愈合 (正确答案) B. 血管损伤

C. 骨筋膜室综合征 D. 神经损伤

E. 关节僵硬. 小夹板固定后适当的松紧度是 () [单项选择题] *

A. 绑带上下移动 0.5cm B. 绑带上下移动 1cm (正确答案)

C. 绑带上下移动 1.5cm D. 绑带上下移动 2cm

E. 绑带刚好扎紧不能移动. 骨折并发骨筋膜室综合征, 最主要的措施是 () [单项选择题] *

A. 给予血管舒张剂, 消除血管痉挛 B. 抬高患肢, 以利于消肿

C. 被动按摩，以利于消肿’ D. 坐臂位麻醉，消除血管痉挛

E. 解除包扎固定物，经观察不见好转，切开筋膜减压（正确答案）. 脊柱骨折的好发部位是最（） [单项选择题] *

A. 寰枢椎 B. 颈椎 5. 6

C. 胸腰段（正确答案） D. 胸椎 11. 12

E. 腰椎 2. 3. 脊柱骨折最常见的类型（） [单项选择题] *

A. 屈曲型（正确答案） B. 过伸型

C. 屈曲牵拉型 D. 垂直压缩型

E. 过伸型和屈曲牵拉型. 在脊髓损伤中，最不可能出现的是（） [单项选择题] *

A. 双上肢瘫痪 B. 双下肢瘫痪

c. 阶段性瘫痪：（正确答案） D. 四肢瘫痪

E. 截瘫 50. 脊髓损伤愈后最好的是（） [单项选择题] *

A. 脊髓挫伤

B. 脊髓震动(正确答案) C. 脊髓裂伤、

D. 马尾损伤 E. 脊髓加神经根损伤

51. 颈髓损伤最严重的并发症是 () [单项选择题] *A. 褥疮

B. 腹胀 C. 体温失调

D. 泌尿系感染 E. 呼吸功能障碍及呼吸道感染 (正确答案)

52 . 以下属于不完全骨折的是 () [单项选择题] *A. 裂缝骨折:(正确答案)

B. 螺旋骨折 C. 凹陷骨折

D. 嵌插骨折 E. 压缩骨折

53 . 以下属于不稳定骨折的是 () [单项选择题] *A. 裂缝骨折

B. 螺旋骨折 C. 凹陷骨折「(正确答案)」

D. 嵌插骨折 E. 压缩骨折

54 . 新鲜骨折是指骨折时间在 () [单项选择题] *

A. 1 周之内 B. 2 周之内 (正确答案)

C. 3 周之内 D. 4 周之内

E. 5 周之内. 诊断骨折最可靠的是 () [单项选择题] *

A. 外伤史 B. 疼痛

C. 出血 D. X 线检查 (正确答案)

E. 肢体肿胀. 以下属于骨折早期并发症的是 () [单项选择题] *

A. 关机僵硬 B. 愈合障碍

C. 骨化性肌炎 D. 缺血性肌挛缩

E. 骨筋膜室综合征(正确答案) 57. 可能导致骨筋膜室综合征的原因有 () [单项选择题]

A. 石膏包扎过紧 (正确答案) B. 未进行功能锻炼

C. 局部感染 D. 患肢进行性肿胀

E. 骨折未到达解剖部位. 引起骨筋膜室综合征的主要发病机制是 () [单项选择题] *

A. 肌肉痉挛 B. 细菌繁殖

C. 骨筋膜室压力高 1 (正确答案) D. 主要神经损伤

E. 血管内膜损伤. 以下不属于骨折早期并发症的是 () [单项选择题] *

A. 休克 B. 感染

C. 内脏损伤 D. 损伤性骨化 (正确答案)

E. 周围神经损伤. 以下属于骨折晚期并发症的是 () [单项选择题] *

A. 血管损伤 B. 神经损伤

C. 脂肪栓塞 D. 创伤性关节炎 (正确答案)

E. 骨筋膜室综合征. 开放性骨折主要并发症是 () [单项选择题] *

A. 休克 B 感染〔正确答案〕

C. 关节僵硬 D. 内脏损伤

E. 脂肪栓塞. 关节内骨折易引起() [单项选择题] *

A. 缺血性骨坏死 B. 缺血性肌挛缩

C. 骨化性肌炎 D. 创伤性关节炎(正确答案)

E 骨筋膜室综合征. 关节附近骨折易引起() [单项选择题] *

A. 缺血性骨坏死 B. 缺血性肌挛缩

C. 骨化性肌炎(正确答案) D. 创伤性关节炎

E 骨筋膜室综合征. 以“爪型”手为典型表现的骨折并发症是() [单项选择题] *

A. 关节僵硬 B. 骨化性肌炎

C. 畸形愈合 D . 缺血性肌挛缩(正确答案)

E. 创伤性关节炎 65. 骨折临床愈合期需要() [单项选择题] *

A1-2 周 B. 2-3 周

C. 4-8 周(正确答案) D. 8-12 周

E. 12-14 周 66. 骨折纤维愈合期约需() [单项选择题] *A1-2 周

B. 2-3 周 (正确答案) C. 4-8 周

D. 8-12 周 E. 12-14 周

67. 骨折骨性愈合期需() [单项选择题] *A1-2 周

8. 2-3 周 C. 4-8 周

D. 8-12 周 (正确答案) E. 12-14 周

68 . 对有骨折或疑有骨折的患者在转运前最重要的是() [单项选择题] *A、抬得患肢

B、固定患肢 (正确答案) C、现场复位

D、使用止痛药 E、使用 TAT 和抗生素

69 . 骨折治疗的首要步骤是 () [单项选择题] *A. 复位 (正确答案)

B. 固定 C. 功能锻炼

D. 石膏绷带固定 E. 持续牵引骨牵引

70 . 石膏或夹板固定之后最应注意的是 () [单项选择题] *A. 松脱

B. 骨折再移位 C. 压迫性溃疡

D. 血循环受阻 (正确答案) E. 石膏变形

71 . 脊柱骨折根据损伤程度和部位分为 () *A 胸椎骨折与脱位 (正确答案)

B 颈椎骨折与脱位 (正确答案) C 附件骨折 (正确答案)

D 骶椎骨折 E 脊髓损伤

72 . 脊髓损伤按脊髓和马尾损伤的程度分为 () *A 脊髓休克 (正确答案)

B 脊髓损伤 3 答案) C 马尾损伤 (正确答案)

D 截瘫 E 中央管综合征 (正确答案)

73 . 骨盆骨折的护理要点 () *A 急救处理 (正确答案)

B 病情处理: (正确答案) C 引流尿液 (正确答案)

D 心理护理 E 疼痛护理

74 . 断指 (肢) 的现场急救包括 () *A. 使用欲牵引 I 肢体最小周径的 1/2 宽的胶布

B. 粘贴范围: 大腿牵引上端起自大腿中上” 3, 小腿上端起自胫骨结节下缘 C. 患者患肢剃去汗毛洗净擦干后, 涂上安息香酸酊

D. 安息香酸酊未干时, 即将撕开的胶布纵向粘在肢体两侧 E. 在内外踝骨突处垫好纱布, 10 分钟后加牵引锤牵引 | (正确答案)

5. 下肢骨折牵引时抬高床尾的主要目的是 () [单项选择题] *A. 减轻患者疼痛

B. 对抗牵引弓 1 (正确答案) C. 改善血液循环

D. 使患者舒适 E. 便于观察末梢血液循环

6. 下肢骨折患者的护理措施，错误的选项是（） [单项选择题] *A. 抬高床头（**正确答案**）

B. 每日测量肢体长度 C. 牵引时足部保持功能位

D. 肢体纵轴和牵引力线一致 E. 皮肤牵引之前涂安息香酸酊保护皮肤

7. 骨牵引时防止牵引针孔感染的措施，错误的选项是（） [单项选择题] *A. 保持牵引针孔周围皮肤清洁

8. 防止牵引针左右滑动 C. 牵引前涂安息香酸酊（**正确答案**）

D. 必要时拔针换位牵引 E. 每日在针孔处滴 75%乙醇 2 次 8. 骨折牵引时，预防过度牵引的措施是（） [单项选择题] *

A 止血（**正确答案**） B 包扎创面**正确答案**）

C 保藏断指（肢）（**正确答案**） D 迅速准运（**正确答案**）

E 清创缝合. 断指（肢）再植术后应观察局部的（） *

A 皮肤温度**正确答案**） B 皮肤色泽**正确答案**）

C 肿胀程度**正确答案**） D 毛细血管回流情况（**正确答案**）

E. 出血量. 脱位按期发生的原因可分为（） *

A 损伤性脱位（**正确答案**） B 先天性脱位**正确答案**）

C 病理性脱位**正确答案**） D 习惯性脱位**正确答案**）

E 陈旧性脱位. 脱位的专有体征包括（） *

A 畸形（**正确答案**） B 弹性固定**正确答案**）

C 关节盂空虚**正确答案**） D 疼痛

E 肿胀. 胸腰段脊柱骨折的临床表现包括（） *

A 功能障碍**正确答案**） B 异常活动及骨擦音

C 腰背肌肉痉挛**正确答案**） D 功能障碍**正确答案**）

E 疼痛**正确答案**）. 肱骨踝上骨折复位后，应特别注意观察（）

A 桡动脉搏动是否良好（正确答案） B 肘部肿胀情况（正确答案）

C 皮肤温度，颜色变化（正确答案） D 有无手指麻木疼痛（正确答案）

E 神志. 脊髓型颈椎病的临床表现包括（） *

A 四肢无力「正确答案」 B 手握力减退正确答案）

C 精细活动失调（正确答案） D 行走不稳:正确答案）

E 有踩棉花样感觉（正确答案）. 急性化脓性骨髓炎的早期诊断依据是（） *

A 全身中毒病症，白细胞基数增高（正确答案） B 干髓端持续性剧痛及深压痛（正确答案）

C 早期穿刺对明确诊断有重要意义（正确答案） D 两周内 X 片有诊断价值

75 . 急性骨髓炎的治疗原则那么（） *A 早期控制炎症正确答案）

B 早期引流减压（正确答案） C 固定患肢正确答案）

D 加强全身支持治疗 E 早期康复锻炼

76 . 骨关节结核的治疗原则那么是（） *A. 提高全身抵抗力（正确答案）

B. 抗结核药物应用（正确答案） C. 尽量保持关节功能预防畸形（正确答案）

D. 防止寒性脓肿形成. 关于骨折病人小夹板固定，描述正确的选项是（） *

A 提高患肢以利于静脉回流（正确答案） B 卧床休息

C 调整布带时不要全部解开，应逐条进行（正确答案） D 防止骨折再移位，复位后每日透视一次

E 早期进行功能锻炼（正确答案）. 李先生 35 岁，工作中不慎被割草机将右手割掉，残断少量渗血，患者急送来院，在当地医务室将右手刷洗干净，自来水冲净后初步处理正确的选项是（） *

A. 残肢上止血带 B. 密切观察患者正确答案）

C. 无菌巾包裹右手，外套塑料袋（正确答案） D. 之后，立即用冰块作干冻冷藏（正确答案）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805200112034011103>