

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、严重低钾血症患者主要死于 0

- A、心机收缩性降低
- B、心机传导降低
- C、心机自律降低
- D、肾功能严重障碍
- E、呼吸衰竭

【答案】： A

2、左侧心力衰竭患者的脉象改变 0

- A、奇脉
- B、洪脉
- C、交替脉
- D、水冲脉
- E、细脉

【答案】： C

3、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救?0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救
- D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

4、心脏骤停后，进行胸外心脏按压时，急救药物 0.1%肾上腺素的给药途径首选

0

- A、心内注射
- B、气管内注射
- C、静脉注射
- D、皮下注射
- E、肌肉注射

【答案】： C

5、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

- A、一般在刺激后 1 天内发病
- B、以急剧、严重的精神打击为直接原因
- C、表现平静
- D、应激消除者症状历时 20 天左右
- E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

6、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

- A、进行保护性包扎
- B、把肠管回纳腹腔
- C、暂时不予处理
- D、马上紧急处理
- E、给予止痛药

【答案】： A

7、血红蛋白低于或等于?时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体位改变()

- A、30g/L
- B、40g/L
- C、60g/L

D、80g/L

E、100g/L

【答案】： C

8、心搏骤停复苏抢救的有效指征不包括 0

- A、触到大动脉搏动
- B、上肢收缩压在 8kPa 以上
- C、自主呼吸恢复
- D、瞳孔散大 E. 颜面、口唇转红润

【答案】： D

9、在对心跳呼吸骤停患者进行基本生命支持时，以下哪种说法不正确 0

- A、用 6-10 秒(不超过 10 秒)检查是否存在正常呼吸；
- B、对除怀疑颈椎损伤的所有病人使用仰头抬颊法开放气道；
- C、如果人工通气未使胸廓起伏，应继续进行人工通气直到有效胸廓起伏；
- D、每名急救人员最好只连续进行 2 分钟左右的胸外按压后轮换，以保证按压质量。
- E、对怀疑颈椎损伤的所有病人使用双手推举下颌法开放气道；

【答案】： G

10、热痉挛时最易发生痉挛的肌肉是 0

- A、腹直肌
- B、胸大肌
- C、肱二头肌
- D、腓肠肌

【答案】： D

11、关于心肺复苏，错误的是?0

- A、频率 100-120 次/分
- B、深度 5-6cm
- C、部位为胸骨下部
- D、按压通气比为 30:2

【答案】： C

12、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颊法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

13、某日护士小张正在急诊室工作，突然闯进一位怒气冲冲的患者家属，叫嚷着

要找医院领导。这时小张应该 0

- A、制止患者家属愤怒的发泄
- B、直接交给上级领导处理
- C、主动倾听，了解分析患者家属愤怒的原因
- D、对其不理不睬，直接回避
- E、对其愤怒行为给予批评

【答案】： C

14、患者女性，43 岁。中午饱餐后出现上腹部绞痛，同时向腰背部呈带状放射，已

持续 6 小时。怀疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为 0

- A、 白细胞计数
- B、血清淀粉酶测定
- C、尿液淀粉酶测定
- D、血清脂肪酶测定
- E、血清谷丙转氨酶

【答案】： B

15、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止；
- B、有气管插管指征，但未插管的；
- C、血流动力学不稳定；

D、血压偏高

【答案】： D

16、见尿补钾要求成人每小时尿量不少于()

A、10ml

B、30ml

C、50ml

D、70ml

E、90ml

【答案】： B

17、电除颤的并发症不包括 0

A、心律失常

B、高血压

C、肺和体循环栓塞

D、急性肺水肿

【答案】： B

18、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

A、胸外按压

B、人工呼吸

C、电除颤

D、心脏起搏

【答案】： D

19、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

A、食物中毒 3 小时内

B、食物中毒 4 小时内

C、食物中毒 6 小时内

D、食物中毒 8 小时内

E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

20、患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是

- A、脑出血
- B、TIA
- C、脑血栓形成
- D、脑栓塞
- E、蛛网膜下腔出血

【答案】： D

21、患者，男性32岁，因支气管扩张合并感染入院，昨日出现大咯血，提示患者24小时咯血量超过()

- A、100ml
- B、300ml
- C、500ml
- D、700ml
- E、1000ml

【答案】： C

22、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是()

- A、呼吸和循环衰竭
- B、中毒性休克
- C、大出血
- D、急性肾衰竭
- E、急性肝衰竭

【答案】： A

23、患者，女性，55岁。因高速车祸4小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS评分5分，呼吸急促(38次/分)伴口严重发绀，面部严重肿胀，脉搏摸不到，手足发冷，血压50/30mmHg。

假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是 0

- A、立即建立静脉通路、抗休克治疗
- B、进行创伤严重度评分
- C、立即送往医院
- D、气管插管、给氧
- E、仔细检查，明确诊断

【答案】： D

24、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗

导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

- A、热衰竭
- B、热射病
- C、热痉挛
- D、日射病

【答案】： A

25、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR 者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

【答案】： D

26、对成人行胸外心脏按压，正确的按压频率为 0

- A、50 次/分

B、60 次/分

C、70

次/分

D、80 次/分

E、90 次/分

【答案】： B

27、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

A、10-30%

B、30-50%

C、>50%

D、50-70%

E、70%以上

【答案】： B

28、改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是 0

A、持续高流量吸氧

B、按时使用有效抗生素

C、呼气终末正压通气

D、避免输液过量过快

E、鼓励深呼吸和排痰

【答案】： C

29、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

A、给予充足的饮食再送医院

B、询问火灾原因

C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院

D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

30、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，
呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是 0

- A、糖尿病酮症酸中毒
- B、呼吸衰竭
- C、颅内压升高
- D、低血糖
- E、脑血管意外

【答案】： A

31、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

- A、2400mL 以上
- B、500mL
- C、1/3 肺活量
- D、达到病人肺部
- E、使病人胸廓抬起

【答案】： E

32、开放性腹部损伤中，致伤物有入口、出口的是 0

- A、贯通伤
- B、盲管伤
- C、挤压伤
- D、穿透伤
- E、扭挫伤

【答案】： B

33、患者男性，45 岁。炎热夏天在外高空作业 3 小时出现大汗、口渴、头晕、胸闷。该病人可能出现了 0

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、热痉挛
- D、日射病

E、热射病

【答案】： A

34、有机磷农药中毒的中毒机理是 0

- A、麻醉作用
- B、抑制酶的活力作用
- C、局部刺激、腐蚀作用
- D、干扰细胞膜和细胞器的生理功能

【答案】： B

35、男性，50 岁，车祸后 6 小时入院，神志淡漠，四肢冰冷，血压 9.33/6.67KPa(70/50mmHg) 诊断为 0

- A、轻度低血容量性休克
- B、中度低血容量性休克
- C、重度低血容量性休克
- D、中度感染性休克
- E、重度感染性休克

【答案】： B

36、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息
- D、给精神安慰
- E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

37、双下肢骨折的伤病员，应首选 0

- A、杠轿式搬运
- B、担架搬运
- C、拖行搬运
- D、扶持搬运
- E、横抱搬运

【答案】： B

38、张力性气胸的紧急处理是 0

A、剖胸探查修补损伤

B、胸腔闭式引流

C、吸氧

D、气管插管

E、尽快于伤侧锁骨中线第 2 肋间插入带有活瓣的穿刺针排气减压

【答案】： E

39、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是 0

A、促进痰液排出

B、保证睡眠质量

C、去除外界刺激因素

D、呼吸功能锻炼

E、处理并发症

【答案】： D

40、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是 ()

A、12~14 次/分

B、14~16 次/分

C、16~18 次/分

D、18~20 次/分

E、20~22 次/分

【答案】： B

41、患者男性，自感心慌、头晕。查体；心率 84 次\分，脉搏 52 次\分，心律不规则，

心率快慢不一，心音强弱不等，该患者可能出现了 0

A、二联律

B、 三联律

C 、脉搏短绌

D、 心动过缓

E、脉搏异常

【答案】： C

42、患者，男性，52 岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量 血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清， BP75/46mHg

R38 次/分，心率 126 次/分，
律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

43、危重病人长期取仰卧位时最易发生压疮的部位是 0

- A、坐骨结节处
- B、骶尾部
- C、大转子处
- D、肩胛骨
- E、第七颈椎

【答案】： B

44、院前急救的原则错误的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤，后轻伤
- C、急救与呼救拼重
- D、转运与救护相结合

【答案】： A

45、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

46、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

A、

首先应止血及包扎伤口

- B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折患者不可采取手法复位
- E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法

【答案】： E

47、电动吸引器吸痰每次插入导管吸引不超过 0

- A、5s
- B、10s
- C、15s
- D、20s
- E、25s

【答案】： C

48、患者，男性，49 岁。冠心病史 5 年，以“胸闷、剧烈胸痛半小时，伴大汗”为主诉来诊，进入抢救室后，心电监护示波显示“RS 波群消失，代之以大小不等、形态各异的颤动波，频率为 300 次/分”。此时应立即采取的最恰当的急救措施是)

- A、按压人中，同时立即给予气管插管
- B、应用单相波除颤器连续除颤 3 次
- C、应用双相波除颤器进行除颤，能量 150J
- D、立即给予气管插管，胸外按压
- E、立即建立静脉通路，给予肾上腺素 0.5~1mg 静脉注射

【答案】： C

49、高渗昏迷患者输液 4h 应输入总量的()

- A、1/3

B、1/2

C

、 2/3

D、 1/4

E、 3/4

【答案】： A

50、热射病降温通常应在 2 小时内使核心温度降至 0℃左右(

A、 32

B、 35

C、 37.5

D、 38.5

E、 39

【答案】： D

51、患者家属王某，女性，26 岁。在得知丈夫因病情危重，抢救成功的可能性不大

时，非常忧郁，伤心哭泣。护士在安慰她时，以下做法中不恰当的是 0

A、当她表示想独自一人安静一会时，为她提供一个适当的环境

B、坐在她身边，轻轻递给她纸巾

C、阻止她哭泣，告诉她要坚强

D、在她停止哭泣时，鼓励她说出悲伤的原因

E、轻轻握住她的手，默默陪伴她

【答案】： C

52、初期复苏所讲 ABC 中，通常 A 是指 0

A、开放气道

B、口对口(鼻)人工呼吸

C、胸外心脏按压

D、药物治疗

E、病情观察

【答案】： A

53、心肺复苏指南中胸外按压的部位为是 0

- A、双乳头之间胸骨正中部
- B、心尖部
- C、胸骨中段
- D、胸骨左缘第五肋间
- E、胸骨上部

【答案】： A

54、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

55、作为一名跳楼致高处坠落伤患者的现场目击者，以下哪种做法是最正确及时的?()

- A、立刻拨打 120 急救电话，等待救援人员的到来
- B、立刻离开现场，以免惹祸上身
- C、立刻给患者行心电图，宣布患者死亡
- D、围观患者，议论纷纷，摇头叹息
- E、迅速判断患者意识和伤情，呼吁现场群众协助救治，同时拨打急救电话呼叫急救措施，必要时立刻进行 CPR 或止血、固定等处理

【答案】： E

56、转运时护士及医生始终位于病人的 0

- A、头部两侧
- B、左右两侧
- C、头尾位置

D、左侧

【答案】： A

57、下列各组药物中，可经气管内给予的是 0

- A、肾上腺素、阿托品、胺碘酮
- B、阿托品、心律平、肾上腺素
- C、利多卡因、异搏定、5%碳酸氢钠
- D、纳洛酮、西地兰、阿托品
- E、肾上腺素、阿托品、利多卡因

【答案】： E

58、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充 0

- A、 Na^+
- B、 Cl^-
- C、 Ca^{2+}
- D、 K^+
- E、 Mg^{2+}

【答案】： D

59、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

- A、死亡
- B、重伤
- C、危重伤
- D、中重伤
- E、致命伤

【答案】： E

60、复苏时一人行胸外心脏按压和人工呼吸的次数比例是(

- A、15:2
- B、5:1
- C、15:1
- D、5:2
- E、其余各项均不对

【答案】： A

61、发生火灾逃生时，错误的选项是 0

- A、走安全通道
- B、用湿毛巾捂住口鼻
- C、最低姿势匍匐前进
- D、乘坐电梯

【答案】： D

62、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

- A、急性有机磷农药中毒
- B、急性安定中毒
- C、 飘药中毒
- D、强酸、强碱中毒
- E、食物中毒

【答案】： D

63、终止室颤最迅速、最有效的措施是 0

- A、立即胸外心脏按压
- B、立即给予除颤
- C、尽快给予气管插管
- D、立即给予球囊-面罩通气
- E、立即给予肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： B

64、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现，

患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

65、电流击伤对人的致命作用是 0

- A、引起心室颤
- B、诱发心动过速
- C、导致心室血流减慢
- D、造成心肌缺血

【答案】： A

66、门脉高压症中最常见的原因(为)

- A、胃溃疡
- B、肛硬化
- C、肠梗阻
- D、胆道出血
- E、黄疸

【答案】： B

67、危重症患者家属病情保障方面的需求，家属最关心的是 0

- A、患者安全
- B、患者饮食
- C、患者舒适
- D、患者心理
- E、患者支持

【答案】： A

68、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

A、二尖瓣

B、主动脉瓣

C、三尖瓣

D、二尖瓣+三尖瓣

E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

69、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

70、发生空气栓塞时应使病人采取 0

- A、左侧卧位和头低足高位
- B、端坐位双腿下垂
- C、右侧卧位和头低足高位
- D、右侧卧位和头高足低位
- E、左侧卧位和头高足低位

【答案】： A

71、对蛛网膜下腔出血病因的诊断，最具有意义的辅助检查是 0

- A、脑脊液检查
- B、脑血管造影
- C、脑部 Ct 检查
- D、脑部 MRI 检查
- E、血常规

【答案】： B

72、患者，男性，50岁。因车祸致胸腹部剧痛2小时入院，查体；BP80/48mHg,P120次/分，脉搏细速，R30次/分，氧饱和度78%。神志清，左侧呼吸音消失。全腹肌紧张，压痛、反跳痛明显，移动性浊音(+)，骨盆分离征(+)。拟为“多发伤1多发肋

骨骨折，左侧血气胸；2 腹部闭合伤，肝破裂；3 骨盆骨折，后腹膜血肿”入院。针对

该患者，需要进行重点评估的内容是 0

- A、胸部外伤、腹部外伤、骨盆骨折
- B、胸部外伤、骨盆骨折
- C、腹部外伤、后腹膜血肿
- D、骨盆骨折
- E、后腹膜血肿

【答案】： A

73、高钾时心电图的变化正确的是 0

- A、S-T 段下降
- B、T 波高尖，PR 间期延长
- C、出现 U 波
- D、QRS 间 缩 短 ，QT 时间延长
- E、T 波宽而低平，重者 T 波倒置

【答案】： B

74、李先生，56 岁，因“右心衰”来院急诊，在休息状态下也心悸、呼吸困难，请问

李先生现在的心功能分级为 0

- A、I 级
- B、II 级
- C、III 级
- D、IV 级
- E、V 级

【答案】： D

75、慢性特发性血小板减少性紫癜最常见于 0

- A、婴幼儿
- B、青少年
- C、青年女性

D、青年男性

E、中年人

【答案】： C

76、患者，男性，30 岁。

一小时前 5 米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制能量来源分类，该创伤能量成分为 0

- A、热力学能量
- B、电力学能量
- C、机械能量(√)
- D、化学能量
- E、放射学能量

【答案】： C

77、患者，男，50 岁。某日在烈日下劳动 4 小时后感到头昏乏力，随后昏倒在地，神志不清，急送医院，头颅 CT 检查未见异常。查体：体温 41℃，心率 135 次/分，律齐，血压 90/60mmHg，深昏迷，双下肢阵发性抽搐，大、小便失禁。该患者属于中暑的哪一类型()

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、热衰竭
- D、先兆中暑
- E、轻度中暑

【答案】： A

78、关于损伤的现场急救，下列描述正确的是 0

- A、对休克患者首要措施是立即送医院抢救
- B、对于发现有心跳骤停的伤员应首先将其移出现场，然后进行 CPR
- C、作详细的全身检查
- D、尽快解决各种呼吸道阻塞，维持呼吸道通畅
- E、发现有活动性出血的伤口应现场进行清创术

【答案】： D

79、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

- A、白、黄、绿、黑
- B、红、黄、绿、黑
- C、红、黄、蓝、黑
- D、红、白、绿、黑

【答案】： B

80、一旦心搏骤停患者恢复自主循环，理想的目标是以最低的 FiO_2 将血氧饱和度水平维持在 0

- A、80%以下
- B、85%~100%
- C、90%~100%
- D、94%~100%
- E、100%以上

【答案】： D

81、下列哪项对高钾血症患者兼用 0

- A、等渗盐水
- B、10%葡萄糖液
- C、右旋糖酐
- D、林格氏液
- E、碳酸氢钠

【答案】： D

82、急性有机磷农药中毒机制是 0

- A、抑制酶活性
- B、缺氧
- C、局部腐蚀刺激作用
- D、竞争受体
- E、麻醉作用

【答案】： A

83、进行 CPR

的前提条件是 0

- A、无反应、无呼吸
- B、无反应、有呼吸
- C、无意识
- D、无反应

【答案】： A

84、被目击的非创伤心跳骤停患者中最常见的心律为 0

- A、心脏停搏
- B、无脉性室颤
- C、室颤
- D、电-机械分离
- E、室上性心动过速

【答案】： C

85、休克时正确的补液原则是 0

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

86、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/805222321320011223>