

模拟试卷（一）

专业实务

1、患者，女，42岁。从高处跌下，头部着地，当时昏迷约10分钟后清醒，左耳道流出血性液体，被家眷送来急诊。通过急救后，患者意识清晰，拟采用深入治疗。患者因认为医院过度治疗，因此拒绝治疗。对昀昀的处理措施是（ ）

- A.强迫治疗 B.请医生处理
- C.请护士长处理 D.与家眷共同劝慰
- E.冷处理，待患者安静后进行劝说

2.患者，女，58岁。直肠癌晚期进行化疗，需定期测血常规。护士再次采血时患者拒绝，并说：“我太瘦了，血都快没了，不采了！”此时护士最合适的回答是（ ）

- A. “您怎么这样不听话啊？采血不是为了你好吗？”
- B. “那您找你主治医生去吧！他若同意不化验就行。”
- C. “不采就算了，反正您的血管也不好扎。”
- D. “采血是为了监测您的病情，必须得采。”
- E. “采血是为了更好地为您治疗，请您配合好吗？”

3.护士从患者的角度，通过倾听和提问，与患者交流，理解患者的感

受。护士采用的交谈方略是()

A.沉默 C.论述 B.查对 D.移情 E.应答

4.对精神分裂症患者安全护理应加强巡视，其中多长时间巡视患者一次是对的()

A.1~5 分钟 B.5~ 10 分钟 C.10~ 15 分钟 D.15~ 30 分钟 E.30~ 60 分钟

5.患者，女，38 岁。患者向来小心谨慎，只要一拿钱，就反复数个不停，买东西前，要先列清单，并反复检查清单，生怕会有遗漏。出门后，门与灯虽已关了，但她仍不放心，一而再再而三地反复检查。此患者为()

A.强迫行为 B.强迫意向 C.强迫联想 D.强迫联想 E.强迫回忆

6.婴幼儿易患呼吸道感染的免疫原因是()

A.SIgA 低 B.SIgE 低 C.SIgM 低 D.SIgG 低 E.清蛋白活性低

7.消化性溃疡最常见的并发症是()

A.穿孔 B.出血 C.幽门梗阻 D.癌变 E.休克

8.有关阿尔茨海默病不对的是()

A.近记忆障碍常为首发症状

B.往往在疾病后期出现人格变化

C.为持续性进行性病程 D.病理特性为老年斑

E.由脑部疾病导致精神障碍

9.患儿，男，11岁。以“流行性脑脊髓膜炎”入院治疗。查体：T39.6℃，P108次/分，R20/分，BDP110/80mmHg，神志清楚，呼吸规则，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏；手臂，胸、腹及下肢等处散在瘀点，颈强直(+)，克氏征(+)。该患儿日前所处的临床类型为()

A.脑型 B.轻型 C.休克型 D.一般型 E.暴发型

10.某护士为一患儿进行输液治疗，输液30分钟后患儿出现严重的不良反应并休克，经急救病情好转并转入ICU继续治疗。对此，患儿家长反应强烈，质疑护士输液有误，护士应首先进行的重要工作是()

A.向护士长汇报急救通过

B.与医生一起分析患儿病情

C.继续与患儿家属沟通，做好解释

D.协助患儿家长完毕急救用药的缴费 E.按照规定封存未输完的液体

11.患者，男，35岁。因车祸致右侧胸部损伤，1小时后送至急诊室，血压100/70mmHg，呼吸困难，发绀，右胸明显压痛，可扪及骨擦感，右肺呼吸音低，叩诊呈浊音。此时，最重要的处理是()

A.气管插管辅助呼吸

B.行右胸腔闭式引流术

C.胸部包扎固定

D.输血输液抗休克

E.及时剖胸探查

12. 护士在巡回过程中发现某患者静脉输液忽然发生溶液不滴，该护士首先应采用的措施为()

A.调整针头斜面 B.抬高输液瓶

C.穿刺部位热敷 D. 挤压输液管

E.观测穿刺部位有无红肿及疼痛

13，患者， 男，45 岁。因高热、牙龈出血及多处皮肤瘀点 5 天入院。

医嘱开具下列检查单。护士采血时，应优先采用的标本是()

A.血常规 B 血生化组合

C.凝血四项 D.ABO 血型

E.血培养

14. 下肢静脉曲张患者术后初期活动重要是为了防止()

A.关节僵硬 B 患肢水肿 C. 血管痉挛 D 肌肉萎缩 E.深静脉血栓

15. 患者，女，29 岁。口服安定 100 片，家人发现时呼之不应，意识昏迷，急诊来医院，错误的护理措施是()

A.立即洗胃 B.立即催吐 C. 硫酸钠导泻 D.0.9%生理盐水洗胃 E.监

测生命体征

16.胰腺癌的重要临床体现是()

A.食欲减退 B.恶心呕吐 C.乏力消瘦 D.梗阻性黄疸 E.饱胀不适

17.患者，男，48岁。脑瘤晚期，处在昏迷状态，需长期鼻饲，护理过程中错误的是()

A.所有鼻饲用物每日应消毒一次

B.每日做口腔护理

C.每次灌食前检查胃管与否在胃内

D.鼻饲间隔时间不少于2小时 E.胃管应每日更换消毒

18.患者，男，56岁。因无痛性全程肉眼血尿诊断为膀胱癌入院。

诊断膀胱癌最可靠的措施是()

A.B超

B.膀胱造影

C.根据经典体现

D.尿脱落细胞学检查

E.膀胱镜和活组织检查

19.红外线灯热疗，不对的措施是()

- A.协助患者于舒适卧位
- B.灯距 30 ~ 50cm
- C.紫红色均匀斑块为最佳效果
- D.治疗时间 20 ~ 30 分钟
- E.暴露治疗部位

20. 患者，女，47 岁。发现右侧乳房内无痛性肿块 2 个月，体检:右侧乳房外上象限可扪及直径约 4cm 的肿块，边界不清，质地硬。局部乳房皮肤出现“橘皮样”变化。经活组织病理学检查证明乳腺癌。行乳腺癌改良根治术。术后第 2 天，对患者采用的护理措施不对的是（ ）

- A.患侧垫枕以抬高患肢
- B.保持伤口引流管畅通
- C.观测患侧肢端的血液循环对
- D.指导患侧肩关节 的活动
- E.严禁在患侧手臂测血压、输液

21. 患者，女，62 岁。因肠梗阻入院治疗，责明任护士来 到其床边询问病史， 此时她们的关系处在护患关系的（ ）

- A.准备期 B.初始期

C.工作期 D.结束期

E.延续期

22.新生儿出生时脐带受压、打结，出生 Apgar 评分，诊断新生儿青紫窒息，下列有关描述错误的是()

A.1 分钟 Apgar 评分 4~ 7 分

B.皮肤苍白

C.呼吸表浅

D.心率减慢(80~ 120/分)

E.假如急救治疗不及时，可转为重度窒息

23.下列哪项不是心绞痛的疼痛特点()

A.阵发性前胸、胸骨后部痛

B.劳动或情绪激动时易发作

C 可放射至心前区与左上肢

D.胸痛般持续 3~ 5 分钟

E.多数患者伴有心律不齐

24.宫颈糜烂样变化进行局部物理治疗的时间在()

A.月经来潮前 3~7 天

B.月经洁净后 1 天

C.月经洁净后 3 ~ 7天

D.月经洁净后 11 天

E.月经洁净后 15 天

25.一健康小儿体重 18kg, 身高 100cm, 其年龄为()

A.3 岁 B.4 岁

C.5 岁 D.6 岁

E.7 岁

26.特发性血小板减少性紫癜贫血及出血的特点为()

A.贫血重而出血轻

B.贫血轻而出血重

C.有贫血而无出血

D.可无贫血但有皮下出血

E.贫血与出血致

27.患者, 男, 26 岁。哮喘发作, 痰栓阻塞细支气管, 大量脓痰不易咳出, 心悸乏力, 表情淡漠, 嗜睡。首要的护理措施为()

A.高压氧治疗

B.机械吸痰

C.湿化呼吸道

D.体位引流

E 鼻导管低浓度、低流量吸氧

28.患者，女，65岁。遵医嘱每天服用补钙制剂阿仑膦酸钠1次，对的服药时间是()

A.晨起 B.早饭后 C.午饭后 D.晚饭后 E.睡前

29.患者，女，26 因火灾导致头面部。上肢烧伤入院。查体:烧伤部位有大小水疱，痛觉迟钝。患者入院后第6天出现发热，体温39.6℃，创面有黄绿色分泌物伴恶臭味，其感染的细菌是()

A 溶血性链球菌

B.铜绿假单胞菌

C.金黄色葡萄球菌

D.大肠杆菌

E 梭形芽孢杆菌

30.患儿，男，10个月。易激惹，夜间常哭闹，多汗，睡眠不安，方颅，肋骨串珠。下列护理措施错误的是()

A.指导合理喂养

操作轻柔以防骨折

C.多抱患儿到户外晒太阳

D.添加含维生素 D 的食物

E.倡导进行站立训练

31.赵某，男，68 岁。因病情需要进行加压输液，忽然患者自述胸闷，胸骨后疼痛、眩晕，护士发现患者严重呼吸困难，发绀，判断为空气栓塞。请问栓塞部位最也许发生在图示部位()【图片无法显示】

32.患者，男，60 岁，对什么事情也没有爱好，常忘掉和客户约会的时间。已熟悉流程。近日也常忘掉。他常自编说法，以弥补忘掉的事情。情绪易激怒，易激动，与病前判若两人。诊断为阿尔兹海默，此病最先出现的症状是()

A 定向力障碍 B.老年健忘

C 人格障碍 D.语育障碍

E 记忆障碍

33.患者，男。65 岁。诊断为食管癌，拟进胃代食管手术，术前行抗生素盐水冷洗管的最佳时间为()

A.术前 1 天 B.术前 2 天

C 术前 3 天 D.术前 7 天

术前 14 天

34. 对的测量呼吸的措施是()

A 观测胸部或腹部起伏次数，起伏为 2 次

B.患者剧烈活动后应休息 10 分钟再测量

C 测量呼吸前要积极与患者沟通，获得合作

D.危重患者观测棉絮被吹动的次数 30 秒

E 诊脉结束后护士的手不离开诊脉的部位

位即开始测量呼吸

35. 原发性肝癌的发病原因中，最重要的有关原因是()

A.病毒性肝炎 C. 饮食原因 E.基因原因

36. 心脏骤停复苏后最易出现()

A.心肌损伤 B.肺水肿 C. 肾小管坏死 D.脑损伤 E.肝小叶中心坏死

37. 患者，女，57 岁。心衰服用洋地黄、速尿等治疗，现出现如图所示心电图体现，此时，为治疗此心率失常，首选药是()

A.利多卡因 B.阿托品

C, 维拉帕米 D.硝苯地平

E 电复律

38. 新生儿生理性体重下降的恢复时间为生后()

天 B.5 天 C.6 天 D.10 天 E.15 天

39. 高血压病患者睡眠时突感极度胸闷，气急，大汗淋漓，咳嗽，咳大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，血压 01mmHg 心率 110 次 1 分。下列哪项护理是错误的()

A. 安慰患者，稳定情绪

B. 置患者于两腿下垂坐位

C. 酒精湿化吸氧 6~8L/min

D. 建立静脉通路

E. 静脉滴注给药宜迅速

40. 患者，男，28 岁。下肢丹毒，查体见肢体片状红斑，肿胀明显，局部应擦拭药液是()

A. 0.1% 碘伏 B. 50% 硫酸镁 C. 外用生理盐水 D. 3% 过氧化氢 E. 75% 酒精

41. 护士申请外出学习，医院同意，这体现了护士享有哪项权利()

46.

A. 依法享有福利待遇的权利

依法获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务的权利

C 依法有参与业培训。从事手术研究和交面的权利

D 获得疾病诊断护理有关信息的权利

E 依法对医疗卫生机构相卫生主管部门的工作提出意见和提议

42 略

43 急性非然常性心包炎的常见病因不包()

A 自身免疫性 B 结核性 C 肿瘤性 D.外伤性 E. 内分泌及代谢性

44;铺无菌盘时，错误的做法是()

A 用无菌持物钳夹取治疗巾

B 注意使治疗巾边缘对齐

C 治疗巾开口部分及两侧反折

D 有效期不超过 6 小时

E 避免潮湿和暴露过久

45. 患儿，女，1 岁。因淋巴结核住院，医嘱肌肉注射数种药物。护士为该患儿肌肉注射时，不恰当的操作是()

A,宜选用肌肉肥厚的臀大肌

注射时应固定好肢体，防止折针

C 注意药物的配伍禁忌

D 注意常常更换注射部位

E 切勿将针梗所有刺入

40 治疗破伤风患者时，注射破伤风抗毒素的作用机制是()

A. 控制和解除痉挛小应自自协内大

B.中和游离毒素

C.保持呼吸道畅通

D.自动免疫

E.被动免疫

47.测量体温的注意事项中正确的是(，

A.昏迷患者不可测腋温

B.心肌梗死患者宜测直肠温度

C.坐浴后须等 30 分钟后方可测量直肠温度

D.幼儿测量口腔温度时护士应守护在旁

E.呼吸困难者取坐位测量口腔温度

患者，男，25岁。肋骨骨折后合并血气胸，急诊行胸腔闭式引流术。对胸腔闭式引流护理，错误的是（ ）

- A.嘱患者无折叠、扭曲、压迫管道
- B.嘱患者翻身时勿牵拉引流管
- C.保持水封瓶长管没入水中 6~8cm
- D.指导患者多做深呼吸运动
- E.更换引流瓶时应双重夹闭引流管

49. 焦虑症患者的关键症状为（ ）

- A.焦急和烦恼 B.运动性不安
- C.自主神经兴奋 D.过度警觉
- E.意识障碍

50. 2~3岁小儿的正常心率为（ ）

- A.110~130 次/分
- B.100~120 次/分
- C.80~100 次/分
- D.70~90 次/分
- E.120~150 次/分

51. 下列药物中不是治疗心力衰竭的正性肌力药物的是()

A. 毛花苷 C

B. 地高辛

C. 多巴胺

D. 硝酸异山梨酯

E. 多巴酚丁胺

52. 鹅口疮的特点为()

A. 牙龈有白色小泡点

B. 口腔白膜不易剥离

C. 患处疼痛、流涎

D. 发热

E. 口腔黏膜表面出现白色乳凝块样物

53. 护士予以慢性心力衰竭患者的饮食指导不妥的是()

A. 应少许多餐

B. 饮食应清淡、易消化

C. 每日摄盐量应少于 5g

D. 增长味精和酱油等调味品的食用，增进食欲

E.限制腌制食品和碳酸饮料

54. 患者，男，28 岁。主诉腹痛、腹泻 2 天以急性胃肠炎收入院，护士遵医嘱为其展行静脉输液，操作过程中护士运用的重要非语言沟通形式是（ ）

A.触摸 B.眼神

C.仪表 D.手势

E.表情

55. 下列增进胎肺成熟的药物是（ ）

A.铁剂 B.地塞米松

C.硫酸镁 D.葡萄糖酸钙

E.叶酸

56. 与重型胎盘早剥症状不相符的是（ ）

A.忽然剧烈腹痛

B.有妊高征病史

C.阴道出血与休克症状成正比

D.胎心音消失

E.宫底升高，子宫呈板状硬

57.当患者对护士所实行的护理行为有质疑时，护士必须详细简介，在患者同意后才能继续进行，这属于患者的()

A.平衡医疗权 B.疾病认知权

C.知情同意权 D.社会责任权

E.保护隐私权

58.患者，女，65岁。股骨颈骨折，全麻下行股骨头置换术。准备床单位的对的措施是()

A.枕头置于床头，开口对门

B.输液架置于床旁

C.盖被四折于床尾

D.在床头和床中部加铺橡胶单和中单

E.麻醉盘中准备输液器

59.继发性胆管结石多是()

A.胆色素结石 B.胆固醇结石

C.混合型结石 D.胆汁酸结石

E.胱氨酸结石

60.判断胎儿成熟最可靠的措施是()

A.胎儿身长 B.B超检查

c.检测雌三醇值 D.测量宫高、腹围

E.推算胎儿体重

61. 感染性心内膜炎最常见的症状()

A.发热 B.头痛

C.关节痛 D.咳嗽

E.呼吸困难

62. 新生儿保健重点应在出生后()

A.3 天 B.1 周

C.2 周 D.3 周

E.4 周

63. 下列药物中克制是()

A.西咪替丁 B.雷尼替丁

C.奥美拉唑 D.硫糖铝

E.枸橼酸铋钾

64. 患者，男，34 岁。上消化道出血、禁食，选用 0.02% 呋喃西林溶液进行口腔护理的作用()

A 遇有机物放出氧分子杀菌

B 变化细菌生长的酸碱环境小

C.清洁口腔，广谱抗菌

D.防腐生新。增进愈合

E 使蛋白质凝固变性

65. 患者，男，69 岁。诊断为 1 型呼吸衰竭，体现为呼吸困难，发绀明显，血气分析成果为 PaO_2 为 55mmHg, PaCO_2 为 76mmHg 该患者的氧疗方式应为 ()

A. 2~4L/min 鼻导管吸氧

B. 2~4L/min 间歇吸氧

C. 4~6L/min 酒精湿化吸氧

D. 低流量间歇吸氧

E. 1~2L/min 持续鼻导管吸氧

66. 法洛四联症 ()

A. 肺动脉高压时可出现下半身青紫

B. 肺动脉瓣第二心音固定分裂

C. 易出现心律失常

D. 胸片显示肺血少，心影呈靴形

E. 可发生艾森曼格综合征

67. 患者，男，40 岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血病因，首选的检查措施是 ()

A. X 线钡剂造影

B. 大便隐血试验

C.胃镜检查

D.血常规检查

E.B超检查

68.患者，男，65岁。有肝硬化病史12余年。近日食欲明显减退，黄疸加重。今晨因剧烈咳嗽忽然呕咖啡色液体约1200ml，黑便2次，伴头晕、眼花、心悸。急诊入院。体检：神志清晰，面色苍白，血压80/60mmHg，心率110次/分。对该患者紧急处理措施中首要的是（ ）

A.积极补充血容量

B.内镜检查明确病因

C.立即采用止血措施

D.手术治疗

E.升压药提高血压

69.枕先露胎头抵达盆底俯屈后，适应产道持续下降的径线是（ ）

A.双顶径 B.枕额径

C.枕下前囟径 D.枕频径

E.双颞径

70.急性胰腺炎最重要的体现是（ ）

A.腹痛 B.休克

C.腹胀 D.发热

E.恶心、呕吐

71.护理人员对患者说：“今天的天气真好”请问:这属于下列哪种层次的沟通()

A.一般性沟通

B.事务性沟通

C.分享性沟通

D.情感性沟通

E.共鸣性沟通

72.患者，男。8小时前负重物时，右侧斜疝被嵌顿，提醒疝内容物已发生缺血坏死，应做好急诊手术前准备的临床体现是()

A.疝块增大，不能回纳

B.全腹有压痛，肌紧张

C.疝块紧张发硬，有触痛

D.阵发性腹痛伴呕吐

E.局部有剧烈疼痛

73.尸体护理时，为了防止面部瘀血，易于识别，护士应采用的护理措施是()

A.洗脸，闭合眼睑

B.头下垫枕头

C.擦洗身体，堵塞身体孔道

D.第一张尸体识别卡系于右手腕部

E.第二张尸体识别卡别在尸单外面的腰部

74.继发性支气管扩张的常见原因不包括()

A.支气管感染 B.支气管阻塞

C.COPD D.遗传原因

E 肺结核

75.有关肛门坐浴，如下对的是，

A1:高锰酸钾

B 溶液量约 1000ml

C.水温 60C

D.便前坐浴，以解痉增进排

E.坐浴时间 20 ~ 30 分钟

76.护士小王在肿瘤科工作，现准备为一位晚期肿瘤患者配制化疗药物而应做的十()

- A.洗手、戴口罩、穿隔离衣
- B.流动水洗手、戴手套、穿隔离衣
- C.流动水洗手、戴手套、穿隔离防护罩
- D.流动水洗手、戴防护罩、戴手套在隔离衣
- E.流动水洗手，戴防护罩、戴帽子面罩、穿工作外套、穿隔离衣

77. Charcot 三联征是指()

- A.腹痛、畏寒发热、呕吐
- B.腹痛、黄疸、胆囊肿大
- C.腹痛、寒战高热、黄疸
- D.腹痛、寒战高热、低血压
- E.腹痛、黄疸、休克

78. 在护理实践中，尊重原则主要是指尊重患者的()

- A.健康
- B.家眷
- C.个体差异
- D.自主性
- E.疾病

79.急性化脓性脑膜炎的经典脑脊液变化为()

A.白细胞明显增高，蛋白轻度增高，糖正常

B.白细胞明显增高，蛋白明显增高，糖减少

C.白细胞轻度增高，蛋白正常，糖减少

D.白细胞正常，蛋白增高，糖减少

E.白细胞轻度增高，蛋白明显增高，糖正常

80.直接引起左心后负荷加重的瓣膜病变是()

A.主动脉瓣狭窄

B.主动脉瓣关闭不全

C.二尖瓣狭窄

D.肺动脉瓣狭窄

E.二尖瓣关闭不全

81.有关子宫内膜异位症哪项错误()

A.绝经后异位内膜可萎缩

B.多发生于30~40岁妇女

C.用合成孕激素周期治疗可缓和症状

D.子宫多前屈，活动受限

多伴有不孕

82. 患者，女，42 岁。白血病入院化疗 3 个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的体现，引起此副作用的化疗药物为（ ）

A. 长春新碱

B. 泼尼松

C. 柔红霉素

D. 阿霉素

E. 甲氨蝶呤

83. 支气管哮喘发作患者应取（ ）

A. 去枕平卧位

B. 端坐位

C. 患侧卧位

D. 平卧位，头偏向侧

E. 头低足高位，头偏向一侧

84. 患者，男，41 岁。因胃癌收入院。今晨在全麻下行胃大部切除术。手术过程顺利，患者安返病房。患者术后置导尿管 3 天，为防止发生尿路感染，最重要的护理措施是（ ）

A. 严密观测尿量

严格限制饮水

C. 每日尿道口护理 2 次

D. 每日更换集尿袋

E. 每日行膀胱冲洗

85. 有关慢性胃炎患者的饮食护理，错误的是()

A. 急性发作期应禁食

B. 剧烈呕吐、呕血的患者应禁食

C. 防止辛辣刺激性食物

D. 定期进餐，少食多餐

E. 剧烈呕吐、呕血的患者可静脉补充营养

86. 患儿，女，4 岁。进食豆粒时不慎呛咳，随即出现呼吸困难，面色发绀，神志不清。护士应采用的护理措施是()

A. 人工呼吸 B. 予以吸氧

C. 用吸痰器清理呼吸道

D. 做好协助气管取异物的准备

E. 将患儿平卧，头偏向侧

87. 胃十二指肠溃疡急性大出血的重要临床体现()

A. 突发上腹部剧烈疼痛

B. 呕血、黑便

肠鸣音消失

D.腹膜刺激征

E.呕吐宿食

88.有关麻疹最常见的并发症，下列说法对的是()

A.麻疹脑炎

B.喉炎

C.心肌炎

D.急性胰腺炎

E.肺炎

89.溃疡性结肠炎的临床体现不包括（）

A.粘液脓血便

B.腹胀

C.左下腹压痛

D.腹泻

E.肠出血

90.有关胎盘功能的描述不对的是（）

A.具有合成雌孕激素、HCG 等的功能

B.能制止一般细菌直接通过

有良好的防御功能，病毒不能通过

D.母血中某些免疫球蛋白能通过胎盐

E.能分泌大量的生乳素

91.急腹症诊断未明确前，下述治疗措施不对的为()

A.慎用吗啡类止痛剂

B.严密观测生命体征的变化

C.灌肠通便，观测大便的性质

D.定期检查腹部体征的发展

E.非手术治疗期间病情未见好转，甚加剧者，需剖腹探查

92.患者，女，34岁。车祸后送来医院。查体:出现刺痛后睁眼，回答问题对的，能遵命令动作，其格拉斯哥昏迷评分是()

A.9

B.10

C.11

D.12

E.13

93.在下列患者中，护士在书写交班汇报时首先应写()

床，患者张某，上午 10 时出院

B.2 床，患者李某，上午 8 时入院

C.3 床，患者贾某，下午 3 时手术

D.4 床，患者王某，下午行胸腔闭式引流术

E.5 床，患者钱某，医嘱一级护理

94. 患儿，女，3 岁。因急性淋巴细胞白血病人院，在与患儿沟通时，护士一直采用半蹲姿势与其交流，此种做法重要是应用了沟通技巧的（ ）

A. 倾听

B. 触摸

C 沉默

D. 目光沟通

E. 语言沟通

95. 急性上呼吸道感染最常见的细菌为

A. 流感嗜血杆菌

B. 溶血性链球菌

C. 肺炎球菌

葡萄球菌

E.革兰阴性杆菌

96. 支气管扩张患者咳嗽咳痰加重于()

A. 进餐时

C. 傍晚

D. 深夜

97. 持续性部分性癫痫发作的体现是()

A. 局部抽搐持续数小时或数日

B. 持续性运动性发作

C. 失神性发作

D. 发作间歇期限内患者持续昏迷

E. 强直一阵挛性反复发作

98. 女性较男性更轻易发生尿路感染的原因是女性()

A. 不讲卫生

B. 尿道短而宽

C. 喝水少

D. 减肥

E.活动少

99.除急性心肌梗死外，下列哪疾病在心电图上可出现异常深的 Q 波
()

A.病毒性心肌炎 B. 扩张型心肌病

C.肥厚型心肌病 D. 限制型心肌病

E.克山病

100. 在小儿计划免疫中，如下哪些不属于基础免疫制品()

A.卡介苗

B.百白破联合制剂

C. 脊髓灰质炎疫苗

D. 麻疹疫苗

E.流感疫苗

(101~102 题共用题干)

患儿，10 个月，呕吐，腹泻 3 天，尿量略少，皮肤弹性稍差，口唇微干，眼窝轻度凹陷，血清钠浓度为 140mmol/L

101. 该患儿的失水量约占体重的()

A.4% B.8%

C.10% D.12%

E.14%

102. 遵医嘱予以口服 ORS 溶液，护士对患儿家长的用药指导，对的是()

A. 每天口服 3 次

B.每袋一次服完

C.若患儿呕吐应立即停止喂服

D.明显腹胀时不适宜口服 ORS 溶液

E.服用前用 200ml 温开水溶解

(103~105 题共用题干)

患者，男，34 岁。平素体健。淋雨后发热咳嗽、咳痰 3 天，右上腹痛伴气急、恶心 1 天。

103. 除考虑急腹症外，重点鉴别的疾病是()

A.肺梗死 B.肺结核

C.膈神经麻痹 D.自发性气胸

E.肺炎链球菌肺炎

104. 为明确诊断，应进行的检查是（ ）

A.血常规 B.血气分析

C.x 线检查 D.血细胞涂片

E.肺功能测定

105. 首选的治疗药物是（ ）

A.头孢他啶 B.解热镇痛药

C.青霉素 D.胃肠道解痉剂

E.庆大霉素

(106~108 题共用题干)

患者，女，60岁。卵巢癌术后，拔出尿管后6小时未能自行排尿。

查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。

106. 为患者提供的护理措施中，维护其自尊的是（ ）

A.教育其养成良好的排尿习惯

B.耐心解释并提供隐蔽的排尿环境

C.调整体位以协助排尿

D.按摩其下腹部，使尿液排出

E.温水冲洗会阴以诱导排尿

107. 为患者实行导尿时，第 2 次消毒的次序是()

- A.自上而下，由外向内
- B.自下而上，由外向内
- C.自下而上，由内向外
- D.自上而下，由内向外
- E.自上而下，由内向外再向内)

108. 初次导出尿液不应超过()

- A.1000ml B.1200ml
- C.1500ml D.1700ml
- E.ml

(109 ~ 110题共用题干)

患者，男，32 岁。反复大量呕吐 3 天，尿少，色深，伴恶心，乏力，四肢厥冷。体检示:脉搏 10 次 1 分钟，血压 80/50mmHg 眼窝下陷，皮肤弹性差，尿比重 1.025，血清 Na⁺ 130mmol/L，体重 50kg。

109,该患者补液安排中，第一种 8 小时的输液量应为总量的()

- A.所有 B.1/2
- C.1/3 D.1/4

E.1/5

110. 该患者目前主重要的护理诊断/问题为 ()

A. 体液过多 B. 体液局限性

C. 皮肤完整性下降

D. 个人应对无效

E. 活动无耐力

(111 ~ 112题共用题干)

患者，女，28 岁。因意外溺水导致意识丧失、心脏骤停。

111. 应实行的急救措施是 ()

A. 心内注射急救药

B. 开胸心脏按压

C. 口对口呼吸加胸外心脏按压

D. 电击除颤

E. 低温疗法

112. 判断此患者心脏骤停的最重要指征是 ()

A. 面色苍白 B. 瞳孔散大

C. 皮肤发绀 D. 尿量减少

E.颈动脉搏动消失

(113 ~ 115题共用题干)

患者，男，78岁。有吸烟史30余年，出现慢性咳嗽、咳痰已20余年，近5年来明显加剧，已长年不停伴有喘息和呼吸困难，且以冬春季更甚。3天前因受凉感冒而致发热、剧咳、咯多量黄脓痰、气急、发绀，今晨起又出现意识模糊，躁动不安，送医院急诊并急测血气成果为动脉血氧分压 55mmHg，二氧化碳分压 60mmHg。

113. 此患者目前最确切的医疗诊断是()

A.慢性支气管炎肺炎

C 肺气肿合并呼吸衰竭

D.上呼吸道感染

E.支气管哮喘

114. 给患者的对的吸氧方式应为()

A.持续低流量吸氧

B.间断低流量吸氧

C.持续高流量吸氧

D.间断高流量吸氧

E 间断中流量吸氧

115. 患者应采用的卧位为()

A. 半坐卧位 B. 头低脚高位

C. 平卧位 D. 中凹卧位

E. 俯卧位

(116 ~ 118题共用题干)

患者，男，17岁。患1型糖尿病3年期皮下注射胰岛素，近2天因腹泻停用。

意识不清，血压75/50mmHg，心率125 y 次1分，体板:皮肤中度失水征，呼吸深大，有烂苹果味。116. 与诊断无关的检查是()

A. 血气分析 B. 血脂、胆固醇测定

C. 血糖 D. 尿糖、尿酮

E. 血培养

117. 最也许的诊断是()

A. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷

B. 糖尿病酮症酸中毒

C. 糖尿病乳酸性酸中毒

D. 低血糖昏迷

E. 低血容量性休克

118. 为该患者立即采用的措施是()

A. 静脉滴注 5% 碳酸氢钠

B. 吸氧

C. 建立静脉通路并恢复皮下注射胰岛素

D. 补液加有效的抗生素

E. 补液同步静脉滴注胰岛素

(119~120 题共用题干)

患者，男，65 岁。因胃癌行根治性胃部切除术，术后安全返回病房。

119. 责任护士遵医嘱予以患者()

A. 特级护理和 B. 一级护理

C. 二级护理 D. 三级护理

E. 四级护理

120. 患者麻醉作用已经消失，意识清醒且血压稳定的状况下，责任护士予以患者体位是()

A. 去枕平卧位

B. 低半卧位

C. 高半卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807012121100006160>