

主治医师（康复医学）-专业知识(B1 型题)

1、神经根型颈椎病减轻神经根压力的治疗

- A. 温热量超短波、干扰电疗
- B. 微热量超短波、干扰电疗
- C. 超声治疗
- D. 牵引治疗
- E. 干扰电疗、正弦调制中频电疗

2、神经根型颈椎病消除神经根炎性水肿的治疗

- A. 温热量超短波、干扰电疗
- B. 微热量超短波、干扰电疗
- C. 超声治疗
- D. 牵引治疗
- E. 干扰电疗、正弦调制中频电疗

3、颈肩痛 1 年，四肢乏力，持物不稳，查体 Hoffmann 征阳性，诊断

- A. 肩周炎
- B. 颈椎病
- C. 肩关节不稳
- D. 肩峰下滑囊炎

E. 肱骨外上髁炎

4、左肩痛 1 个月，有外伤史，查体左肩半脱位，应诊断

A. 肩周炎

B. 颈椎病

C. 肩关节不稳

D. 肩峰下滑囊炎

E. 肱骨外上髁炎

5、左肩痛 1 个月，查体外展外旋，后伸活动受限，应诊断

A. 肩周炎

B. 颈椎病

C. 肩关节不稳

D. 肩峰下滑囊炎

E. 肱骨外上髁炎

6、痛经

A. He-Ne 激光照射体穴或耳穴

B. 紫外线疗法

C. 神经肌肉电刺激

D. 调制中频电疗法

E. 直流电离子导入疗法

7、产后排尿无力

- A. He-Ne 激光照射体穴或耳穴
- B. 紫外线疗法
- C. 神经肌肉电刺激
- D. 调制中频电疗法
- E. 直流电离子导入疗法

8、产后缺乳

- A. He-Ne 激光照射体穴或耳穴
- B. 紫外线疗法
- C. 神经肌肉电刺激
- D. 调制中频电疗法
- E. 直流电离子导入疗法

9、手背烧伤时正确的部位摆放是

- A. 腕关节置于掌屈位
- B. 背屈为主
- C. 腕关节微背屈，各指蹼间用无菌纱布隔开
- D. 掌指关节自然屈曲 $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- E. 指间关节伸直，拇指持外展对掌位

10、手掌或环形烧伤时正确的部位摆放是

- A. 腕关节置于掌屈位
- B. 背屈为主
- C. 腕关节微背屈，各指蹼间用无菌纱布隔开
- D. 掌指关节自然屈曲 $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- E. 指间关节伸直，拇指持外展对掌位

11、玫瑰糠疹

- A. 表皮细胞过度增殖性慢性炎症
- B. 表皮呈局限性角化不全
- C. III型变态反应性疾病
- D. II型变态反应性疾病
- E. 真菌检验阳性

12、银屑病

- A. 表皮细胞过度增殖性慢性炎症
- B. 表皮呈局限性角化不全
- C. III型变态反应性疾病
- D. II型变态反应性疾病
- E. 真菌检验阳性

13、反应性皮肤血管炎

- A. 表皮细胞过度增殖性慢性炎症
- B. 表皮呈局限性角化不全
- C. III型变态反应性疾病
- D. II型变态反应性疾病
- E. 真菌检验阳性

14、脊髓损伤后常出现上述症状中的

- A. 小脑性共济失调
- B. 感觉性共济失调
- C. 舞蹈样运动
- D. 手足搐搦
- E. 铅管样强直

15、巴比妥中毒患者常出现上述症状中的

- A. 小脑性共济失调
- B. 感觉性共济失调
- C. 舞蹈样运动
- D. 手足搐搦
- E. 铅管样强直

16、帕金森病常出现上述症状中的

- A. 小脑性共济失调

- B. 感觉性共济失调
- C. 舞蹈样运动
- D. 手足搐搦
- E. 铅管样强直

17、周围神经损伤后半个月，针极肌电图可见到的是

- A. 插入电位减弱或消失
- B. 纤颤电位
- C. 长时限运动单位电位
- D. 肌强直电位
- E. 群放电位

18、营养不良性肌强直症肌电图表现为

- A. 插入电位减弱或消失
- B. 纤颤电位
- C. 长时限运动单位电位
- D. 肌强直电位
- E. 群放电位

19、以上哪一个选项可于癌症患者心理评定时进行情绪测验应用

- A. 功能独立性测定
- B. Karnofsky 患者活动状况评定

C. 汉密尔顿抑郁量表

D. 艾森克人格问卷

E. 总体情感量表

20、以上哪一个选项可于癌症患者进行躯体功能评定时，应用于全身活动功能评定的通用评定

A. 功能独立性测定

B. Karnofsky 患者活动状况评定

C. 汉密尔顿抑郁量表

D. 艾森克人格问卷

E. 总体情感量表

21、色努式矫形器胸椎部侧弯矫治能力为

A. 30°

B. 35°

C. 40°

D. 45°

E. 50° 以上

22、脊柱侧弯的手术指征是

A. 30°

B. 35°

- C. 40°
- D. 45°
- E. 50° 以上

23、烧伤创面的愈合后应尽快采取的康复手段是

- A. 促进烧伤创面的愈合
- B. 预防肥厚性瘢痕
- C. 防止和减轻关节挛缩及关节活动障碍等后遗症发生
- D. 职业培训
- E. 心理治疗

24、预防烧伤后肥厚性瘢痕的目的是

- A. 促进烧伤创面的愈合
- B. 预防肥厚性瘢痕
- C. 防止和减轻关节挛缩及关节活动障碍等后遗症发生
- D. 职业培训
- E. 心理治疗

25、调动患者的主观能动性，积极参与康复早日重返社会要采用

- A. 促进烧伤创面的愈合
- B. 预防肥厚性瘢痕
- C. 防止和减轻关节挛缩及关节活动障碍等后遗症发生

D. 职业培训

E. 心理治疗

26、MT 属于

A. 失用症评定

B. 失认症评定

C. 注意障碍评定

D. 记忆障碍评定

E. 语言障碍评定

27、几何图形临摹属于

A. 失用症评定

B. 失认症评定

C. 注意障碍评定

D. 记忆障碍评定

E. 语言障碍评定

28、等分线段测验属于

A. 失用症评定

B. 失认症评定

C. 注意障碍评定

D. 记忆障碍评定

E. 语言障碍评定

29、视跟踪测试属于

A. 失用症评定

B. 失认症评定

C. 注意障碍评定

D. 记忆障碍评定

E. 语言障碍评定

30、轻度脑外伤 GCS 评分是

A. GCS 评分 4~7 分

B. GCS 评分 ≤ 8 分

C. GCS 评分 8~10 分

D. GCS 评分 9~12 分

E. GCS 评分 13~15 分

31、中度脑外伤 GCS 评分是

A. GCS 评分 4~7 分

B. GCS 评分 ≤ 8 分

C. GCS 评分 8~10 分

D. GCS 评分 9~12 分

E. GCS 评分 13~15 分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807023146164006156>