

中医眼科学试题及答案

1、患者,女,32岁。右眼3点位近瞳孔缘处有一3mm×4mm翳障,其表面光滑,边缘清晰,无红赤肿痛,可诊断为

- A. 宿翳
- B. 凝脂翳
- C. 湿翳
- D. 混睛障
- E. 暴露赤眼生翳

【答案】 A

2、患儿5岁,裸眼视力右0.1,左0.2,眼外观无明显异常,屈光间质无混浊,眼底大致正常,须行屈光状态检查,应选

- A. 睫状肌麻痹验光
- B. 插片验光
- C. 电脑验光
- D. 综合验光仪验光
- E. 以上都不是

【答案】 A

3、胞生痰核的治疗原则以（）为主

- A. 疏风清热
- B. 解毒散邪

C. 温化水湿

D. 活血化瘀

E. 化痰散结

【答案】 E

4、突然无痛性视力丧失,眼底检查后极部视网膜弥漫性水肿.黄斑部樱桃红,首先考虑

A. 后部缺血性视神经病变

B. 视网膜中央动脉阻塞

C. 前部缺血性视神经病变

D. 视网膜分支静脉阻塞

E. 视网膜中央静脉阻塞

【答案】 B

5、我国有资料记载的使用眼镜的朝代是

A. 唐朝

B. 宋朝

C. 元朝

D. 明朝

E. 清朝

【答案】 B

6、胞生痰核的治疗原则以（）为主

- A. 疏风清热
- B. 解毒散邪
- C. 温化水湿
- D. 活血化瘀
- E. 化痰散结

【答案】 E

7、患者反复眼胀头痛,且难以缓解,已视力全无,不睹三光。眼部检查为白睛赤脉稀疏粗大,黑睛雾浊不清,失去光泽,瞳神散大不收,黄仁全周缩窄如线,变薄泛白,指测眼珠较硬,眼压持续性增高,眼底不能窥见。主要考虑的治疗方案是

- A. 中药辨证施治
- B. 西药降低眼压
- C. 针灸止痛
- D. 全视网膜光凝或冷凝
- E. 眼球手术摘除

【答案】 E

8、眼外伤后患眼瞳神不圆,呈D形,当属

- A. 胞睑受伤
- B. 黄仁受伤
- C. 白睛受伤
- D. 晶珠受伤

E. 黑睛受伤

【答案】B

9、患者,男,28岁,车祸外伤后3个月,视盘色淡近苍白,头痛健忘,舌暗红有瘀点,脉细涩。下列哪一方剂适用

A. 四物五子丸

B. 逍遥散

C. 归脾汤

D. 桃红四物汤

E. 明目地黄汤

【答案】D

10、患者漏睛疮症见内眦角处红肿疼痛,头痛泪多,恶寒发热属于风热上攻型者,选何方为宜

A. 黄连解毒汤

B. 千金托里散

C. 驱风散热饮子

D. 驱风一字散

E. 竹叶泻经汤

【答案】C

11、患眼自觉涩痛畏光,泪热眵结,白睛上小泡样颗粒隆起,其周围赤脉怒张;兼有口干,便秘溲赤;舌红苔黄,脉数有力。属于

- A. 肺经燥热
- B. 肺阴不足
- C. 肺脾两虚
- D. 肝肾两虚
- E. 脾胃湿热

【答案】 A

12、原有漏睛再加何因常可引起凝脂翳

- A. 游泳
- B. 黑睛损伤
- C. 年老体弱
- D. 饮食不节
- E. 过度劳累

【答案】 B

13、玻璃体混浊中医病名较多, 不正确的是

- A. 云雾移睛
- B. 蝇翅黑花
- C. 蝇影飞越
- D. 眼风黑花
- E. 视直如曲

【答案】 E

14、混睛障的翳障形态特征是：

- A. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阳性
- B. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阴性
- C. 黑睛深层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阳性
- D. 黑睛深层呈地图状灰白色混浊, 荧光素染色阴性
- E. 黑睛表层呈圆盘状灰白色混浊, 荧光素染色阴性

【答案】 B

15、目系疾病多从()论治

- A. 肾
- B. 脾
- C. 肝
- D. 肺
- E. 心

【答案】 C

16、血流不畅或瘀血停聚所致眼病的内治法是

- A. 活血化瘀法
- B. 疏肝理气法
- C. 益气养血法

D. 软坚散结法

E. 祛湿法

【答案】 A

17、通睛的斜视角检查结果应为

A. 第一斜视角大于第二斜视角

B. 第一斜视角小于第二斜视角

C. 第一斜视角等于第二斜视角

D. 第一斜视角不确定

E. 第二斜视角不确定

【答案】 C

18、双眼上胞下垂,起病缓慢,晨起病轻,午后加重,休息后减轻,劳累后加重,辨证考虑为

A. 先天不足

B. 脾虚气弱

C. 肝肾亏虚

D. 风痰阻络

E. 肝郁气滞

【答案】 B

19、宋代医家陈无择提出致病“三因”学说,将眼病病因归纳为内因、外因和

A. 外伤

B. 不内外因

C. 遗传^严

D. 老化

E. 疔气

【答案】 B

20、《证治准绳》的作者是

A. 傅仁宇

B. 倪维德

C. 王肯堂

D. 黄庭镜

E. 黄岩

【答案】 C

21、暴风客热多因

A. 风热之邪外袭

B. 外感疫毒之气

C. 风热湿邪搏结

D. 风寒客目

E. 痰湿内蕴

【答案】 A

22、患有络损暴盲,视网膜反复出血,其色较淡;面色萎黄或无华,肢体倦怠,少气懒言,纳差便溏,或月经量少或淋漓不断;舌淡胖,脉弱,宜用

- A. 血府逐瘀汤
- B. 归脾汤
- C. 桃红四物汤合温胆汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 天麻钩藤饮

【答案】 B

23、《银海精微》为医家托名孙思邈撰成的眼科专书,实际成书年代为

- A. 隋唐时期
- B. 宋元时期
- C. 明清时期
- D. 南北朝时期
- E. 鸦片战争以后

【答案】 B

【解析】

24、因眼与肺气有着密切的关系,故《灵枢·决气》中说:气脱者()

- A. 目不明
- B. 络不畅
- C. 血不行

D. 肠不通

E. 水不利

【答案】 A

25、肝劳的主要临床表现如头眼胀痛等,常在以下哪种情况下出现

A. 晨起后

B. 劳动后

C. 游泳后

D. 患肝病后

E. 久视后

【答案】 E

26、根据五轮学说,视衣属于

A. 气轮

B. 火轮

C. 血轮

D. 水轮

E. 肉轮

【答案】 D

27、患者男,55岁,眉棱骨痛伴前额疼痛,伴发热恶风,鼻塞流涕。多由于

A. 风热外袭,上扰清窍

- B. 肝郁化火, 目窍不利
- C. 肝血不足, 外感风邪
- D. 风痰上逆, 目窍不利
- E. 邪毒侵袭, 壅闭清窍

【答案】A

28、患者眼前突发红光满目, 视物不清, 血灌瞳神, 全身伴有头晕耳鸣, 腰膝酸软, 五心烦热, 口干咽燥, 舌红苔少, 脉细数, 宜用

- A. 血府逐瘀汤
- B. 知柏地黄丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 丹栀逍遥散
- E. 黄连上清丸

【答案】B

29、患眼自觉涩痛畏光, 泪热眵结, 白睛上小泡样颗粒隆起, 其周围赤脉怒张; 兼有口渴鼻干, 便秘溲赤; 舌红苔黄, 脉数有力。属于

- A. 肺经燥热
- B. 肺阴不足
- C. 肺脾两虚
- D. 肝肾两虚
- E. 脾胃湿热

【答案】A

30、患者头眼胀痛,久视后加重,除内服药外,外用熏洗选下列哪组药为宜

- A. 黄连. 黄芩. 黄柏. 大黄
- B. 红花. 艾叶. 苏木. 秦皮. 冰片
- C. 银花. 连翘. 野菊花. 蒲公英
- D. 荆芥. 防风. 麻黄. 桂枝. 细辛
- E. 以上都不是

【答案】B

31、络阻暴盲主要是指

- A. 眼前突然出现飘动黑影, 视力昏蒙
- B. 患眼剧痛, 其硬如石, 视力明显下降
- C. 眼底脉络出血, 视力急降
- D. 眼前出现固定黑影, 视物弯曲变形, 视力突降
- E. 以上都不是

【答案】E

32、凝脂翳多由何种病菌感染而引起

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 真菌,

D. 衣原体

E. 霉菌

【答案】 B

33、风为阳邪,有升发.向上.向外的特点,这主要是因为风邪有哪个特性

A. 为百病之长

B. 善行数变

C. 常夹邪为患

D. 开泄

E. 善动不居

【答案】 D

34、六淫所致两眦疾病中,尤以

A. 风邪为患居多

B. 寒湿为患居多

C. 风湿为患居多

D. 火热为患居多

E. 风燥为患居多

【答案】 A

35、睑内结石的表现为

A. 睑内颗粒,色红而坚,状若花椒

- B. 睑内颗粒, 色黄而软, 状若粟米
- C. 睑内颗粒, 色黄白, 状如碎米
- D. 睑内核状硬结, 逐渐长大, 触之不痛, 皮色如常
- E. 胞睑局部形似麦粒硬结, 红肿痒痛

【答案】 C

36、黑睛疾病的特点除外以下哪一项

- A. 碜涩疼痛
- B. 视力下降
- C. 羞明流泪
- D. 胞睑肿块
- E. 抱轮红赤

【答案】 D

37、宿翳相当于西医学之

- A. 病毒性角膜炎
- B. 细菌性角膜炎
- C. 真菌性角膜炎
- D. 角膜瘢痕
- E. 角膜基质炎

【答案】 D

38、黑睛与黄仁相邻,以神水相隔,故在黑睛发生病变时常会引起瞳神的何种变化

- A. 缩小
- B. 扩大
- C. 变形
- D. 变红
- E. 变白

【答案】 A

39、以下哪种病不属于暴盲的范畴

- A. 视神经乳头炎
- B. 视网膜中央动脉阻塞
- C. 视网膜静脉周围炎
- D. 虹膜睫状体炎
- E. 急性球后视神经炎

【答案】 D

40、患者真睛破损,伤眼剧痛,视力剧降,头痛如裂,胞睑瘀血肿胀,白睛混赤,神水混浊,晶珠破损混浊。下列哪一方剂适用

- A. 驱风散热饮子
- B. 除风益损汤
- C. 五味消毒饮
- D. 退热散和五味消毒饮

E. 补中益气汤

【答案】D

41、患者反复眼胀头痛,且难以缓解,已视力全无,不睹三光。眼部检查为白睛赤脉稀疏粗大,黑睛雾浊不清,失去光泽,瞳神散大不收,黄仁全周缩窄如线,变薄泛白,指测眼珠较硬,眼压持续性增高,眼底不能窥见。主要考虑的治疗方案是

A. 中药辨证施治

B. 西药降低眼压

C. 针灸止痛

D. 全视网膜光凝或冷凝

E. 眼球手术摘除

【答案】E

42、黄风内障相当于西医学之

A. 急性闭角型青光眼

B. 开角型青光眼

C. 绝对期青光眼

D. 继发性青光眼

E. 青光眼睫状体炎综合征

【答案】E

43、络损暴盲的主要特征是

A. 视网膜渗出

- B. 视网膜脱离
- C. 黄斑区樱桃红斑
- D. 视网膜出血
- E. 黄斑区水肿

【答案】 D

44、患眼不慎溅入沸油,灼热剧痛.热泪频流,胞睑红赤浮肿.并见水疱;白睛红赤.黑睛大片翳障,证属

- A. 气滞血瘀
- B. 火毒犯目
- C. 脓毒侵袭
- D. 毒伤健眼
- E. 风热犯目

【答案】 B

45、下列哪一种眼病不属于内障范畴

- A. 瞳神紧小
- B. 视瞻昏沙
- C. 青盲
- D. 混睛障
- E. 云雾移睛

【答案】 D

46、《证治准绳·杂病·七窍门》在论述目内神膏的形成时,认为神膏是由

- A. 心血上输于目而成
- B. 肝血升运于目而成
- C. 胆中渗润精汁升发而成
- D. 脾输精气上凝而成
- E. 肾精所化生

【答案】 C

47、泻火解毒法主要用于治疗

- A. 外感火热之邪所致的眼病
- B. 外感风热之邪所致的眼病
- C. 阴虚火旺所致的眼病
- D. 气血凝滞所致的眼病
- E. 肝气郁结所致的眼病

【答案】 A

48、风牵偏视经针.药治疗半年余,仍复视严重,可行

- A. 灸疗
- B. 按摩疗法
- C. 拔罐疗法
- D. 药浴

E. 手术治疗

【答案】 E

49、外障与内障区分主要根据

A. 发病原因

B. 病情轻重

C. 病变部位

D. 病情虚实

E. 有无症状

【答案】 C

50、通睛,相当于西医学的哪种疾病

A. 共同性内斜视

B. 共同性外斜视

C. 麻痹性斜视

D. 动眼神经麻痹

E. 上睑下垂

【答案】 A

51、患者,女,58岁,眼前突然出现阴影,头目胀痛,眩晕耳鸣,急躁易怒,腰膝酸软,失眠健忘,舌质红,苔薄黄,脉弦数。宜选用何方

A. 通窍活血汤

B. 逍遥散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807035065066006041>