

初级(师)卫生资格初级康复医学治疗技术师模拟题 2021 年

(95)

(总分 146,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 脑梗死后 CT 出现低密度改变的时间一般是

- A. 发病后即刻
- B. 发病后 1 周
- C. 发病后 1 月
- D. 发病后 6h
- E. 发病后 1~2 天

2. 35 岁男性, 工作中突感剧烈头痛、呕吐、一过性意识丧失, 醒后颈枕部疼痛, 左侧上睑下垂, 左瞳孔较右侧大, 颈强, 克氏征阳性, 最可能的诊断是

- A. 急性脑膜炎
- B. 脑出血、脑疝
- C. 脑干出血
- D. 小脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

3. 40 岁女性患者, 活动中突发左侧肢体无力, 查体: 神志清, 失语, 二尖瓣区可闻及双期杂音, 心律不齐, 右侧偏瘫, 上肢重于下肢, 左侧偏身针刺觉减退, 首先考虑的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 脑栓塞
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 蛛网膜下腔出血

4. 急性脑疝的处理包括

- A. 亚低温疗法
- B. 苯妥英钠每次 0.1g, 每日 3 次用于预防发作
- C. 快速静脉输注高渗降颅压药物, 以缓解病情, 争取时间
- D. 患者突然变得躁动不安, 提示有颅内血肿或脑水肿的可能
- E. 意识模糊的患者出现躁动, 须先找原因, 然后才给镇静剂

5. 颅内压增高"三主征"是指

- A. 昏迷、高热、瞳孔散大
- B. 昏迷、血压升高、呕吐
- C. 头痛、高热、血压升高
- D. 血压升高、高热、呼吸不规则

- E. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
6. 某 40 岁车祸头部受伤患者，深昏迷状态。刺激有去脑强直发作，头 CT 未见颅内血肿及脑挫伤，环池未受压，诊断应是
- A. 脑干损伤
B. 脑震荡
C. 脑挫裂伤
D. 轴索损伤
E. 颅底骨折
7. 一患者体检发现，右侧脐平面以下痛觉减退，左侧下肢上运动神经元性瘫痪，深感觉消失，病变部位在
- A. 右侧颈髓
B. 左侧胸髓
C. 右侧胸髓
D. 腰髓病变
E. 左侧颈髓
8. 下列概念中，"脊髓受伤后在损伤节段以下立即发生的完全性弛缓性瘫痪，并伴有各种反射、感觉、括约肌功能丧失的临床征象"属于
- A. 截瘫
B. 四肢瘫
C. 脊髓休克
D. 马尾综合征
E. 脊髓圆锥综合征
9. 脊柱损伤的急救搬运哪项是错误的
- A. 用木板或门板搬运
B. 一人抬头，一人抬足
C. 有颈椎损伤的要有专人托扶头部
D. 用担架搬运
E. 脊髓损伤的可由自己托住头部
10. 脊髓灰质炎辅助检查中，不包括
- A. 起病 1 周内可从咽部及粪便内分离出病毒
B. 中和抗体双份血清效价 4 倍以上增长者可确诊
C. 脊髓 MRI 检查
D. 早期脑脊液中性粒细胞增高，以后以淋巴细胞为主
E. 神经电生理学检查可显示下运动神经元及肌肉的受损情况
11. 女性患儿 18 个月，因左下肢不能站立 6 个月来诊。体检：T35℃，神志清，心、肺无异常，左下肢 3 级，轻度肌萎缩，跟腱反射阳性，膝反射未引出，未接种过任何预防注射，诊断脊髓灰质炎。脊髓灰质炎的临床经过应为
- A. 潜伏期，前驱期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
B. 潜伏期，前驱期，瘫痪前期，恢复期，后遗症期
C. 潜伏期，前驱期，瘫痪前期，瘫痪期，后遗症期
D. 潜伏期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
E. 潜伏期，前驱期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
12. 对神经干叩击试验(Tinel 征)的描述不正确的是
- A. 在相应平面轻叩神经

- B. 神经髓鞘再生较轴突再生快
 - C. 在神经损伤或损伤神经修复后
 - D. 神经分布区出现放射痛和过电感
 - E. 神经轴突外露，被叩击时出现的过敏现象
13. 与帕金森病的发病机理有关的是
- A. 遗传性铜代谢障碍
 - B. A 族溶血性链球菌感染
 - C. 一氧化碳中毒
 - D. 常染色体显性遗传
 - E. 黑质神经元丧失造成尾核与壳内多巴胺神经递质耗竭
14. 帕金森病的症状和体征中，"多从一侧上肢的近端开始，逐渐蔓延到远端、对侧及全身。肢体和躯体失去了柔软性，变得很僵硬"属于
- A. 震颤
 - B. 肌肉僵直
 - C. 特殊姿势
 - D. 自主神经症状
 - E. 运动迟缓或减少
15. 多发性硬化的病变部位不累及
- A. 小脑
 - B. 大脑半球
 - C. 视神经
 - D. 坐骨神经
 - E. 脊髓
16. 关于老年性痴呆的描述不正确的是
- A. 是一种慢性大脑退行性变性疾病
 - B. 临床主要表现为进行性记忆力下降，早期以远期记忆障碍为主
 - C. 病理特征包括老年斑、神经元纤维缠结、神经元减少及颗粒空泡变性
 - D. 药物治疗主要以增加脑内胆碱能神经系统功能为主
 - E. 行为改变先见幼稚、笨拙，常进行无效劳动，其后可有无目的性劳动
17. 帕金森病的临床特点包括()。
- A. 细微震颤
 - B. 扑翼震颤
 - C. 动作性震颤
 - D. 静止性震颤
 - E. 特发性震颤
18. 脑卒中最重要和独立的危险因素
- A. 高血压
 - B. 心脏病
 - C. 糖尿病
 - D. 高脂血症
 - E. 高同型半胱氨酸血症
19. 脑缺血超早期治疗的时间窗应不超过
- A. 2h
 - B. 4h

C. 6h

D. 8h

E. 10h

20. 伴有剧烈头痛呕吐的脑卒中最常见的是

A. 脑出血

B. 脑栓塞

C. 脑血栓形成

D. 出血性卒中

E. 蛛网膜下腔出血

21. 70 岁男性，突发言语不能，右侧肢体无力，约 20 分钟恢复，反复发作 2 次，发作间期

A. 瘰症发作

B. 癫痫

C. 脑栓塞

D. 颈内动脉系统 TIA

E. 椎-基底动脉系统 TIA

22. 脑外伤后癫痫发作的处理不正确的是

A. 癫痫发作时首选安定静脉缓慢注射控制发作

B. 可选用苯妥英钠预防发作

C. 静脉注射安定未能制止的抽搐，须重复注射直至制止抽搐，必要时可静脉滴注

D. 癫痫发作抽搐严重时可大力按压肢体控制发作

E. 癫痫发作时需要放压舌板于口中门齿间预防咬伤舌头

23. 脑外伤后躁动的处理包括

A. 明确诊断后尽快手术去除病因

B. 苯妥英钠每次 0.1g、每日三次用于预防发作

C. 快速静脉输注高渗降颅压药物，以缓解病情，争取时间

D. 患者突然变得躁动不安，提示有颅内血肿或脑水肿的可能

E. 意识模糊的患者出现躁动，须先给镇静剂，再找原因

24. 18 岁男性患者，头部被钝物击伤，受伤时无昏迷及抽搐，2h 后出现头部及颈项部疼痛伴呕吐 2 次，查体：神清，躁动，颈部略抵抗，左额部轻度皮肤挫伤。该患者最可能的诊断是

A. 急性硬膜下血肿

B. 颅内血肿

C. 急性硬膜外血肿

D. 蛛网膜下腔出血

E. 脑膜炎

25. 脊髓损伤早期救治的最佳时间为伤后

A. 3h

B. 6h

C. 9h

D. 12h

E. 15h

26. 脊髓休克表现不包括

A. 弛缓性瘫痪可持续几小时到几周

B. 弛缓性瘫痪时间越长，预后越差

C. 伴有各种反射、感觉、括约肌功能丧失的临床征象

- D. 脊髓受伤后在损伤节段以下立即发生的完全性弛缓性瘫痪
- E. 脊髓受伤后在损伤节段以上立即发生的完全性弛缓性瘫痪
27. 下列概念中, "主要为脊髓骶段圆锥损伤, 可引起膀胱、肠道和下肢反射消失"属于
- A. 截瘫
- B. 四肢瘫
- C. 脊髓休克
- D. 马尾综合征
- E. 脊髓圆锥综合征
28. 判断脊髓休克是否结束, 不正确的是
- A. 损伤平面以下出现疼痛感觉和肌肉张力升高表示脊髓休克结束
- B. 球海绵体反射的消失为休克期, 反射的再现表示脊髓休克结束
- C. 损伤平面以下可引出反射表示脊髓休克结束
- D. 患者意识清醒表示脊髓休克结束
- E. 损伤平面以下出现肌肉收缩运动表示脊髓休克结束
29. 脊髓型脊髓灰质炎, 呈下运动神经元损害特征, 不包括
- A. 感觉正常
- B. 腱反射减弱或消失
- C. 单侧下肢瘫痪最多见
- D. 肌力减弱, 肌张力正常
- E. 近端大肌群常较远端小肌群瘫痪早且重
30. 一发热、腹泻的患儿, 轻咳, 食欲减退, 大便中分离出脊髓灰质炎 I 型病毒, 双份血清检查、中和抗体、补体结合抗体均为阳性, IgM 正常, 此患儿符合脊髓灰质炎 I 型病毒感染过程中的哪一类型
- A. 病毒携带者
- B. 隐性感染
- C. 顿挫型感染
- D. 潜在型感染
- E. 非瘫痪型感染
31. 电生理检查, 完全性神经损伤时可见
- A. 正锐波
- B. 无纤颤电位
- C. 平均时限延长
- D. 可记录到电位活动
- E. 波幅及电压降低
32. 帕金森病临床表现运动迟缓或减少不包括
- A. 言语减少, 语音低沉、单调
- B. 转身困难, 要用连续数个小碎步才能转身
- C. 行进中, 患侧上肢的协同摆动减少以至消失
- D. 坐下后不能自行站立, 卧床后不能自行翻身
- E. 写字时笔迹弯曲, 越写越小, 称为"小写症"
33. 帕金森病的症状和体征中, "由于上臂肌肉和手指肌的强直, 患者的上肢不能作精细的动作, 如解系鞋带、扣纽扣等动作比以前缓慢"属于
- A. 震颤
- B. 肌肉僵直

- C. 特殊姿势
 - D. 自主神经症状
 - E. 运动迟缓或减少
34. 多发性硬化的诊断依据不包括
- A. 有两次或两次以上的复发和缓解
 - B. 在中枢神经系统内有两个或两个以上病灶
 - C. 脑脊液检查发现 IgG 上升或有寡克隆带
 - D. 家族史
 - E. 诱发电位、MRI 等显示亚临床病灶
35. 老年性痴呆，又称阿尔茨海默病(AD)，是一种慢性大脑退行性变性疾病。临床表现不包括
- A. 情绪改变
 - B. 分析判断能力衰退
 - C. 行为失常、意识模糊
 - D. 进行性远记忆力障碍
 - E. 最后死于肺炎或尿路感染
36. 关于震颤麻痹的三个主要体征，下列正确的是()。
- A. 震颤，肌张力增高，慌张步态
 - B. 震颤，面具脸，肌张力增高
 - C. 运动减少，搓丸样动作，肌张力增高
 - D. 震颤，肌张力增高，运动减少
 - E. 震颤，面具脸，运动减少
37. 短暂性脑缺血发作(TIA)愈频繁，卒中风险愈高。有卒中史的患者复发率较一般人群高
- A. 1 倍
 - B. 2 倍
 - C. 3 倍
 - D. 4 倍
 - E. 5 倍
38. 关于脑血栓形成叙述不正确的是
- A. MRI 可清晰显示早期缺血性梗死
 - B. 多数病例发病 24h 后逐渐显示低密度灶
 - C. 如果脑血流再通超过时间窗时限，脑损伤可继续加剧
 - D. 脑梗死区血流再通后脑代谢恢复，脑组织损伤相应恢复
 - E. 腰穿只在不能做 CT 检查、难以区分脑梗死与脑出血时进行
39. 脑出血处理方法不包括
- A. 改善脑循环治疗
 - B. 支持治疗
 - C. 防治并发症
 - D. 血压紧急处理
 - E. 血管源性脑水肿处理
40. 60 岁女性，晨起出现言语不清，右侧肢体无力，2 天后因病情逐渐加重就诊。血压 120 / 70mmHg，神清，运动性失语，右侧肢体无力，可完全排除的诊断是
- A. 脑血栓形成
 - B. 脑出血
 - C. 脑栓塞
 - D. 短暂性脑缺血发作

- E. 蛛网膜下腔出血
41. 脑干损害的特征是
- A. 四肢瘫痪
 - B. 神志昏迷
 - C. 交叉瘫痪
 - D. 出现自动反射
 - E. 吞咽障碍
42. 某青年右面部颧骨被石块击伤后昏迷 30 分钟，清醒 5 小时后又转为昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，左侧肢体瘫痪和生命体征变化，临床诊断首先考虑
- A. 脑内血肿
 - B. 脑挫伤
 - C. 脑水肿
 - D. 急性硬膜下积液
 - E. 急性硬膜外血肿
43. 35 岁男性患者，头外伤后急性颅内血肿，左侧瞳孔散大，紧急处理措施首选
- A. 气管切开，防止脑缺氧
 - B. 头颅 CT 扫描，明确血肿部位
 - C. 尽快钻孔探查，寻找并清除血肿
 - D. 20%甘露醇 250ml，快速静脉滴入
 - E. 脑室穿刺放脑脊液
44. 中央束综合征常见于颈脊髓血管损伤，其特点不包括
- A. 下肢障碍比上肢明显
 - B. 上肢神经受累重于下肢
 - C. 上肢的运动神经纤维偏于脊髓中央
 - D. 下肢的运动神经纤维偏于脊髓外周
 - E. 血管损伤时脊髓中央先开始发生损害，再向外周扩散
45. 下列概念中，"指椎管内腰骶神经根损伤，可引起膀胱、肠道及下肢反射消失"属于
- A. 截瘫
 - B. 四肢瘫
 - C. 脊髓休克
 - D. 马尾综合征
 - E. 脊髓圆锥综合征
46. 胸段脊髓半切综合征(Brown-Sequard)的运动障碍表现为
- A. 病变水平以下同侧肢体中枢性瘫痪
 - B. 病变水平以下对侧肢体中枢性瘫痪
 - C. 病变水平以下对侧肢体周围性瘫痪
 - D. 病变水平以下同侧肢体周围性瘫痪
 - E. 病变水平以下同侧肢体中枢性瘫痪和肌肉萎缩
47. 在脊髓灰质炎的流行中，哪一类型最常见
- A. 脊髓型
 - B. 顿挫型
 - C. 脑炎型
 - D. 脑干型
 - E. 混合型

48. 女性患儿，16 个月，因右下肢不能站立就诊，诊断为脊髓灰质炎急性期，治疗原则不包括

- A. 卧床休息至少至热退后 1 周
- B. 瘫痪肢体置于功能位，以防畸形
- C. 肌痛者可选择适当的物理因子治疗
- D. 对高热病情进展迅速者，可肌注丙种球蛋白
- E. 尽早活动肢体

49. 电生理检查，部分神经损伤时可见

- A. 正锐波
- B. 纤颤电位
- C. 平均时限延长
- D. 记录不到电位
- E. 波幅及电压正常

50. 帕金森病临床表现中，"震颤在静止时出现，如手指或肢体处于某一特殊体位的时候出现，当变换一下姿势时消失；随意运动和睡眠中也消失"属于

- A. "小写症"
- B. "面具脸"
- C. 静止性震颤
- D. "慌张步态"
- E. 铅管样强直

51. 帕金森病的症状和体征中，"全身肌肉均可受累，肌张力增高，但静止时屈肌张力较伸肌高，故出现特定姿势"属于

- A. 震颤
- B. 肌肉僵直
- C. 特殊姿势
- D. 自主神经症状
- E. 运动迟缓或减少

52. 多发性硬化常见的临床表现不包括下列哪一项

- A. 共济失调
- B. 失语
- C. 视力下降
- D. 眼球震颤
- E. 核间性眼肌麻痹

53. 老年性痴呆临床表现中最早出现的症状是

- A. 头痛
- B. 定向障碍
- C. 情感淡漠
- D. 言语障碍
- E. 记忆障碍

54. 下列哪项不是脑卒中高危因素？()

- A. 口服避孕药
- B. 吸烟和酗酒
- C. 高同型半胱氨酸血症
- D. 体力活动减少

E. 性别

55. 椎-基动脉系统 TIA 特征性症状包括

- A. 眩晕和平衡障碍，多不伴有耳鸣
- B. 跌倒发作、短暂性全面性遗忘症
- C. 对侧单肢无力或轻偏瘫，伴面部轻瘫
- D. Homer 征交叉瘫(病变侧 Homner 征、对侧偏瘫)
- E. 眼动脉交叉瘫(病变侧单眼一过性黑矇，对侧偏瘫及感觉障碍)

56. 脑卒中各类型的诊断要点中，属于脑出血的是

- A. 必有头痛呕吐
- B. 偏瘫及其他症状
- C. 腰穿脑脊液一般不含血
- D. 多有脑膜刺激征，少数有颅神经及轻偏瘫
- E. 有颅内动脉系统和椎-基底动脉系统症状和体征

57. 蛛网膜下腔出血诊断要点不包括

- A. 多无意识丧失
- B. 突发异常剧烈全头痛
- C. 发病多有激动、用力或排便等诱因
- D. 伴有呕吐、畏光、项背部或下肢疼痛
- E. CT 不能确诊时，可行腰穿和 CSF 检查

58. 30 岁女性，劳动中突感剧烈头痛、呕吐，查体脑膜刺激征阳性，无肢体无力，应首选何种辅助检查来确定诊断

- A. 脑血流图(TCD)
- B. 头颅 CT
- C. 脑电图
- D. 腰穿
- E. 脑动脉造影

59. 脑外伤辅助检查不包括

- A. 脑震荡 CT 检查颅内常无异常
- B. MRI 可查出脑干或小脑部位的损伤
- C. 腰穿脑脊液呈血性
- D. 硬膜下血肿在颅骨内板与脑表面之间新月形或半月形影
- E. 硬膜外血肿在颅骨内板与脑表面之间有双凸镜形或弓形密度增高影

60. 枕骨大孔疝和颞叶沟回疝的主要鉴别点是

- A. 早期出现呼吸骤停
- B. 血压升高
- C. 烦躁不安
- D. 频繁呕吐
- E. 剧烈头痛

61. 40 岁男性患者，2h 前被木棒击打右侧头部，此后自述头痛明显，伴呕吐。1h 前出现意识不清。查体：中度昏迷，右侧瞳孔比左侧大 3mm，左侧病理征阳性，该患者诊断最可能为

- A. 硬膜下血肿伴脑疝
- B. 原发脑干损伤
- C. 硬膜外血肿伴脑疝

- D. 脑挫裂伤伴脑疝
 - E. 颅骨凹陷骨折伴脑疝
62. 脊髓损伤临床综合征中，常见于颈脊髓血管损伤。患者有可能可以步行，但上肢部分完全麻痹属于
- A. 半切综合征
 - B. 前束综合征
 - C. 后束综合征
 - D. 中央束综合征
 - E. 脊髓圆锥综合征
63. 以下脊髓损伤患者防治压疮措施中，错误的是
- A. 定期翻身，保持皮肤清洁
 - B. 经常查看和按摩受压皮肤
 - C. 坐轮椅时，采取良好的坐姿
 - D. 坐轮椅时，定时减压(2 小时 1 次)
 - E. 骨隆起处和易受压部位放置气圈和厚软垫
64. 脊髓前角病变产生
- A. 节段性痛觉和温度觉缺失
 - B. 霍纳征
 - C. 周围性瘫痪
 - D. 精细触觉障碍
 - E. 中枢性瘫痪
65. 关于脊髓灰质炎后遗症，下列哪项描述是不正确的
- A. 脊髓受累部位是脊髓前角运动神经元
 - B. 经一年治疗无效，即进入后遗症期
 - C. 临床查体时膝反射及跟腱反射亢进
 - D. 瘫痪肢体的运动代偿活动而产生肢体畸形
 - E. 后遗症期可借手术改善肢体功能
66. 关于周围神经损伤程度的描述不正确的是
- A. I 度损伤时传导阻滞，可在短时间内恢复
 - B. II 度损伤时轴突中断，但神经内膜管完整，可自行恢复
 - C. III 度损伤时神经纤维与束膜均横断，多为不完全恢复
 - D. V 度损伤时神经干完全断裂
 - E. IV 度损伤时神经束内的大部分或全部神经纤维受损，需手术修复
67. 男性患者，45 岁，患有右侧三叉神经痛，疼痛剧烈难忍，治疗方面首选
- A. B 族维生素
 - B. 卡马西平
 - C. 地塞米松
 - D. 神经生长因子
 - E. 辅酶 A
68. 帕金森病临床表现中，"肢体伸屈肌张力均增高，被动运动时有铅管样阻力感"属于
- A. "小写症"
 - B. "面具脸"
 - C. 静止性震颤
 - D. "慌张步态"

- E. 铅管样强直
69. 帕金森病诊断要点不包括
- A. 肌肉僵直
- B. 运动减少
- C. 进展迅速
- D. 静止性震颤
- E. 服用左旋多巴有效
70. 多发性硬化病理包括
- A. 大脑灰质最常受侵犯
- B. 多见于额颞叶
- C. 中枢神经系统内播散的脱髓鞘斑块
- D. 是一种中枢神经系统白质脱髓鞘性疾病
- E. 可能与感染人疱疹病毒或逆转录病毒有关
71. 老年性痴呆辅助检查不包括
- A. 脑脊液正常
- B. 脑电图特异改变
- C. CT 扫描显示脑室扩大
- D. CT 扫描显示皮质萎缩
- E. CT 扫描显示脑沟变宽
72. 下列可作为脊髓性肌萎缩区别于进行性肌营养不良的依据的是()。
- A. 四肢近端肌肉萎缩，对称性分布
- B. 肌束震颤
- C. 有家族史
- D. 血 CK 升高
- E. 鸭步步态
73. 下列症状不是颈内动脉系统 TIA 症状的是
- A. 跌倒发作
- B. 对侧单肢无力或轻偏瘫
- C. 主侧半球受累可出现失语症
- D. Homner 征交叉瘫(病变侧 Homner 征、对侧偏瘫)
- E. 眼动脉交叉瘫(病变侧单眼一过性黑矇，对侧偏瘫及感觉障碍)
74. 脑卒中各类型的诊断要点中，属于脑栓塞的是
- A. 常有头痛呕吐
- B. 必有头痛呕吐
- C. 可有头痛呕吐
- D. 腰穿脑脊液血性
- E. 腰穿脑脊液多含血，压力升高
75. 蛛网膜下腔出血叙述不正确的是
- A. 无局灶性神经体征
- B. 动静脉畸形是常见病因
- C. 血液直接流入蛛网膜下腔所致
- D. 脑底部动脉瘤或脑动静脉畸形破裂
- E. 突发剧烈头痛伴呕吐、颈项强直等脑膜刺激征
76. 某 65 岁男性患者，近 3 个月来发作性右上肢无力、麻木 4 次，每次历时 40 分钟左右。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807053042166006061>