

2023-24 年山西省汾西县《执业药师之西药学专业二》考试往年题考

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。
- A: 用药期间应定期检查空腹血糖、尿糖、尿酮体及肝、肾功能
B: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
C: 现有方案不存在低血糖的风险
D: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

答案：C

2. 长期用药易发生低镁血症的药物是（）
- A: 奥美拉唑
B: 替普瑞酮
C: 复方碳酸钙
D: 胶体果胶铋

答案：A

3. 仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是
- A: 四环素
B: 甲硝唑
C: 阿奇霉素
D: 链霉素

答案：A

4. 下列关于林旦的描述中，错误的是

- A: 不应与铁制品接触
- B: 涂药前勿用热水和肥皂洗澡
- C: 不应与碱性物质接触
- D: 不应与铜制品接触

答案：D

5. (2017 年真题) 降低同型半胱氨酸水平的是 ()

- A: 维生素 B2
- B: 叶酸
- C: 烟酸
- D: 泛酸钙

答案：B

6. 与体内过氧化物和自由基结合, 保护细胞中含巯基的蛋白质和酶, 参与多种有毒物质解毒反应的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 多烯磷脂酸胆碱
- C: 葡醛内酯
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

7. 碘化物的主要不良反应是

- A: 甲状腺素
- B: 粒细胞下降
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 血管神经性水肿

答案：D

8. 下列药物中通过促进纤维蛋白溶解的药物是

- A: 尿嘧啶
- B: 链激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 氨甲苯酸

答案：B

9. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是 ()。

- A: 伯氯喹
- B: 氯喹
- C: 青蒿素
- D: 奎宁

答案：C

10. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 万古霉素
- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 林可霉素

答案：A

11. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 奥美拉唑
- B: 艾司奥美拉唑
- C: 兰索拉唑

D: 右兰索拉唑

答案: D

12. 尤其适用于伴有精神症状的儿童癫痫患者的是

A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 乙琥胺

D: 卡马西平

答案: D

13. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是()。

A: 对乙酰氨基酚

B: 吲哚美辛

C: 阿司匹林

D: 罗非昔布

答案: A

14. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

A: 呋麻滴鼻液

B: 麻黄碱滴鼻液

C: 羟甲唑啉鼻喷剂

D: 赛洛唑啉滴鼻液

答案: A

15. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A: 格列美脲

B: 沙格列汀

C: 瑞格列奈

D: 罗格列酮

答案: D

16. 可增加肝毒性的药物是

A: 利福平

B: 阿糖胞苷

C: β 受体阻断剂

D: 甲氨蝶呤

答案: A

17. 抗真菌作用最强的是

A: 两性霉素 B

B: 阿奇霉素

C: 链霉素

D: 甲硝唑

答案: A

18. 临床上可取代林可霉素应用的是

A: 克林霉素

B: 红霉素

C: 罗红霉素

D: 克拉霉素

答案: A

19. 主要用于肺炎支原体、衣原体、立克次体及螺旋体（四体）感染的药物是

A: 头孢米诺

B: 红霉素

C: 阿奇霉素

D: 四环素

答案: D

20. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

A: 美罗培南

B: 克拉维酸

C: 氨曲南

D: 他唑巴坦

答案: C

21. 与顺铂合用，致高尿酸血症的药物是

A: 苯海拉明

B: 丙磺舒

C: 甲氨蝶呤

D: 呋塞米

答案: B

22. 泛昔洛韦口服后代谢为

A: 西多福韦

B: 喷昔洛韦

C: 阿昔洛韦

D: 更昔洛韦

答案: B

23. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 抑制 H
- B: 保护胃黏膜
- C: 中和胃酸
- D: 阻断组胺 H

答案：D

24. 预防急性肾功能衰竭

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

25. 左氧氟沙星用于治疗()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 鼠疫、土拉菌病
- C: 布鲁菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：D

26. 对肾功能影响较小的抗高血压药是()

- A: 肼屈嗪
- B: 利血平

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 卡托普利

D: 胍乙啶

答案：A

27. 属于促性腺激素释放激素类似物的是()

- A: 普拉睾酮
- B: 米非司酮
- C: 戈那瑞林
- D: 达那唑

答案：C

28. 呋塞米的利尿作用部位在()

- A: 集合管
- B: 远曲小管初段
- C: 髓袢升支粗段
- D: 肾小球

答案：C

29. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 血管神经性水肿

答案：A

30. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 氯化钾、葡萄糖注射液
- B: 利尿剂
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：A

31. 一般剂量长期疗法

A: 变态反应性疾病

B: 湿疹

C: 中毒性感染和休克

D: 顽固性支气管哮喘

答案：D

32. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 右雷佐生月德

B: 柔红霉素

C: 阿糖胞苷

D: 甲氨蝶呤

答案：B

33. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴生杆菌感染的药物是()

A: 头孢米诺

B: 头孢唑林

C: 头孢他啶

D: 头孢呋辛

答案：A

34. 地西洋用于

A: 慢性脑功能不全

B: 早期帕金森病

C: 神经源性尿崩症

D: 特发性震颤

答案：D

35. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 利福平

答案：B

36. 抑制血管紧张素转化酶的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 米力农
- C: 卡托普利
- D: 氯沙坦

答案：C

37. 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

- A: 辛伐他汀
- B: 二甲双胍
- C: 阿司匹林
- D: 米氮平

答案：D

38. 能选择性地兴奋子宫平滑肌，使其产生节律性收缩，并软化和扩张子宫颈，促使宫口开全和胎儿娩出，临床用于中期引产、足月妊娠引产及治疗性流产的药物是

- A: 普拉睾酮
- B: 麦角新碱
- C: 缩宫素
- D: 地诺前列酮

答案: D

39. 6~12 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: $4\text{ }\mu\text{g} / \text{kg}$
- B: $6\text{ }\mu\text{g} / \text{kg}$
- C: $5\text{ }\mu\text{g} / \text{kg}$
- D: $25\text{ }\mu\text{g}$

答案: A

40. 四环素类首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 布鲁菌病
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案: B

41. 竞争性抑制胃肠道的 α 葡萄糖苷酶活性, 减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收, 可降低餐后血糖的药物是 ()

- A: 二甲双胍
- B: 格列吡嗪
- C: 伏格列波糖
- D: 吡格列酮

答案: C

42. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

- A: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- B: 洋地黄毒苷
- C: 地高辛
- D: 毛花苷丙（西地兰 C）

答案：B

43. 主要降三酰甘油的药物的是

- A: 阿昔莫司
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 胍乙啶

答案：A

44. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 胺碘酮

答案：A

45. 体内多种组织器官可发生结核分枝杆菌感染，其中以()最常见。

- A: 肺结核
- B: 肠结核
- C: 肾结核
- D: 结核性脑膜炎

答案：A

46. 可使维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 丙磺舒
- C: 雌激素
- D: 糖皮质激素

答案：C

47. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药
- B: 本品与芬太尼可交叉过敏
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品

答案：D

48. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- B: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次
- C: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- D: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

答案：A

49. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种 β 肾上腺素受体阻断药，应选用

- A: 纳多洛尔
- B: 美托洛尔

C: 普萘洛尔

D: 吲哚洛尔

答案: B

50. 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是

A: 法莫替丁

B: 氯苯那敏

C: 多潘立酮

D: 奥美拉唑

答案: C

51. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ()

A: 艾司西酞普兰

B: 文拉法辛

C: 吗氯贝胺

D: 马普替林

答案: B

52. 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

A: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

D: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生

答案: A

53. 西地那非引起的不良反应有

- A: 嗜睡乏力
- B: 出血
- C: 视觉异常
- D: 低血糖

答案：C

54. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 对严重的银屑病效果显著
- B: 成人每晚(睡前半小时)1次，一般12周，使用面积应不超过20%体表面积
- C: 不用于18岁以下银屑病患者
- D: 育龄期妇女用药前2周，应进行血清或尿液妊娠试验

答案：A

55. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 舍尼通
- B: 多沙唑嗪
- C: 十一酸睾酮
- D: 非那雄胺

答案：C

56. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 胆绞痛
- B: 躁狂
- C: 便秘
- D: 低血压

答案：D

57. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨基己酸
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 维生素 K

答案: A

58. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 他莫昔芬
- C: 阿那曲唑
- D: 丙酸睾酮

答案: C

59. 患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21次，BP110/70mmHg，HR110次/分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0.59，每6小时一次。

- A: 氟康唑可使华法林代谢加快
- B: 氟康唑抑制卡马西平代谢
- C: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖
- D: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿

答案: A

60. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是

- A: 吉西他滨
- B: 长春瑞滨
- C: 甲氨蝶呤
- D: 巯嘌呤

答案：A

61. 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 布美他尼
- C: 依他尼酸
- D: 托拉塞米

答案：C

62. 在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

- A: 罗格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 达格列净
- D: 吡格列酮

答案：B

63. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

- A: 青霉素
- B: 多西环素
- C: 氯霉素
- D: 四环素

答案：C

64. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

- A: 复方氨基酸注射液(18AA)
- B: 精氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 赖氨酸

答案：C

65. 氨曲南的作用特点不包括

- A: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏
- B: 可用于治疗脑膜炎
- C: 血浆半衰期较短
- D: 时间依赖性抗菌药物

答案：B

66. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因
- C: 奎尼丁
- D: 苯妥英钠

答案：A

67. 患者女，59岁，既往高脂血症病史5年，心功能Ⅱ级。因发现血压升高7天入院。入院查体血压172/95mmHg，心率62次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 美托洛尔
- B: 双氯芬酸
- C: 氢氯噻嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：C

68. 属于还原酶抑制剂的是()

- A: 他达拉非
- B: 西地那非
- C: 度他雄胺
- D: 坦洛新

答案: C

69. (2019 年真题) 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是()

- A: 葡醛内酯
- B: 甘草酸二铵
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 多烯磷脂酸胆碱

答案: D

70. (2016 年真题) 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

- A: 替考拉宁
- B: 利福平
- C: 磷霉素
- D: 舒巴坦

答案: B

71. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜首选

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 普通胰岛素
- D: 格列喹酮

答案：B

72. 主要作用于 S 期的抗肿瘤药物是

- A: 抗代谢药
- B: 抗癌抗生素
- C: 长春碱类
- D: 烷化剂

答案：A

73. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 用药期间不宜饮酒
- B: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- C: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用
- D: 兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩

答案：B

74. （2021 年真题）抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是（）

- A: 尿激酶
- B: 瑞替普酶
- C: 替奈普酶
- D: 重组链激酶

答案：D

75. 可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

- A: 泛酸钙
- B: 烟酸
- C: 维生素 B
- D: 叶酸

答案：D

76. (2019 年真题) 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 呋喃妥因
- B: 庆大霉素
- C: 苄星青霉素
- D: 甲硝唑

答案：C

77. 强效 (使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$) 的他汀类调血脂药

- A: 大剂量阿托伐他汀
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 小剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

78. 联用治疗细菌性心内膜炎的是 ()

- A: 链霉素和磺胺嘧啶
- B: 链霉素和异烟肼
- C: 青霉素和磺胺嘧啶
- D: 青霉素和链霉素

答案：D

79. 伊曲康唑属于

- A: 吗啉类
- B: 丙烯胺类
- C: 抗生素类
- D: 唑类

答案：D

80. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

- A: 丝虫
- B: 血吸虫
- C: 牛肉绦虫
- D: 蛔虫

答案：B

81. (2018 年真题) 可用于急、慢性肾功能不全患者的肠外营养支持的氨基酸是 ()

- A: 复方氨基酸注射液 (3AA)
- B: 精氨酸注射液
- C: 复方氨基酸注射液 (9AA)
- D: 复方氨基酸注射液 (18AA)

答案：C

82. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

- A: 胰岛素
- B: 氢氧化镁
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：D

83. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是 ()

- A: 胺碘酮
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠

D: 地高辛

答案: C

84. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 枸橼酸钾

B: 氯化钠

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案: B

85. (2017 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()

A: 氯霉素滴眼剂

B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 托吡卡胺滴眼剂

答案: B

86. 阻断 H

A: 氢氧化铝

B: 哌仑西平

C: 雷尼替丁

D: 奥美拉唑

答案: C

87. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 硝酸异山梨酯

B: 硝酸甘油

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 戊四醇酯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/807131164056010024>