

2022~2023 初级护师考试题库及答案

1. 小脑幕切迹疝与枕骨大孔疝的临床表现不同的是

- A. 头痛剧烈
- B. 呕吐频繁
- C. 意识障碍出现较早
- D. 血压升高，脉缓有力
- E. 呼吸骤停出现的时间不同

正确答案：

D

2. 诊断慢性胃炎最可靠的辅助检查是

- A. 胃液分析
- B. 胃镜检查
- C. 血清学检查
- D. X 线钡餐检查
- E. 幽门螺杆菌检测

正确答案：

B

3. 对低钾患者静脉补钾，最重要的参考指标是

- A. 给药速度
- B. 药液浓度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 患者精神状态

正确答案：

C

4. 小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉，局部可表现为

- A. 无大变化
- B. 充血、发绀
- C. 条索状红线
- D. 苍白、水肿
- E. 呈树枝分布状苍白

正确答案：

E

5. 内科护理健康教育的主要目的是

- A. 指导饮食增进食欲
- B. 树立健康意识消除危险因素
- C. 指导体育锻炼增强体质
- D. 树立信心配合治疗
- E. 合理用药防止复发

正确答案：

B

6. 窦性心动过缓不发生于何类患者

- A. 病态窦房结综合征
- B. 甲状腺机能亢进症
- C. 运动员
- D. 洋地黄中毒
- E. 甲状腺机能减退症

正确答案：

B

7. 试管婴儿是指

- A. 人工授精 (AI)
- B. 体外授精与胚胎移植 (IVFET)
- C. 配子输卵管内移植 (GIFT)
- D. 配子宫腔内移植 (GIUT)
- E. 配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

正确答案：

B

8. 不属于医院感染的是

- A. 新生儿经胎盘获得的感染
- B. 护理“非典”患者时护士获得的感染
- C. 新生儿脐带发炎
- D. 患者住院第 10 天后出现上呼吸道感染
- E. 住院患者导尿后发生泌尿系感染

正确答案：

A

9. 患者女，2 岁。发热、盗汗，食欲不振、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影，结核菌素试验阳性。该患儿正确的诊断是

- A. 浸润性肺结核
- B. 急性粟粒型肺结核
- C. 支气管淋巴结核
- D. 原发性肺结核
- E. 结核性胸膜炎

正确答案：

B

10. 腹膜炎术后半卧位的目的不包括

- A. 有利于脓液局限盆腔
- B. 有利于改善呼吸和循环
- C. 有利于恢复肠蠕动
- D. 减轻中毒症状
- E. 防止膈下感染

正确答案：

C

11. 体温降低见于

- A. 无菌性炎症
- B. 大量失血
- C. 组织破坏
- D. 恶性肿瘤
- E. 免疫反应

正确答案：

B

12. 患者，男，40岁。因车祸导致脑外伤，出现昏迷。为保证营养的供给，需要长期鼻饲，取去枕平卧位，准备接受插胃管。为其插胃管至15cm时，应采取的护理措施是

- A. 使患者头后仰便于胃管插入
- B. 让患者取右侧卧位使插管顺利
- C. 将患者头托起，使下颌骨靠近胸骨柄
- D. 将病床床头摇起，使患者呈半坐卧位
- E. 使患者头偏向护士一侧方便胃管插入

正确答案：

C

13. 细菌性肝脓肿患者术后拔除引流管的指征是每日引流液应少于

- A. 5ml
- B. 10ml
- C. 15ml
- D. 20ml
- E. 25ml

正确答案：

B

14. 下列哪项是缺铁性贫血表现

- A. 牙龈出血
- B. 发热伴大量出汗
- C. 骨骼疏松
- D. 毛发无光泽及“反甲水肿
- E. 皮肤紫癜

正确答案：

D

15. 使用冰帽物理降温，肛温不得低于

- A. 37°C
- B. 36°C
- C. 35°C
- D. 33°C
- E. 30°C

正确答案：

D

16. 心跳呼吸骤停复苏成功后，观察期间应使

- A. 血压维持略高水平，不必吸氧
- B. 血压维持略高水平，常规吸氧
- C. 血压维持略低水平，不必吸氧
- D. 血压维持略低水平，常规吸氧
- E. 血压不考虑，常规吸氧

正确答案：

B

17. 尿毒症病人饮食护理正确的是

- A. 忌盐
- B. 限水
- C. 限钾
- D. 低热量
- E. 补钙

正确答案：

E

18. 患者女，24岁。长期口角糜烂，最可能缺乏的营养素是

- A. 维生素 1
- B. 维生素 2
- C. 维生素 6
- D. 维生素 12
- E. 维生素 PP

正确答案：

B

19. 使用双气囊三腔管时，正确的护理措施是

- A. 先向食道囊注气，再向胃囊注气
- B. 食道囊和胃囊各注气约 30ml
- C. 置管期间每隔 12 小时放气 1 次
- D. 出血停止后即可拔管
- E. 拔管后 24 小时仍需严密观察

正确答案：

E

20. 属于肿瘤二级措施是

- A. 环境保护
- B. 积极治疗癌前病变
- C. 手术
- D. 放疗
- E. 化疗

正确答案：

B

21. 小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉，局部可表现为

- A. 无大变化
- B. 充血、发绀
- C. 条索状红线
- D. 苍白、水肿
- E. 呈树枝分布状苍白

正确答案：

E

22. 腹部损伤患者为尽早明确诊断，错误的治疗是

- A. 不随便拖动患者
- B. 积极补充血容量
- C. 剧烈疼痛时，可注射镇痛药
- D. 应用广谱抗生素
- E. 禁食

正确答案：

C

23. 柏油样大便见于

- A. 十二指肠溃疡出血
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 痢疾
- D. 结肠癌
- E. 胃穿孔

正确答案：

A

24. 甲状腺次全切除后并发症可有

- A. 呼吸困难和窒息
- B. 误咽、呛咳
- C. 声音嘶哑
- D. 甲状腺危象
- E. 手足抽搐

正确答案：

ABCDE

25. 关于医院的任务， 错误的是

- A. 指导基层和计划生育的技术工作
- B. 证教学和科研 任务的完成
- C. 以医疗为中心
- D. 做好扩大预防
- E. 以科研为主

正确答案：

E

26. 下列胎儿窘迫的护理措施， 哪项不对

- A. 取左侧卧位
- B. 产妇吸氧
- C. 二联药物
- D. 静滴催产素，加速产程
- E. 及时 处理胎儿窘迫，可避免新生儿窒息

正确答案：

D

27. 肛管周围脓肿是指

- A. 内痔合并感染所形成的脓肿
- B. 外痔合并感染所形成的脓肿
- C. 直肠膀胱陷窝的脓肿
- D. 肛门旁粉瘤感染所形成的脓肿
- E. 肛管直肠周围脓肿间隙感染所形成的脓肿

正确答案：

E

28. 患者男，44 岁。因食入烙饼，食管静脉破裂出血约 1000ml。输入大量库存血后，出现心率缓慢，手足搐搦，血压下降、伤口渗血，出现以上症状的有关因素是

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

正确答案：

D

29. 患儿，8 个月，因腹泻就诊。 体检：体温 37.8 °C，皮肤弹性好，臀部皮肤潮红，有表皮脱落，其最主要的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 体液不足
- C. 有感染的危险
- D. 皮肤完整性受损
- E. 有营养不足 的危险

正确答案：

D

30. 患者女，51 岁，尿频 2 个月余，今日出现尿频加重伴尿急尿痛，有米汤样尿液和血尿史，曾用抗生素治疗无好转，尿液检查：尿呈酸性，伴有脓细胞；连查三次晨尿结核菌均为阳性。X 线示左肾钙化；逆行肾盂造影示左肾肾盏、肾盂不规则扩大，变形，有空洞形成，右侧肾脏无异常，口服抗结核药物 3 周后，经充分术前准备，行左肾切除术，术后护理错误的是

- A. 继续口服抗结核药物 1 个月
- B. 卧床 7-14 天 后，减少运动
- C. 连续 3 天准确记录 24 小时尿量
- D. 观察第一次排尿的时间、尿量及颜色
- E. 保持 引流通畅，观察引流液的性质及量

正确答案：

A

31. 肋骨骨折好发于

- A. 1-3 肋
- B. 4-7 肋
- C. 8-9 肋
- D. 10-12 肋
- E. 位置不固定

正确答案:

B

32. 瞳孔散大的标准是瞳孔直径

- A. $<2\text{mm}$
- B. $2 \sim 3\text{mm}$
- C. $3 \sim 4\text{mm}$
- D. $4 \sim 5\text{mm}$
- E. $>5\text{mm}$

正确答案:

E

33. 治疗癔症最重要的方法是

- A. 镇静治疗
- B. 针灸治疗
- C. 暗示疗法
- D. 中医中药治疗
- E. 心理加药物治疗

正确答案:

E

34. 试管婴儿是指

- A. 人工授精 (AI)
- B. 体外授精与胚胎移植 (IVFET)
- C. 配子输卵管内移植 (GIFT)
- D. 配子宫腔内移植 (GIUT)
- E. 配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

正确答案:

B

35. 阻塞性肺气肿的并发症不包括

- A. 自发性胸腔
- B. 肺部急性感染
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 呼吸衰竭
- E. 急性左心衰竭

正确答案:

E

36. 可出现尿频、尿急、尿痛症状的患者是

- A. 膀胱造瘘
- B. 妊娠压迫
- C. 膀胱炎症
- D. 膀胱结核
- E. 急性肾炎

正确答案:

C

37. 可用于病情较重, 氧分压明显下降者的吸氧方法是()

- A. 鼻导管法
- B. 鼻塞法
- C. 面罩法
- D. 头罩法
- E. 氧气枕法

正确答案:

C

38. 慢性肾衰竭患者发生贫血的主要原因是

- A. 铁缺乏
- B. 肾脏产生红细胞生成素减少
- C. 叶酸缺乏
- D. 代谢产物抑制骨髓造血
- E. 红细胞寿命缩短

正确答案:

B

39. 根据自理模式理论, 对昏迷患者进行护理时应采用

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

正确答案:

A

40. 在建立护患关系初期, 护患关系发展的主要任务是

- A. 对病人收集资料
- B. 确定病人的健康问题
- C. 为病人制定护理计划
- D. 与病人建立信任关系
- E. 为病人解决健康问题

正确答案:

A

41. 孕妇, 尿潴留, 护士准备为其行导尿术。下列操作欠妥的是

- A. 戴口罩，帽子并清洗双手
- B. 关闭门窗，保护患者隐私
- C. 将无菌与非无菌物品分别放置
- D. 检查导尿包的名称及灭菌日期
- E. 用无菌持物镊夹取棉球消毒外阴

正确答案：

E

42. 引起患者不舒适的最高表现形式是

- A. 烦躁不安
- B. 睡眠不佳
- C. 萎靡不振
- D. 疼痛
- E. 疲乏

正确答案：

D

43. 右心衰与肝硬化水肿的鉴别要点是

- A. 下肢浮肿
- B. 中心静脉压增高
- C. 腹水形成
- D. 肝肿大
- E. 体重增加

正确答案：

B

44. 患者男，58岁，长期卧床。护士为预防其发生便秘而制定如下护理计划，其中不妥的措施是

- A. 每天液体摄入量不少于 2000ml
- B. 排便时可抬高床头
- C. 禁用油脂类食物
- D. 排便时可配合做腹部按摩
- E. 如需泻药应选择作用缓和的药物

正确答案：

C

45. 护士对患者进行病情观察的最佳途径是

- A. 进行交换班时
- B. 通过阅读病历
- C. 与患者日常接触中
- D. 加强医护间的联系
- E. 经常查看护理记录

正确答案：

C

46. 判断抗精神病药物是否有效需足量使用至少

- A. 2 周
- B. 3 周

C. 4 周

D. 5 周

E. 6 周

正确答案：

E

47. 慢性肾衰竭患者发生贫血的主要原因是

A. 铁缺乏

B. 肾脏产生红细胞生成素减少

C. 叶酸缺乏

D. 代谢产物抑制骨髓造血

E. 红细胞寿命缩短

正确答案：

B

48. 肾脏的结核感染主要来自于

A. 肺结核

B. 肠结核

C. 骨结核

D. 脑结核

E. 淋巴结核

正确答案：

A

49. 尿毒症病人纠正酸中毒后发生抽搐的主要原因是

A. 血浆白蛋白降低

B. 血磷增高

C. 血游离钙降低

D. 血结合钙降低

E. 血非蛋白氮增高

正确答案：

C

50. 吃腌制食物与肝癌发病有一定的关系，是因为腌制食物中含有

A. 亚硝酸盐

B. 黄曲霉素

C. 偶氮苯类物质

D. 较高的铁

E. 较高的苯

正确答案：

A

51. 医院内工作人员做到“四轻”，是为了给病人

A. 创造良好的社会环境

B. 创造安静的环境

C. 建立良好的护患关系

D. 创造安全的环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807201115026006040>