卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷47)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]街道卫生院、工厂保健站属于城市三级预防保健服务的
A)第三级机构
B)第二级机构
C)不属于三级预防保健服务机构
D)第一级机构

2.[单选题]冠心病的危险因素是()
A)高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、肥胖等
B)高血红蛋白、高尿蛋白、高尿糖等
C)肥胖、吃盐过多、精神紧张等
D)贫血或血液浓度过高

3.[单选题]男性，35岁，口渴、多饮、多尿、消瘦1个月，查空腹血糖18 mmol/L，尿糖（++++），酮体（+），其母患糖尿病5年，查体：身高167 cm，体重75kg，心、肺、腹（-）根据该病人情况，最好的治疗是
A)短效胰岛素3次+中效胰岛素
B)中长效胰岛素+磺脲类口服降糖药
C)磺脲类口服降糖药+双胍类口服降糖药
D)磺脲类口服降糖药+葡萄糖苷酶抑制剂
E)短、中效混合胰岛素30R+双胍类口服降糖药

4.[单选题]胃穿孔的特征性X线表现是
A)胃泡增大
B)肠管膨胀
C)膈肌升高
D)气液平面
E)膈下游离气体

5.[单选题]女性，33岁，既往体健。多尿，口渴多饮2周，每日饮水约6~7L。尿比重1.000，禁尿12h后尿比重1.006，皮下注射血管升压素5u，2h尿量无明显减少，尿比重1.008，尿渗透压为200mOsm/kgH2O，考虑诊断为
A)肾性尿崩症
B)垂体功能减退
C)肾上腺皮质功能减退
D)中枢性尿崩症
E)部分性尿崩症

6.[单选题]女，49岁。干咳两个月，近2周左侧胸痛、气急、胸闷。胸片示左上叶前段2×2.5cm块影，边缘短毛刺，肺门增大，左侧胸腔积液。？
A)肺鳞癌
B)肺小细胞未分化癌

C)肺腺癌
D)肺泡细胞癌
E)肺大细胞未分化癌

7.[单选题]甲状腺机能亢进症危象的最主要临床表现是：
A)心率＞160次/min、体温＞39℃、腹泻
B)心率加快、血压高、头晕、头痛
C)心悸、气促、呕吐、腹泻
D)发绀、鼻翼扇动、心悸、出汗
E)面色苍白、四肢厥冷、呼吸困难

8.[单选题]结肠癌出现肠梗阻多表现为
A)完全性肠梗阻
B)急性肠梗阻
C)慢性不完全性肠梗阻
D)高位梗阻
E)麻痹性梗阻

9.[单选题]30岁男性患者，发热，咽痛5天。恶心、呕吐，少尿，厌食，头晕2天，血压180／1 00mmHg,血肌酐984μmol／L，血红蛋白65g／L，血糖5．1 mmol／L，B超示两肾缩小，最合适的诊断是：
A)急性肾衰竭
B)急性肾小球肾炎
C)急进性肾小球肾炎
D)慢性肾衰竭尿毒症期
E)以上都不是

10.[单选题]某严重创伤病人使用琥珀胆碱后发生心跳骤停最可能的原因是
A)低血压
B)高钾
C)低钠
D)酸中毒
E)颅内压升高

11.[单选题]化疗过程中最严重和最常见的副反应是
A)骨髓抑制
B)消化道反应
C)脱毛
D)肝功能损伤
E)肾功能损伤

12.[单选题]硝酸甘油治疗心绞痛的机理：
A)扩张冠状动脉，减轻心脏的前后负荷和心肌耗氧
B)减慢心率
C)抑制血小板聚集
D)降低心肌痛阈
E)溶解血栓

13.[单选题]一个病人被铁钉扎伤脚部，当时未进行医疗处理。七天后出现张嘴困难。并逐渐出现抽搐。破伤风最早出现并有诊断意义的症状是.
A)苦笑面容
B)张口困难

C)角弓反张
D)腹肌紧张
E)颈项强直

14.[单选题]以下哪项不是输血的适应证：
A)成人一次失血量低于全身总血容量的10%
B)成人一次失血量大于全身总血容量的30%
C)贫血或低蛋白血症
D)重症感染
E)凝血机制障碍

15.[单选题]重度哮喘的处理不包括
A)补液
B)吸氧
C)静点氨茶碱
D)注射毛花苷丙
E)给予糖皮质激素

16.[单选题]急性肾盂肾炎是：
A)纤维素性炎
B)变态反应性炎
C)变质性炎
D)化脓性炎
E)增生性炎

17.[单选题]急性坏死性小肠结肠炎的表现有
A)病变的结肠为主
B)常以急性腹痛起病
C)腹泻开始为红色果酱样便
D)全身感染中毒症状较轻
E)可触及固定压痛

18.[单选题]男性，45岁急性昏迷轻度黄疸，双侧肢体肌张力对称性增高，瞳孔等大，尿蛋白以及糖定性均阴性，尿酮体阴性最合适的诊断是
A)肝性昏迷
B)脑血管意外
C)脑炎
D)尿毒症
E)糖尿病昏迷

19.[单选题]患者，男，65岁，心前区压榨样疼痛6h，伴气喘咳嗽，咳白色泡沫样痰。体检：BP 160/100mmHg，双肺满布湿性啰音，HR110次/分律齐。心电图：I.aVL.V1-V6 ST段弓背向上抬高。该患者诊断为：
A)急性冠脉综合症
B)急性前壁心肌梗死
C)急性前间壁心肌梗死
D)急性广泛前壁高侧壁后壁心肌梗死
E)急性广泛前壁高侧壁心肌梗死

20.[单选题]在人际交往中，正确的做法是注重对方的
A)外貌
B)背景

C)过去表现
D)当前表现
E)一贯表现

21.[单选题]患者，男，5岁。烧伤总面积为30%(Ⅱ度)，其烧伤严重程度为( )
A)轻度
B)重度
C)中度
D)深度
E)特重度

22.[单选题]有关输血技术的叙述，以下哪项不正确：
A)常规采用中心静脉穿刺置管输血
B)急性大量失血，血压极低，而静脉输血困难者可经动脉输血
C)血液输入病人体内前要过滤
D)输血速度因病情而定
E)输血后血袋应保留2小时左右以备化验检查用

23.[单选题]胃溃疡疼痛出现的时间多为
A)餐后30分钟
B)餐后3～4小时
C)睡前
D)半夜
E)餐前30分钟

24.[单选题]下列不属于社区护理计划构成要素的是
A)选择良好的计划环境
B)确定护理诊断的排列顺序
C)制定护理目标
D)拟定适当的护理措施
E)书写护理计划

25.[单选题]《中华人民共和国献血法》规定，我国现行的献血制度是
A)自愿献血制度
B)法定献血制度
C)无偿献血制度
D)有偿献血制度
E)强制献血制度

26.[单选题]根据腹泻的机制将腹泻分成几种类型，下列哪项不是：
A)分泌性
B)渗出性
C)渗透性
D)感染性
E)肠道功能异常

27.[单选题]抗休克纠正组织低灌注和缺氧的关键是
A)积极治疗原发病
B)纠正酸中毒
C)补充血容量
D)应用血管扩张剂改善微循环

E)抗凝治疗解除微细血栓

28.[单选题]新生儿败血症常见的并发症是（ ）
A)肺炎
B)化脓性脑膜炎
C)肾炎
D)化脓性骨髓炎
E)中耳炎3

29.[单选题]脑挫伤引起：
A)一过性昏迷
B)去大脑强直
C)神清，脑脊液耳漏
D)有昏迷史，左侧肢体偏瘫
E)昏迷一侧瞳孔散大，对侧肢体偏瘫

30.[单选题]体重超标准者每天胆固醇不宜超过：
A)500mg
B)1000mg
C)300mg
D)400mg
E)200mg

31.[单选题]脾破裂患者行脾切除术后伤口裂开，再次缝合后瘢痕愈合，该类切口分类及愈合记录为：
A)Ⅰ/甲
B)Ⅱ/甲
C)Ⅱ/乙
D)Ⅰ/乙
E)Ⅱ/丙

32.[单选题]女性，35岁，过去有肺结核史，近两月咳嗽，无痰，少量间断咯血，乏力，胸片未见活动性结核病变，但痰结核菌两次（+），进一步应首先检查。
A)胸CT
B)血沉
C)纤维支气管镜
D)结核菌素试验
E)痰脱落细胞

33.[单选题]骨盆人口平面与地平面所成的角度一般为
A)45°
B)50°
C)55°
D)60°
E)65°

34.[单选题]测定24小时尿蛋白定量，尿标本中应加人防腐剂( )
A)碳酸
B)高锰酸钾
C)甲醛
D)浓盐酸
E)甲苯

35.[单选题]龋齿患者出现( )
A)牙齿过早脱落
B)咀嚼器官的功能及完整性丧失
C)牙齿色、形质无变化
D)不影响身体健康
E)牙髓质逐渐破坏

36.[单选题]引起急性胆囊炎最主要的病因是:
A)胆囊内蛔虫
B)严重创伤的应激
C)胆囊结石
D)胆囊扭转
E)胆囊管狭窄

37.[单选题]Ⅱ度呼吸困难是指
A)跑步时感到气急
B)上楼时感到气急
C)一般速度步行感到气急
D)穿衣、说话时感到气急
E)静息时感到气急

38.[单选题]属于肩周炎的诊断依据的是:
A)男性多于女性
B)右侧多于左侧
C)肩部疼痛，与动作无关
D)肩关节外展，外旋。后伸受限
E)肩部三角肌无萎缩

39.[单选题]桡神经臂部损伤将出现:
A)垂腕畸形
B)拇指对掌功能障碍
C)爪形手
D)翼状肩畸形
E)三角肌麻痹

40.[单选题]慢性胃炎的主要病因是
A)药物
B)食物
C)胆汁反流
D)幽门螺杆菌
E)物理因素

41.[单选题]孕38周，先兆子痫血压20/19Kpa，蛋白（++），比重1.024,Hb12g%。红细胞压积４０%，宫底剑下２+横指，左枕前位，半固定，胎心及骨盆正常，宫口未开，此时选用下列何处理恰当:
A)剖宫产
B)硫酸镁解痉加扩容治疗
C)大量利尿剂
D)催产素静滴引产
E)大量降压药

42.[单选题]亚急性感染性心内膜炎，最常发生于:
A)先天性心血管病
B)风湿性心瓣膜病
C)心脏手术后
D)梅毒性心脏病
E)正常心脏

43.[单选题]男性，35岁，高热，皮肤瘙痒半月，有颈部及锁骨上窝淋巴结肿大，无压痛，互相粘连，血红蛋白90g/L,白细胞10×109/L中性粒细胞0.66，淋巴0.24，骨髓涂片中找到里斯氏细胞最大可能诊断是
A)淋巴结炎
B)慢性淋巴细胞白血病
C)转移癌
D)淋巴瘤
E)风湿性疾病

44.[单选题]婴幼儿腹部包块多见于
A)肾癌
B)肾盂癌
C)肾下垂
D)多囊肾
E)肾胚胎癌

45.[单选题]腹部包块出现最早，生长迅速的是
A)肾癌
B)肾盂癌
C)多囊肾
D)肾盂积水
E)肾胚胎瘤

46.[单选题]关于股骨干骨折的解剖概要诉述错误的是:
A)股骨干是指转子下至股骨髁上
B)股骨干有向前外的成角
C)股骨干的营养血管来自股深动脉
D)股后部肌肉附着与股骨脊
E)全股骨的抗弯性较铸铁相近，弹性较铸铁稍差

47.[单选题]急性排斥反应多出现在移植后
A)24小时内
B)2～3天内
C)1个月内
D)1～2个月内
E)1～2年内

48.[单选题]关于孕妇灌肠的禁忌证，下列哪项是错误的（ ）
A)阴道出血，胎膜破裂，先露未衔接
B)臀先露、肩先露
C)估计1小时内结束分娩
D)枕横位及枕后位
E)严重妊娠中毒症及心脏病

49.[单选题]颅内动脉瘤最常见的是

A)前交通动脉瘤
B)大脑中动脉动脉瘤
C)基底动脉动脉瘤
D)颈内动脉系动脉瘤
E)前床突旁动脉瘤

50.[单选题]女性，58岁，2型糖尿病15年，长期口服格列本脲，10mg／日。查体：血压145／90mmHg，心．肺和腹部检查未见异常，双下肢无水肿。眼底检查：视网膜病变Ⅲ期。空腹血糖6．8mmol／L，餐后2小时血糖10．6mmol／L，血尿素氮6．2mmol／L，血肌酐92．8mmol／L。尿常规检查尿糖50mmol／L，蛋白阴性。经检查为糖尿病早期肾病，治疗应首选
A)利尿剂
B)血管紧张素转换酶抑制剂
C)α受体阻滞剂
D)β受体阻滞剂
E)钙通道阻滞剂

51.[单选题]未经治疗的苯丙酮尿症患儿，智能发育落后的症状一般出现在生后
A)1～2个月左右
B)3～6个月左右
C)6～7个月左右
D)8～10个月左右
E)10个月以上

52.[单选题]鉴别各型苯丙酮尿症
A)Guthrie细菌生长抑制试验
B)尿三氯化铁试验
C)血浆氨基酸分析
D)尿喋呤分析
E)DNA分析

53.[单选题]32岁女性，孕2产1，接触性出血3次，检查：宫颈光，大小正常，活动好，附件（-），下列哪项检查不必要：
A)宫颈涂片
B)阴道镜检查
C)宫颈及颈管活检
D)腹腔镜检查
E)碘实验

54.[单选题]“新型冠状病毒感染的肺炎”发病到入院的中位时间是（ ）。
A)5天
B)7天
C)9天
D)11天
E)15天

55.[单选题]胃镜检查术后护理措施不妥的是
A)术后禁食1天，防止胃扩张
B)嘱患者不要用力咳嗽
C)术后可按摩腹部，减轻腹胀
D)不要吞唾液，以免呛咳
E)检查后可出现咽痛等症状，嘱患者不要紧张

56.[单选题]下列亚急性细菌性心内膜炎的抗生素治疗中，不对的是
A)早期应用
B)小剂量，长程治疗
C)加用小剂量氨基糖苷类抗生素，以发挥协同杀菌作用
D)急性者应用针对金葡菌，链球菌和革兰阴性杆菌的广谱抗菌治疗
E)亚急性者采用针对包括肠球菌在内的链球菌的抗生素

57.[单选题]输血过程中发生溶血反应，尿少，应选用：
A)肾上腺素
B)强心、利尿剂
C)5%碳酸氢钠溶液、利尿剂
D)气管切开
E)降温

58.[单选题]乳管内乳头状瘤的好发部位在：
A)乳头
B)乳窦
C)乳管近开口
D)乳管远开口
E)乳腺小叶

59.[单选题]小脑病变引起
A)癫痫偏身感觉障碍
B)运动性失语，精神症状，偏瘫
C)感觉性失语
D)共济失调，步态异常，眼震
E)双颞侧偏盲，视力下降，闭经，尿崩

60.[单选题]男性患者，30岁，病程4个月，头痛发病，入院前出现左侧肢体无力 和呕吐，入院检查，意识清醒，眼底视盘水肿，左上、下肢肌力四级，腱反射活跃，病理征(+)。最有助于明确病因的检查是
A)X线头颅片
B)脑电图
C)脑血管造影
D)CT
E)ECT

61.[单选题]关于小儿身高，下列哪项是错误的：
A)身高是指头顶到足底的全身长度
B)立位与卧位的测量值相差约1～2cm
C)身高包括头、脊柱和下肢等部分，各增长速度不是一致的
D)2岁以后身高增长小于7cm，为生长速度下降
E)3岁以下称为身长

62.[单选题]O型血清与其它型红细胞相混合时()
A)无反应
B)将会发生凝集反应
C)将会出现凝固
D)将会出现红细胞肿胀
E)将会出现细胞沉降

63.[单选题]分子质量最大的免疫球蛋白是（ ）
A)IgG
B)IgA
C)IgD
D)IgE
E)IgM

64.[单选题]原发性甲亢是指
A)甲状腺肿大的同时，出现功能亢进症状
B)在甲状腺肿的基础上继发功能亢进症状
C)在结节性甲状腺肿的基础上并发功能亢进症状
D)自主性甲状腺肿(高功能腺瘤)
E)先出现甲状腺肿大，后出现甲亢症状、

65.[单选题]男性，28岁，头部被爆炸的弹片击伤，昏迷6小时，查体，体温39℃，脉搏100次／分，呼吸26次／分，血压105／83mmHg，浅昏迷，右额部可见伤口约3cm×4cm大小，有血性液体外流，两瞳孔等大，右上肢活动少。最适宜的治疗措施是
A)抗休克
B)伤口加压包扎
C)抗生素
D)物理降温
E)彻底清创，修补硬脑膜

66.[单选题]患者女性，孕6个月。因外阴痒、白带多10余天来院就诊，经检查确诊为滴虫阴道炎，正确的处理为
A)0.5%醋酸溶液阴道灌洗共3次
B)阴道灌洗后甲硝唑塞入阴道连用10天
C)口服甲硝唑400mg，每日3次，连用7天
D)1个月后复查滴虫阴性为治愈
E)注意性生活卫生，丈夫不需同治

67.[单选题]克罗恩病时结肠的病变是
A)粘膜层
B)粘膜层、粘膜肌层
C)粘膜层和粘膜层
D)全壁性炎症
E)全壁性炎症，粘膜下层明显

68.[单选题]下列不产生肠毒素的细菌是：
A)空肠弯曲菌
B)霍乱弧菌
C)粘附-集聚性大肠杆菌
D)金黄色葡萄球菌
E)产毒性大肠杆菌

69.[单选题]肝性脑病患者的护理措施中，最重要的环节是
A)加强安全措施
B)去除和避免一切诱发因素
C)注意休息
D)合理饮食
E)密切观察病情变化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808065013015006070