2024年广西壮族自治区临桂区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库大全（夺冠）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A：毛花苷丙

B：硝普钠

C：阿替洛尔

D：卡托普利

答案：A

2.感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A：含中枢兴奋剂咖啡因制剂

B：含非甾体抗炎药制剂

C：含氢溴酸右美沙芬制剂

D：含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

答案：D

3.Ⅴ级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

A：B级

B：D级

C：C级

D：E级

答案：B

4.对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

A：噻嘧啶

B：枸橼酸哌嗪

C：伊维菌素

D：甲苯咪唑

答案：A

5.脂溶性最低，作用慢而长的是

A：戊巴比妥

B：硫喷妥

C：巴比妥

D：苯巴比妥

答案：C

6.急诊处方印刷用纸的颜色是

A：淡绿色

B：淡红色

C：淡黄色

D：淡蓝色

答案：C

7.适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

A：非那雄胺

B：米多君

C：奥昔布宁

D：特拉唑嗪

答案：C

8.（2017年真题）治疗中度痤疮宜选用（）

A：复方苯甲酸酊

B：氢化可的松软膏

C：维A酸乳膏

D：阿昔洛韦软膏

答案：C

9.使用前应用原药进行皮试的药物是

A：阿奇霉素片

B：注射用阿莫西林

C：左氧氟沙星片

D：注射用头孢曲松钠

答案：D

10.紫外线加速一些药品的氧化、分解

A：日光

B：湿度

C：空气

D：温度

答案：A

11.适宜于餐中给药的药物是

A：复方铝酸铋

B：缬沙坦

C：法莫替丁

D：二甲双胍

答案：D

12.病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

A：1级证据

B：3级证据

C：4级证据

D：2级证据

答案：B

13.使用抗过敏药治疗荨麻疹的患者，拟进行变应原皮试的时间是在

A：停用抗过敏药36～48小时后

B：停用所用药物之后

C：停用抗过敏药之后

D：停用抗过敏药48～72小时后

答案：D

14.通过增加房水经葡萄巩膜外流和减少房水生成降低眼压的α2受体激动剂是

A：拉坦前列素

B：毛果芸香碱

C：溴莫尼定

D：噻吗洛尔

答案：C

15.有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

A: 去乙酰毛花苷

B: 多巴胺

C: 米力农

D: 维拉帕米

答案：B

16.可引起局部组织萎缩

A: 氯己定

B: 硼酸甘油

C: 甲硝唑含漱制剂

D: 地塞米松粘贴片

答案：D

17.使用年龄折算法，体重折算法，体表面积折算法等计算，是指

A: 密切监护

B: 明确诊断

C: 严格掌握适应证

D: 严格掌握用药剂量

答案：D

18.常用于退热时的是

A: 口服给药

B: 直肠给药

C: 静脉注射

D: 肌内注射

答案：B

19.患者，男，58岁，因心前区疼痛5年，加重伴呼吸困难入院。入院前6年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

B: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物

C: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏

D: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂

答案：B

20.填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 用药起止时间

B: 用药原因

C: 不良反应/事件的结果

D: ADR/ADE过程描述

答案：B

21.患者，女，77岁，53kg，既往糖尿病病史10年，因“反复尿路感染4个月，加重3天”来院就诊。4个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在37.2℃～37.5℃之间，自服左氧氟沙星片0.29bid治疗5天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星0.29bid治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数463.2/gl，细菌计数1262.1/μl。查体：T37.9℃P86次/分R21次/分BP132/77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数12.35×109/L、中性粒细胞百分比86.5%，CRP69.5mg/L。血生化：AST15U/L，ALT11U/L，ALB43.29/L，Scr669mol/L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>105cfu/ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: CAT评分

B: CTP评分

C: 计算肌酐清除率

D: HAS—BLED评分

答案：C

22.“调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的5倍”提示诊断药源性疾病应该进行

A: 致病药物的确定

B: 排除药物以外的因素

C: 流行病学的调查

D: 询问用药过敏史和家族史

答案：C

23.吗啡的禁用范围是

A: 3岁以下幼儿

B: 婴幼儿

C: 1岁以下婴儿

D: 新生儿

答案：C

24.以维生素C注射液作溶剂溶解后注射的是

A：双解磷

B：盐酸烯丙吗啡

C：谷胱甘肽

D：亚硝酸钠

答案：C

25.处方常见的外文缩写中“生理盐水”的英文缩写是

A：OU

B：NS

C：Aa

D：OL

答案：B

26.一些权威性较高的二次文献中，记载应做皮肤敏感试验的药品中，维生素B1注射剂的皮试药液浓度是

A：3mg/ml

B：5mg/ml

C：1mg/ml

D：2mg/ml

答案：B

27.非选择性β-受体阻断剂的禁忌证是

A：哮喘

B：充血性心力衰竭

C：高血钾

D：体位性低血压

答案：A

28.6个月～2岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A：(11.0～12.0)×109/L

B：(200～300)×10^9/L

C：(100～300)×10^9/L

D：(4.0～10.0)×10^9/L

答案：A

29.单核细胞正常值参考范围是

A：0.01～0.05

B：0～0.01

C：0.03～0.08

D：0.20～0.40

答案：C

30.患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0~10×109/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A：腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充?

B：药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用?

C：小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用?

D：首选口服补液，必要时静脉补液?

答案：B

31.处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 无适应证用药

B: 联合用药不适宜

C: 有禁忌证用药

D: 过度治疗用药

答案：A

32.支原体肺炎首选（）

A: 青霉素

B: 甲氧西林

C: 多西环素

D: 阿奇霉素

答案：C

33.是目前治疗ED的首选疗法的药物为

A: RAAS拮抗剂

B: 克罗米芬

C: AR

D: PDE-5抑制剂

答案：D

34.（2017年真题）患者,男，72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200μgbid吸入沙丁胺醇气雾剂100μgprn吸入,氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgprn舌下含服治疗。

A: 布地奈德剂量太大

B: 硝酸甘油剂量不足

C: 氨氨地平的不良反应

D: 沙丁胺醇的不良反应

答案：D

35.较易导致肾损伤的药物是

A: 环孢素

B: 酮康环孢素唑

C: 比沙可啶

D: 布洛芬

答案：D

36.伴有认知障碍的老年帕金森病患者，首选治疗药物为

A: 复方左旋多巴

B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 金刚烷胺

答案：A

37.患儿男,2岁,误服水银后应选用的洗胃液是（）

A: 1:5000高锰酸钾溶液

B: 淀粉溶液

C: 牛奶与水等量混合

D: 鸡蛋清

答案：D

38.下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

A: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形

B：受精后3周～3个月接触药物最易发生先天畸形

C：孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

D：受精后的半个月内几乎见不到药物的致畸作用

答案：A

39.稳定型心绞痛发作时应选用的治疗药物是（）

A：硝酸甘油

B：氟伐他汀

C：美托洛尔

D：阿司匹林

答案：A

40.常引起粪便白细胞增多的是

A：阻塞性黄疸

B：溶血性黄疸

C：急性胰腺炎

D：细菌性痢疾

答案：D

41.合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

A：托特罗定

B：坦索罗辛

C：非那雄胺

D：多沙唑嗪

答案：A

42.咳嗽变异性哮喘可选用的药物是

A：沙美特罗+氟替卡松

B: 沙丁胺醇

C: 异丙托溴铵

D: 倍氯米松

答案：A

43.下列药品可以申请医疗机构制剂的是

A: 中药、化学药的复方制剂

B: 生物制品（变态反应原除外）

C: 中药注射剂

D: 中药颗粒剂

答案：D

44.患儿，女，5岁，误服香豆素类杀鼠药。可选用的解救药物是

A: 纳洛酮

B: 亚甲蓝

C: 维生素K

D: 二巯丙醇

答案：C

45.可引起血清尿素氮降低的是

A: 急性胰腺炎

B: 严重肝病

C: 肾衰竭

D: 胃溃疡

答案：B

46.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到ADR时，需要进行因果关系评价。患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是()

A: 很可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 可能

答案：C

47.应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

A: 患者伴血容量较低

B: 防止形成尿道结石或肾结石

C: 加快排泄，减小肾毒性

D: 减小用药部位刺激性

答案：B

48.切勿直接静脉注射的是

A: 氯化钾

B: 青霉素

C: 红霉素

D: 苯妥英钠

答案：A

49.患者，男，36岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

A: 布洛芬

B：非布司他

C：尼美舒利

D: 秋水仙碱

答案：D

50.鲜血便主要见于（）

A: 小肠炎症

B: 慢性菌痢

C: 霍乱

D: 下消化道出血

答案：D

51.阿昔洛韦的适应证是

A: 乙型病毒性肝炎

B: 带状疱疹

C: 足癣

D: 流感

答案：B

52.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 非ST段抬高型心肌梗死

B: 稳定型心绞痛

C: 冠状动脉粥样硬化型心脏病

D: 无症状型心肌缺血型

答案：A

53.美金刚的作用机制为

A：抑制胆碱酯酶

B：脑循环改善剂

C：抑制N-甲基天冬氨酸受体

D：钙离子拮抗剂

答案：B

54.（2018年真题）患者，女，34岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示TSH增高FT3、FT4减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠100μgqd治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A：睡前顿服

B：早餐前半小时，顿服

C：晚餐后顿服

D：早餐后半小时，顿服

答案：B

55.（2018年真题）患者，男，69岁，因高血压长期服用抗高血压药，近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是（）

A：多沙唑嗪

B：卡托普利

C：非洛地平

D：普萘洛尔

答案：C

56.可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

A：精神刺激剂

B：肽激素类

C: 易制毒药品

D: 蛋白同化制剂

答案：C

57.药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

A: 利巴韦林可致畸与肿瘤

B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

C: 地高辛用于肾功不全患者

D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：C

58.宜溶解于温开水中后服用

A: 胶囊剂

B: 泡腾片

C: 粉剂

D: 糖浆剂

答案：B

59.可加重痴呆及认知功能受损的是

A: 氯苯那敏

B: 异丙嗪

C: H

D: 地西泮

答案：C

60.在药物经济学研究方法中，可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

A: 最小成本分析

B: 最大效果分析

C: 成本-效益分析

D: 成本-效用分析

答案：A

61.其含量用生育酚当量表示的是

A: 维生素D

B: 维生素B

C: 维生素E

D: 维生素A

答案：C

62.Ⅱ期临床试验

A: 以特殊人群为给药对象

B: 以目标适应证患者为给药对象

C: 以患者为给药对象

D: 以健康志愿者为给药对象

答案：B

63.下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

A: 利福平

B: 异烟肼

C: 咪康唑

D: 克林霉素

答案：A

64.不良反应是口干、尿潴留

A: 特拉唑嗪
B: 哌唑嗪
C: 索利那新
D: 度他雄胺
答案：C

65.饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是
A: 维生素B
B: 利血平
C: 卡马西平
D: 苯妥英钠
答案：D

66.缺铁性贫血、铅中毒贫血是由于
A: 红细胞生成减少
B: 血红蛋白生成减少
C: 红细胞丢失过多
D: 红细胞生成过多
答案：B

67.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。
A: 格列齐特
B: 胰岛素+二甲双胍
C: 胰岛素
D: 二甲双胍

答案：D

68.抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率

A：哌唑嗪

B：度他雄胺

C：特拉唑嗪

D：索利那新

答案：B

69.（2016年真题）患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。

A：华法林片

B：氯吡格雷片

C：对乙酰氨基酚片

D：双嘧达莫片

答案：B

70.患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

A：呋喃唑酮

B：双嘧达莫

C：诺氟沙星

D：喷托维林

答案：A

71.易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

A：阿霉素

B：紫杉醇

C：氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案：C

72.紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

A: 温度

B: 湿度

C: 空气

D: 日光

答案：D

73.维生素C用于

A: 防治夜盲症

B: 防治坏血病

C: 习惯性流产的辅助治疗

D: 防治佝偻病

答案：B

74.可作为轻度痤疮治疗单独一线用药的是

A: 夫西地酸乳膏

B: 水杨酸软膏

C: 维A酸凝胶

D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案：C

75.在处方用药适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会增加毒性或不良反应的是

A: 阿莫西林和克拉维酸钾

B: 苄丝肼和左旋多巴

C：头孢哌酮和舒巴坦

D：甲氧氯普胺和氯丙嗪

答案：D

76.患者，男，50岁。临床诊断慢性肾衰竭（尿毒症期），进行肾移植治疗，配合应用免疫抑制剂他克莫司，其初始剂量为

A：0.75～1mg/（kg·d）

B：0.02～0.03mg/（kg·d）

C：0.05～0.15mg/（kg·d）

D：2～5mg/（kg·d）

答案：C

77.药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

A：异烟肼与牛奶同服

B：华法林与人参同服

C：左甲状腺素与钙剂同服

D：硫酸亚铁与维生素C同服

答案：D

78.注意个体化用药体现

A：安全性

B：有效性

C：经济性

D：规范性

答案：D

79.流行性出血性结膜炎可选用

A: 2%色甘酸钠滴眼剂

B: 四环素眼膏

C: 0.1%羟苄唑滴眼剂

D: 0.1%碘苷滴眼剂

答案：C

80.常见老年人ADR的药物类别,大量应用可导致肠道菌群失调或真菌感染等严重并发症

A: β 受体阻断剂

B: 抗胆碱药

C: 钙通道阻滞剂

D: 抗生素

答案：D

81.病毒性肝炎、肝硬化等可引起

A: 尿蛋白检测阳性

B: 尿胆红素检测阳性

C: 尿酸碱度降低

D: 尿酸碱度增高

答案：B

82.仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 雷洛昔芬

B: 骨化三醇

C: 帕米磷酸二钠

D: 阿法骨化醇

答案：A

83.血脂调节药的合理应用有效降低LDL-C和TG水平，升高HDL-C水平的是（）

A：他汀类与贝特类联用

B：伊曲康唑

C：依折麦布

D：普罗布考

答案：A

84.每1疗程期间应停药3天的是

A：别嘌醇

B：苯溴马隆

C：泼尼松

D：秋水仙碱

答案：D

85.可使驾驶员出现定向力障碍的药物是

A：哌替啶

B：吲达帕胺

C：东莨菪碱

D：右美沙芬

答案：A

86.中成药血脂康中航油的化学成分是

A：辛伐他丁

B：洛伐他丁

C：阿托伐他汀

D：依折麦布

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/808103135045007022