

2024 贵州省镇远县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库附答案【基础题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对肾功能影响较小的抗高血压药是

- A: 肼屈嗪
- B: 胍乙啶
- C: 卡托普利
- D: 利血平

答案：A

2. （2017 年真题）易发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是（）

- A: 注射用柔红霉素
- B: 注射用盐酸博来霉素
- C: 紫杉醇注射液
- D: 注射用硫酸长春新碱

答案：C

3. （2016 年真题）可使血小板内环磷腺苷（cAMP）浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

- A: 氯吡格雷
- B: 双嘧达莫
- C: 替罗非班
- D: 阿司匹林

答案：B

4. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 庆大霉素
- B: 链霉素
- C: 青霉素
- D: 四环素

答案：D

5. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 地高辛
- B: 苯妥英钠
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：C

6. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是()

- A: 喹诺酮类
- B: 甲硝唑
- C: 四环素
- D: 苯唑西林

答案：A

7. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

- A: 诺氟沙星
- B: 氟罗沙星
- C: 氧氟沙星

D: 环丙沙星

答案：C

8. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

A: 联苯卡唑

B: 特比萘芬

C: 阿莫罗芬

D: 制霉菌素

答案：B

9. 可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

A: 卡莫司汀

B: 环磷酰胺

C: 丝裂霉素

D: 博来霉素

答案：D

10. 利多卡因的电生理作用错误的是()

A: 缩短 APD

B: 降低自律性

C: ERP 相对延长

D: 显著减慢传导

答案：D

11. (2021 年真题) 某患者新诊断为退行性膝关节炎, 既往有磺胺过敏史, 不宜选用的非甾体抗炎药是 ()

A: 布洛芬

B: 塞来昔布

C: 吲哚美辛

D: 双氯芬酸

答案: B

12. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

A: 缓解患者的下尿路症状

B: 预防急性尿潴留

C: 延缓疾病临床进展

D: 缓解患者的上尿路症状

答案: A

13. 合用伊立替康可减弱作用效果的是

A: 琥珀胆碱

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 米库氯铵

答案: D

14. 可致细胞膜通透性增加，细菌膨胀、溶解死亡的药物是

A: 多黏菌素

B: 替加环素

C: 环丙沙星

D: 庆大霉素

答案: A

15. 属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢哌酮

B: 头孢噻肟

C: 头孢吡肟

D: 头孢噻吩

答案：C

16. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是（）

A: α 受体

B: H 受体

C: N 受体

D: M 受体

答案：A

17. 属于 NK-1 受体阻断剂的止吐药物是

A: 格雷司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 甲地孕酮

D: 阿瑞吡坦

答案：D

18. 阿托品禁用于

A: 胆绞痛

B: 遗尿症

C: 青光眼

D: 全身麻醉前给药

答案：C

19. 四环素的抗菌作用机制

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

D: 影响胞浆膜通透性

答案：C

20. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

A: 12 小时内

B: 8 小时内

C: 24 小时内

D: 3 小时内

答案：D

21. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

A: 胰岛素

B: 依替膦酸二钠

C: 甲状腺素

D: 糖皮质激素

答案：A

22. 可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

A: 西司他丁

B: 亚胺培南

C: 美罗培南

D: 厄他培南

答案：D

23. 基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

A: 链激酶

B: 重组人促红素

C: 叶酸

D: 尿激酶

答案：B

24. 大剂量雌激素用于()

A: 痛经

B: 绝经期综合征

C: 回奶

D: 再生障碍性贫血

答案：C

25. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

A: 聚维酮碘

B: 依沙吖啶

C: 氯己定

D: 过氧乙酸

答案：A

26. 诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 链霉素

D: 利福平

答案：D

27. 可能诱发心绞痛的降压药是

- A: 哌唑嗪
- B: 可乐定
- C: 普萘洛尔
- D: 肼屈嗪

答案：D

28. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性，骨髓功能抑制相对较轻的是()

- A: 卡铂
- B: 顺铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 奥沙利铂

答案：B

29. 具有心脏毒性的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 长春新碱
- C: 博来霉素
- D: 紫杉醇

答案：A

30. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 1 次/日，上午 8 时给药
- B: 1 次/日，午后 14 时给药
- C: 夜间给药

D: 3 次/日

答案：A

31. 下列何药对心房颤动无治疗作用

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

答案：B

32. 属于促胰岛素分泌剂的是()。

A: 艾塞那肽

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 那格列奈

答案：D

33. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

A: 利多卡因

B: 普罗帕酮

C: 地尔硫

D: 胺碘酮

答案：A

34. 阿奇霉素()

A: 用于非典型致病原感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

C: 肾毒性较大

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案: A

35. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()
。

A: 维生素 B

B: 依诺肝素

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案: B

36. (2017 年真题) 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状,其所激动的受体是()

A: N 受体

B: M 受体

C: H1 受体

D: α 受体

答案: D

37. 肾病综合征采用

A: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

B: 抗结核病药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案: C

38. 青霉素 G

A: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

- B: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- C: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
- D: 对支原体有效

答案：C

39. 广谱调血脂药物是

- A: 吉非罗齐
- B: 考来烯胺
- C: 烟酸
- D: 氯贝丁酯

答案：C

40. (2020 年真题) 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 泛昔洛韦
- B: 伐昔洛韦
- C: 喷昔洛韦
- D: 昔多福韦

答案：B

41. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 混悬型胰岛素可以静脉注射
- B: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- C: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃冷藏保存
- D: 每次注射需要更换不同部位

答案：A

42. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 林可霉素

答案：C

43. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的 cAMP 含量，缓解慢性心力衰竭症状()

- A: 氨力农
- B: 硝普钠
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：A

44. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

- A: 高钠血症
- B: 高钾血症
- C: 低钾血症
- D: 低钠血症

答案：B

45. 需要嚼碎服用的药品是

- A: 泮托拉唑肠溶片
- B: 胰酶肠溶片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 乳酸菌素片

答案：D

46. 对于吗啡药动学特点的表述，错误的是

- A: 口服不易吸收
- B: 可通过胎盘屏障
- C: 大部分经肝脏代谢、经肾排泄
- D: 皮下注射吸收快

答案：A

47. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

- A: 骨髓炎
- B: 白喉带菌者
- C: 婴幼儿支原体肺炎
- D: 空肠弯曲杆菌肠炎

答案：A

48. 可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 磺胺甲恶唑
- B: 克林霉素
- C: 头孢呋辛
- D: 左氧氟沙星

答案：D

49. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

- A: 辛伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 烟酸

答案：B

50. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

- A: 蛔虫病和蛲虫病
- B: 绦虫病
- C: 疟疾
- D: 蛲虫病

答案：A

51. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用
- B: 兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩
- C: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- D: 用药期间不宜饮酒

答案：C

52. 属于广谱抗病毒药物的是

- A: 奥司他韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 干扰素
- D: 阿昔洛韦

答案：C

53. （2021 年真题）属于时间依赖型抗菌药物，抗菌谱窄，仅对需氧革兰阴性菌有（）

- A: 氨基糖苷类
- B: 氨基西林
- C: 阿米卡星
- D: 头孢他啶

答案：A

54. 用于低分子肝素过量时解救的药品是

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K1
- D: 酚磺乙胺

答案：A

55. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌细胞壁合成
- B: 抑制细菌糖代谢
- C: 干扰细菌核酸代谢
- D: 抑制细菌蛋白质合成

答案：C

56. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

- A: 维拉帕米+氢氯噻嗪
- B: 短效硝酸酯类+螺内酯
- C: 维拉帕米+普萘洛尔
- D: 长效硝酸酯类+普萘洛尔

答案：D

57. 下述属于外周性多巴胺 D2 受体阻断剂的是

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：D

58. 下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 吡嗪酰胺

答案: A

59. 盐酸多柔比星属于

- A: 生物碱类
- B: 抗肿瘤抗生素类
- C: 抗代谢类抗肿瘤药物
- D: 烷化剂

答案: B

60. 扎鲁司特属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: 黄嘌呤类药物
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 白三烯调节剂

答案: D

61. 肥胖型 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是()

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 格列吡嗪
- D: 格列齐特

答案: B

62. (2019 年真题) 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合，形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 硫普罗宁
- B: 腺苷蛋氨酸
- C: 葡醛内酯
- D: 异甘草酸镁

答案: C

63. 患者，女，70 岁，BMI21kg/m²，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果:血钙 1.97mmol/L,血磷 1.7mmol / L，右上肢 X 光检查提示:右桡骨远端骨折。骨密度检查结果:T 值 (-2.9)。

- A: 秋水仙碱
- B: 双醋瑞因
- C: 地塞米松
- D: 对乙酰氨基酚

答案: D

64. 散瞳药硫酸阿托品眼用凝胶的禁用人群是

- A: 虹膜睫状体炎患者
- B: 睫状肌麻痹患者
- C: 眼底检查者
- D: 青光眼患者

答案: D

65. 以下不属于呋塞米的不良反应的是

- A: 高尿酸血症
- B: 耳毒性
- C: 胃肠道反应
- D: 降低血糖

答案：D

66. (2020 年真题) 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

- A: 布美他尼
- B: 呋塞米
- C: 托拉塞米
- D: 依他尼酸

答案：A

67. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 大剂量阿托伐他汀
- C: 小剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：D

68. 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合症”的药品是

- A: 磷霉素
- B: 夫西地酸
- C: 万古霉素
- D: 莫西沙星

答案：C

69. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

- A: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者
- B: 肝、肾功能不全者
- C: 心力衰竭患者
- D: 有子宫内膜癌症状和体征者

答案: C

70. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 8mg / kg
- B: 6mg / kg
- C: 2mg / kg
- D: 4mg / kg

答案: B

71. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新()

- A: 阿达帕林
- B: 异维 A 酸
- C: 维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案: C

72. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 奥关拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 莫沙必利
- D: 碳酸钙

答案: D

73. 可用于降低眼压的药物是()

- A: 卡替洛尔
- B: 阿托品
- C: 左氧氟沙星
- D: 利福平

答案：A

74. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

- A: 用药过量可导致出血并发症
- B: 对于不同的手术，选择疗程不同
- C: 用药期间需定期测定血红蛋白
- D: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

答案：D

75. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 格列本脲

答案：B

76. 对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

- A: N-乙酰半胱氨酸
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：D

77. 甲地孕酮与利福平合用()

- A: 代谢加速而导致意外怀孕
- B: 代谢加快而失效
- C: 抑制排酸作用
- D: 子宫内膜突破性出血

答案：D

78. 临床上用于控制子痫发作的是

- A: 苯妥英钠
- B: 卡巴西平
- C: 硫酸镁
- D: 苯巴比妥

答案：C

79. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 硝苯地平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 利血平

答案：D

80. 可引起致死性肺毒性和肝毒性的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 维拉帕米

答案：A

81. 糖尿病合并酮症酸中毒的患者()

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 抑制葡萄糖苷酶

C: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

D: 胰岛素皮下注射

答案：D

82. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 依米丁

B: 喹碘仿

C: 氯喹

D: 替硝唑

答案：C

83. 治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或 β -内酰胺类过敏患者的 G+ 菌严重感染，首选药物是

A: 替硝唑

B: 克林霉素

C: 红霉素

D: 万古霉素

答案：D

84. (2021 年真题) 关于美罗培南使用注意事项的说法，错误的是 ()

A: 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染

B: 肝功能不全者需调整剂量

C: 与中枢神经系统 γ -氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应的发生率显著低于亚胺培南

D: 有其他 β -内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用

答案：B

85. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别神经毒性较严重的是

A: 亚叶酸钙

B: 卡铂

C: 顺铂

D: 奥沙利铂

答案：D

86. 大环内酯类抗生素()

A: 万古霉素

B: 克林霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案：A

87. 对抗香豆素过量引起的出血可选用()

A: 垂体后叶素

B: 鱼精蛋白

C: 维生素 K

D: 维生素

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类正性肌力药是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/815041210114012033>