专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省肃宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整版审定版

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.急性黄疸型肝炎患者尿常规检查可发现

A：尿血红蛋白阳性

B：尿胆红素阳性

C：尿淀粉酶增高

D：尿葡萄糖阳性

答案：B

2.（2017年真题）可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是（）

A：头孢克洛

B：诺氟沙星

C：阿莫西林

D：复方磺胺甲噁唑

答案：D

3.下列药物属于容积性泻药的是

A：乳果糖

B：聚乙二醇

C：欧车前

D：多库酯

答案：C

4.西咪替丁可引起的典型不良反应是

A: 血糖升高

B: 低镁血症

C: 高钾血症

D: 定向力障碍、意识混乱

答案：D

5.使用前应用原药进行皮试的药物是

A: 阿莫西林胶囊

B: 注射用头孢曲松钠

C: 左氧氟沙星片

D: 阿奇霉素片

答案：B

6.妊娠期间，药物致畸的高敏感期是

A: 受精后3周以内

B: 妊娠18天

C: 妊娠3天

D: 受精后3周～3个月

答案：D

7.属于药物信息服务的最重要的部分的是

A: 对文献进行评价、分析和整理

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 对问题进行确定并归类

D: 确立有效的检索方法、查阅文献

答案：B

8.二级信息源的优点叙述，最正确的是

A：有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

B：可提供丰富的信息

C：读者能自己评价信息，免受他人观点影响

D：对一个具体问题提供的信息全面、详实

答案：B

9.某溶液的浓度为1：100，其含义为

A：100ml溶液中含有1g溶质

B：100g溶液中含有1g溶质

C：1L溶液中含有的溶质为0.1mol

D：100ml溶液中含有1ml溶质

答案：A

10.高血压首选的利尿剂是

A：氢氯噻嗪

B：氨苯蝶啶

C：乙酰唑胺

D：呋塞米

答案：A

11.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A：药动学相互作用

B：药物制剂因素

C：药理作用

D：药物的使用

答案：B

12.根据循证医学证据分级，同质RCT的系统评价结果属于

A: Ⅰa类证据

B: Ⅰb类证据

C: Ⅱa类证据

D: Ⅱb类证据

答案：A

13.药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

A: 铁剂联用维生素

B: 阿托品联用普萘洛尔

C: 硝苯地平联用普萘洛尔

D: 青蒿素联用乙胺嘧啶

答案：A

14.头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致（）

A: 微浑浊或沉淀

B: 产生气体

C: 产生胶状不溶物

D: 溶液变色

答案：A

15.患者，男，67岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是()

A: 0.4g，每日2次

B: 0.4g，每日4次

C: 0.4g，每日5次

D: 0.8g，每日3次

答案：C

16.属于高选择性 α4β2尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 伐尼克兰

B: 安非他酮

C: 可乐定

D: 尼古丁替代药物

答案：A

17.阿片类中毒出现呼吸抑制时给予（）

A: 有机硫类

B: 去甲肾上腺素

C: 阿托品

D: 苯妥英钠

答案：C

18.患者,男,72岁。诊断:高血压,心力衰竭,肋软骨炎RX地高辛片0.25mg×10片0.125mgqd比索洛尔片5mg×20片2.5mgqd红霉素缓释胶囊250mg×12粒500mgbid布洛芬胶囊200mg×10粒200mgprn

A: 地高辛不宜选用

B: 比索洛尔给药频次不合理

C: 地高辛剂量偏小

D: 不应使用红霉素缓释胶囊

答案：D

19.30g/L≤Hb量<60g/L可诊断为

A: 重度贫血

B: 轻度贫血

C: 中度贫血

D: 基本正常

答案：A

20.由美国卫生系统药师协会出版的《HandbookoninjectableDrug》袖珍本的中译本是

A: 《Trissel混合组分的稳定性》

B: 《Trissel注射药物手册》

C: 《药品注射剂使用指南》

D: 《注射药物手册》

答案：C

21.服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

A: 吲哚美辛

B: 甲氨蝶呤

C: 普萘洛尔

D: 格列本脲

答案：D

22.用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

B: 地高辛用于肾功不全患者

C: 利巴韦林可致畸与肿瘤

D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：B

23.更年期综合征最具特征性的症状为

A: 潮热、出汗

B: 月经周期延长，经量减少，最后绝经

C: 心悸、胸闷不适

D: 阴道萎缩

答案：A

24.药品通用名容易混淆的抗真菌药是

A: 氟胞嘧啶

B: 阿糖胞苷

C: 阿糖腺苷

D: 氟尿嘧啶

答案：A

25.不宜与蛋白质食物合用的药物是

A: 辛伐他汀

B: 磺胺类药物

C: 左旋多巴

D: 硫酸亚铁

答案：C

26.患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

A：氟西汀

B：卡马西平

C：多奈哌齐

D：左旋多巴

答案：D

27.评价二级信息的标准是

A：研究方法是否科学合理

B：研究目的是否明确

C：索引的完备程度，收载杂志的数量

D：作者是否为该领域的专家

答案：C

28.控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

A：有效性

B：规范性

C：经济性

D：安全性

答案：C

29.在治疗痛风时，应用排尿酸药过程中，应多饮水，一日尿量宜保持在

A：1500ml以上

B：2000ml以上

C：500ml以上

D: 1000ml 以上

答案：B

30.孟鲁司特平喘的主要机制是

A: 拮抗 M 胆碱受体

B: 抑制白三烯受体

C: 阻断腺苷受体

D: 激动肾上腺素 β2 受体

答案：B

31.患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36．6℃，P82 次／分，R22 次／分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿哕音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC11．2×109／L，肺功能 FEV1／FVC60％，FEV155％。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mgtidivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4gbidivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mgbid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mgbid 雾化吸入

A: 异丙托溴铵注射液

B: 布地奈德混悬液

C: 硝苯地平控释片

D: 氨溴索注射液

答案：A

32.首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 氯苯那敏胶囊

B: 异丙嗪片

C: 西替利嗪片

D: 醋酸氟轻松软膏

答案：C

33.糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 甘露醇

D: 阿米洛利

答案：A

34.分娩前应用氯霉素可引起新生儿

A: 腹泻

B: 肺炎

C: 核黄疸

D: 灰婴综合征

答案：D

35.治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 奥美拉唑

B: 雷尼替丁

C: 昂丹司琼

D: 维生素B6

答案：C

36.患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

B: 甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

C: 低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

D: 门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

答案：B

37.处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 技术性、经济性和合法性

B: 经济性、法律性和合理性

C: 法律性、技术性和经济性

D: 技术性、有效性和经济性

答案：C

38.主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是（单纯疱疹病毒的分型）

A: HSV-Ⅱ型

B: HSV-Ⅰ型

C: HSV-Ⅲ型

D: HSV-Ⅳ型

答案：A

39.服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A: 烟

B: 浓茶

C：酒

D：咖啡

答案：C

40.(毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

A：吗啡中毒

B：水银中毒

C：氰化物中毒

D：有机磷中毒

答案：B

41.引起心悸、心绞痛发作的药物是

A：左甲状腺素

B：碘和碘化物

C：胰岛素

D：丙硫氧嘧啶

答案：A

42.脑出血急性期体位应注意的是（）

A：仰卧位

B：俯卧位

C：抬高床头15-30°

D：侧卧位

答案：C

43.用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

A：乙胺丁醇

B：吡嗪酰胺

C：利福平

D：链霉素

答案：A

44.青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

A: 作用于不同的靶点

B: 竞争性拮抗作用

C: 促进机体的利用

D: 延缓或降低抗药性

答案：D

45.不良反应的评价结果分为6级,ADR与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药ADR不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现，药品不良反应因果关系评价结果为

A: 可能无关

B: 很可能

C: 待评价

D: 肯定

答案：A

46.属于5α-还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

A: 阿夫唑嗪

B: 非那雄胺

C: 黄酮哌酯

D: 氟他胺

答案：B

47.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 高血钾

B: 心动过缓

C: 快速房性心律失常伴传导阻滞

D: 体位性低血压

答案：C

48.属于HIV蛋白酶抑制剂的是（）

A: 奈韦拉平

B: 洛匹那韦

C: 多替拉韦

D: 阿巴卡韦

答案：B

49.下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

A: qs

B: qh

C: qn

D: qd

答案：C

50.可能导致 γ-谷氨酰转移酶升高的药物是

A: 氯氮平

B: 苯妥英钠

C: 阿司匹林

D: 胰岛素

答案：B

51.属于选择性5-HT再摄取抑制剂的是（）

A: 阿夫唑嗪
B: 非那雄胺
C: 氟伏沙明
D: 特拉唑嗪
答案：C

52.西咪替丁所致的主要不良反应是
A: 腹痛
B: 性功能减退
C: 皮炎
D: 神经毒性
答案：B

53.在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是
A: 利血平
B: 阿米替林
C: 阿洛司琼
D: 呋塞米
答案：C

54.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×10
A: 慢性肾盂肾炎
B: 急性肾盂肾炎
C: 急性肾小球肾炎
D: 急性膀胱炎
答案：B

55.特布他林平喘的主要机制是

A: 拮抗M胆碱受体

B: 抑制白三烯受体

C: 阻断腺苷受体

D: 激动肾上腺素 β2受体

答案：D

56.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7%。

A: 增加一种口服降糖药

B: 增加现用口服降糖药的剂量

C: 换用其他作用机制的口服降糖药

D: 启用胰岛素治疗

答案：D

57.在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是

A: 提供的信息丰富、详实

B: 内容广泛、使用方便

C: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

D: 内容全面、细致

答案：B

58.指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

A: 新颖性

B: 合理性

C: 归因性

D: 权威性

答案：C

59.患者，男，30岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续3年，查体：双肺满布哮鸣音，HR807欠/分，律齐，无杂音。

A: 哌唑嗪

B: 沙丁胺醇

C: 普萘洛尔

D: 青霉素

答案：B

60.有过敏反应，有磺胺类药物过敏史的患者忌用的降糖药是

A: 西格列汀

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 格列吡嗪

答案：D

61.乳果糖治疗功能性便秘的主要机制是

A: 在肠道分解，分解产物使水和电解质保留，致容积性排便

B: 增强胃肠道中的蠕动反射和推进运动模式

C: 润滑并刺激肠壁，软化大便

D: 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便

答案：A

62.胃黏膜保护药硫糖铝应该

A: 在餐前1小时服用

B: 在餐后1～2小时服用

C：在餐前 15 分钟服用

D：在早、晚餐前 1.5 小时服用

答案：A

63.合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

A：坦索罗辛

B：多沙唑嗪

C：非那雄胺

D：奥昔布宁

答案：D

64.可引起再生障碍性贫血

A：苯妥英钠

B：抗组胺药

C：氯霉素

D：维生素 A

答案：C

65.（2016 年真题）用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（）。

A：氟马西尼

B：青霉胺

C：乙酰胺

D：纳洛酮

答案：B

66.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 消化不良性腹泻

B: 分泌性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 感染性腹泻

答案：D

67.适合治疗伴有焦虑症的抑郁者的药物是

A: 氟伏沙明

B: 丙咪嗪

C: 阿米替林

D: 帕罗西汀

答案：D

68.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 部分确认的信号

B: 尚不确定的信号

C: 驳倒的信号

D: 确认的信号

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

69.现有一新生儿确诊感染乙型肝炎，以下可提示其生母妊娠期间血清学检查结果的是

A：HBeAg为阳性

B：HBsAg为阳性

C：HBsAb，HBeAg均为阳性

D：HBsAg，HBeAg均为阳性

答案：D

70.单核细胞正常参考区间是

A：0.20～0.40

B：0.01～0.05

C：0.03～0.08

D：0～0.01

答案：C

71.（2015年真题）患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，约2～3h一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查，T38.8℃，P118次/分，R28次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0×109～10.0×109），粪便镜检可见红、白细胞。

A：小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

B：腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充

C：药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

D：首选口服补液，必要时静脉补液

答案：C

72.药物不良反应多潘立酮（）

A：睡眠障碍

B：黑便

C：性功能障碍

D: 溢乳现象

答案：D

73.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性减轻疾病症状(一般抑郁症状表现为晨重晚轻)的是

A: 清晨服氨基糖苷类

B: 清晨服利尿药

C: 清晨服抗抑郁药

D: 清晨服糖皮质激素

答案：C

74.用药后2小时内尽量不排尿或局部冲洗的剂型是

A: 泡腾片

B: 阴道栓

C: 舌下片

D: 咀嚼片

答案：B

75.药物经济学研究的4种方法的主要差别在于

A: 所采用的实验研究方法不同

B: 用药成本的不同测量上

C: 对于用药结果的不同测量

D: 计算不同类型的成本

答案：C

76.发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

A: 38.1℃～39℃

B：41℃以上

C：37.4℃～38℃

D：37℃以上

答案：C

77.以下属于急性肾盂肾炎表现的是（）

A：尿液常浑浊、有异味

B：可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

C：老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

D：约30%可出现血尿

答案：C

78.乙醇+呋喃唑酮

A：抑制乙醛脱氢酶

B：造成听神经和肾功能不可逆性损害

C：产生有利的药物相互作用

D：抑制氧化代谢反应

答案：A

79.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见WBC15X109／L，中性粒细胞百分比85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A：慢性肾盂肾炎

B：急性肾盂肾炎

C：急性肾小球肾炎

D：急性膀胱炎

答案：D

80.可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

A：颠茄浸膏片

B：阿司匹林

C：菠萝蛋白酶

D：伪麻黄碱

答案：D

81.能用结论较肯定的药物就不用新药，即

A：禁止用试验性药

B：选用对胎儿危害较小的药物

C：可用可不用的药物应尽量不用或少用

D：用药必须有明确的指征和适应证

答案：A

82.对于铁剂的使用，错误的是

A：口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法?

B：为了补足储存铁，铁剂治疗应该在 Hb 正常后至少再补充铁剂 4～6 个月?

C：钙剂可促进铁剂吸收?

D：口服铁剂宜选用 2 价铁?

答案：C

83.（2019 年真题）患者，女，56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是

A：美托洛尔

B：维拉帕米

C：螺内酯

D: 氯沙坦

答案：A

84.慢性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 1：1000 肾上腺素注射液

B: 第二代非镇静抗组胺药

C: 肾上腺糖皮质激素

D: 第一代抗组胺药

答案：B

85.以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

A: 2%硝酸银

B: 硫酸锌滴眼剂

C: 酞丁安滴眼剂

D: 红霉素眼膏

答案：A

86.老年（≥65 岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

A: 金刚烷胺?

B: 复方左旋多巴?

C: 普拉克索?

D: 苯海索?

答案：B

87.患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA≥20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

A：出现体温身高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/815310300121012033