

2024 江苏省灌云县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题真题题库及答案【历年真题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，32 岁，妊娠 20 周。1 天前发热，体温 39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

- A: 奥司他韦胶囊
- B: 金刚烷胺片
- C: 利巴韦林片
- D: 阿昔洛韦片

答案：A

2. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

- A: 非二氢吡啶类钙拮抗剂
- B: 哌唑嗪
- C: 利尿药
- D: ACEI

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

3. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $< 0.1 \text{ mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是
()

- A: 甲状腺次全切除手术
- B: 碘化钾治疗, 定期复查
- C: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗
- D: 选用 ^{131}I 治疗

答案: C

4. 临床实践验证, 一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此, 在进行排除毒物的同时, 应积极使用特效拮抗剂。

- A: 乙酰胺
- B: 维生素 K1
- C: 阿托品
- D: 维生素 B6

答案: B

5. 下列关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述, 哪一项是错误的

- A: 药疹、瘙痒
- B: 中毒性肝炎
- C: 咽痛、发热
- D: 粒细胞缺乏

答案: C

6. (2019 年真题) 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价, 生产规格为 80 万 U/支的青霉素钠产品, 每支所需的装量是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1.33g

B: 0.48g

C: 2.088mg

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 1.33mg

答案：B

7. 阿糖腺苷属于

A: 抗病毒药

B: 抗真菌药

C: 抗肿瘤药

D: 抗过敏药

答案：A

8. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别的

A: 1 级证据

B: 4 级证据

C: 3 级证据

D: 2 级证据

答案：D

9. 排钾利尿药使心脏对强心苷感受性增强的机制是

A: 协同作用

B: 拮抗作用

C: 敏感化作用

D: 减少不良反应

答案：C

10. 对巨幼细胞贫血者应选用 ()

A: 维生素 K1

B: 甲磺酸去铁胺

C: 富马酸亚铁

D: 叶酸+维生素 B12

答案：D

11. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

A: <120 / 80mmHg

B: <130 / 80mmHg

C: <140 / 90mmHg

D: <140 / 80mmHg

答案：C

12. (2015 年真题) 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是 ()。

A: 亚胺培南西司他丁

B: 阿米卡星

C: 头孢哌酮舒巴坦

D: 头孢拉定

答案：D

13. 抗高血压药物的禁忌证心力衰竭 ()

A: 依那普利

B: 美托洛尔

C: 维拉帕米

D: 氢氯噻嗪

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

14. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9°C。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 头孢吡肟
- B: 莫西沙星
- C: 阿莫西林
- D: 氨苄西林

答案: B

15. (2018 年真题) 患儿, 14 岁, 体重 50kg, 体温 38.7°C, 使用布洛芬退热。单次给药剂量是 ()

- A: 200~400mg
- B: 500~1000mg
- C: 300~600mg
- D: 10~15mg

答案: A

16. 针对该患者的现有症状, 应选用的药物是 ()

- A: 单硝酸异山梨酯缓释片
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 布地奈德吸入剂
- D: 多潘立酮片

答案: B

17. 香豆素类杀鼠药中毒呈现

- A: 呼出气体中可有苦杏仁气味
- B: 抽搐、进行性加重

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 出血、凝血时间延长

D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：C

18. 以下哪项是乳果糖治疗功能性便秘的主要机制

- A: 润滑并刺激肠壁，软化大便
- B: 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便
- C: 在结肠中被消化道菌群转化成低分子量的有机酸，导致肠道内的 pH 下降，并通过渗透作用增加结肠内容量
- D: 润滑肠壁，软化大便和调节稠度

答案：C

19. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

- A: 苯丝肼
- B: 叶酸
- C: 克拉维酸钾
- D: 奥美拉唑

答案：D

20. 以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

- A: 不宜首选治疗急性哮喘
- B: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制
- C: 在治疗 COPD 时不宜单独应用
- D: 不宜用于急性发作

答案：B

21. (2017 年真题) 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是 ()

- A: 蛋白结合率高, 具有手性、分布容积大
- B: 脂溶性高, 分子量小

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

D: 分子量大、弱碱性

答案：B

22. (2015 年真题) 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是 ()

。

A: 塞来昔布

B: 布洛芬

C: 双氯芬酸

D: 吲哚美辛

答案：A

23. 患者，女，30 岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

A: 口服给药

B: 直肠给药

C: 静脉注射

D: 吸入给药

答案：C

24. 一般含服 5 分钟左右；用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的是

A: 含漱剂

B: 阴道栓剂

C: 咀嚼片

D: 舌下片

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

25. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 链霉素
- B: 新霉素
- C: 奈替米星
- D: 妥布霉素

答案：B

26. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

- A: 肾小球滤过率下降
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 结晶沉积
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：A

27. 患儿,女,5岁,误服香豆素灭鼠药,可选用的解救药物是 ()

- A: 维生素 K
- B: 二巯丙醇
- C: 亚甲蓝
- D: 纳洛酮

答案：A

28. 以下对各类处方的描述中，不正确的是

- A: 第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”
- B: 儿科处方印刷用纸颜色为淡绿色、右上角标注“儿科”
- C: 麻醉药品处方印刷用纸颜色为淡红色、右上角标注“麻醉”
- D: 普通处方印刷用纸为白色，右上角无标注

答案：C

29. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘

B: 这是由于发热引发了哮喘

C: 可用肾上腺素治疗

D: 这是阿司匹林中毒的表现

答案：A

30. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 门冬胰岛素

B: 维生素 C

C: 非那雄胺

D: 青霉素

答案：C

31. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 技术性、有效性和经济性

B: 经济性、法律性和合理性

C: 技术性、经济性和合法性

D: 法律性、技术性和经济性

答案：D

32. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1/2 片 qd

B: 1.5 片 qd

C: 1 片 bid

D: 1 片 qd

答案：D

33. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

A: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

B: 严格掌握用药剂量

C: 密切监护

D: 避免食物的影响

答案：A

34. 以下有关肝功能不全病人用药原则的叙述中，不正确的是

A: 特别应避免与肝毒性的药物合用

B: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物

C: 选用从肝脏排泄的药物

D: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案

答案：C

35. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

A: 哌嗪

B: 噻嘧啶

C: 甲苯咪唑

D: 吡喹酮

答案：C

36. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是 ()

- A: 维生素 B
- B: 阿司匹林
- C: 伏立康唑
- D: 铝碳酸镁

答案：B

37. 应提示患者，该药品内附药片，须先溶解再滴眼

- A: 噻托溴铵粉吸入剂
- B: 胰岛素笔
- C: 复方甲硝唑栓
- D: 利福平滴眼剂

答案：D

38. 适用于高血压伴前列腺增生症的高血压患者服用的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 阿利吉仑
- C: 氢氯噻嗪
- D: 多沙唑嗪

答案：D

39. 患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol/L（正常值：3.9~6.1mmol/L），餐后血糖14.8mmol/L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180~440μmol/L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol/L（正常值：2.1~3.1mmol/L），肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 阿卡波糖
- B: 甘精胰岛素
- C: 格列齐特
- D: 二甲双胍

答案：A

40. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 玻璃酸钠滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 聚乙烯醇滴眼液

答案：A

41. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 感冒清热冲剂
- B: 葡萄糖酸锌口服液
- C: 维生素 C 片
- D: 头孢克洛干混悬剂

答案：D

42. (2017 年真题) 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 人促红素
- B: 甲睾酮
- C: 可卡因

D: 哌替啶

答案: A

43. 下列情况的首选药物是高 TC 血症 ()

A: 他汀类

B: 胆酸螯合剂+贝特类

C: 贝特类

D: 弹性酶

答案: A

44. 连续使用易产生耐受性的是

A: 普萘洛尔

B: 氨氯地平

C: 硝酸甘油

D: 哌唑嗪

答案: C

45. 患者，女，62 岁，医师处方如下：

A: 二甲双胍

B: 氯吡格雷

C: 阿卡波糖

D: 氨氯地平

答案: B

46. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

A: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用

B: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性

D: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强

答案：B

47. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 10~20129/ml

B: 40~100 μ g/ml

C: 10~40 μ g/ml

D: 4—121 μ g/ml

答案：B

48. 维生素 E 用于

A: 防治坏血病

B: 防治夜盲症

C: 防治佝偻病

D: 习惯性流产的辅助治疗

答案：D

49. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

A: 直接肾毒性

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾间质纤维化

D: 肾小管阻塞

答案：D

50. 关于口腔溃疡药物治疗的说法，错误的是（）

- A: 氯己定如含漱液，每次 15-20ml，一日 2~3 次含漱
- B: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷，一日 3 次，稍加按摩。
- C: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- D: 西地碘含片，一次 6mg 一日 4 次含服

答案：D

51. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 地西洋
- B: 有机硫类
- C: 阿托品
- D: 间羟胺

答案：C

52. （2019 年真题）患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 格列齐特
- D: 吡格列酮

答案：A

53. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 甲氨蝶呤
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 来氟米特
- D: 环孢素

答案：A

54. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol / L
- B: 3.3~5.5mmol / L
- C: 3.9~6.1mmol / L
- D: 3.5~6.1mmol / L

答案：C

55. 关于治疗肺炎的用药注意事项，叙述不正确的是

- A: 体温正常 48~72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物
- B: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物
- C: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素
- D: 抗菌药物治疗后 48~72h 应对病情进行评价

答案：C

56. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 头孢辛酯片
- B: 莫沙必利片
- C: 伊马替尼片
- D: 双氯芬酸钠片

答案：B

57. 发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于

- A: 五级信息
- B: 四级信息
- C: 二级信息
- D: 三级信息

答案：D

58. 患者,男,45岁,因消化不良(上腹饱胀,餐后明显)来药店咨询。下列说法错误的是()

- A: 进餐时不要摄入过多的液体
- B: 应除外器质性疾病
- C: Hp 感染是引起消化不良的常见原因
- D: 可用助消化药对症治疗

答案：C

59. 以下药物中，妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 苯妥英钠
- B: 辛伐他汀
- C: 甲氨蝶呤
- D: 沙立度胺

答案：D

60. 应用格列本脲时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮酒
- B: 服药期间不宜饮茶
- C: 用药期间宜吃高蛋白食物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：A

61. (引起药源性肾病的药物) 含马兜铃酸的中药可导致

A: 直接肾毒性

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 肾间质纤维化

D: 肾小管阻塞

答案：C

62. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

A: 三唑仑中毒

B: 磷化锌中毒

C: 丙戊酸钠中毒

D: 丙米嗪中毒

答案：B

63. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

A: 促进新药的研制开发

B: 促进临床合理用药

C: 为临床药物评价提供依据

D: 减少 ADR 的危害

答案：B

64. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: C 级

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: B 级

C: A 级

D: D 级

答案: D

65. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

A: 39.1℃~41.0℃

B: 38.1℃~39.0℃

C: 37.4℃~38.0℃

D: 37.0℃~38.3℃

答案: B

66. 以维生素 C 注射液作溶剂溶解后注射的是

A: 谷胱甘肽

B: 亚硝酸钠

C: 盐酸烯丙吗啡

D: 双解磷

答案: A

67. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是（）

A: 滴眼剂

B: 软膏剂

C: 含漱剂

D: 直肠栓剂

答案: D

68. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须冷藏保存
- B: 每次调整 1~4 单位
- C: 每 3~5 天调整 1 次
- D: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

答案：A

69. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

- A: 处方审核
- B: 处方点评
- C: 药物信息服务
- D: 参与健康教育

答案：B

70. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

- A: 抗炎
- B: 解热
- C: 防止冠状动脉血栓形成
- D: 镇痛

答案：C

71. 阻塞性黄疸可呈现

- A: 乳凝块便

- B: 柏油黑便
- C: 鲜血便
- D: 白陶土便

答案：D

72. 患者,女,59岁,绝经后3年,近日出现腰背疼痛,负重时疼痛加剧骨密度T值为-3.5,诊断为骨质疏松每天补充维生素D800IU元素钙500mg同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

- A: 5mg 静脉滴注,每年一次
- B: 5mg 静脉滴注,每周一次
- C: 10mg 口服每日一次
- D: 4mg 静脉滴注,每日一次

答案：A

73. 可用于治疗高氨血症的药物是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 番泻叶
- D: 硫酸镁

答案：A

74. 属于胃黏膜保护剂的是

- A: 替普瑞酮
- B: 三硅酸镁
- C: 哌仑西平
- D: 奥美拉唑

答案：A

75. 告知"坦洛主要用于良性前列腺增生症，不能作为抗高血压药"属于

- A: 新药信息
- B: 禁忌证
- C: 药物相互作用
- D: 药品不良反应

答案：B

76. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 无适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 联合用药不适宜

答案：B

77. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$

。

- A: 奥美拉唑
- B: 维生素
- C: 氨基酸
- D: 维生素 B1

答案：A

78. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu mol / L$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 美托洛尔和赖诺普利
- B: 美托洛尔和辛伐他汀
- C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

答案：D

79. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

- A: 加量使用
- B: 避免应用
- C: 减量使用
- D: 在危及生命时方可使用

答案：C

80. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

- A: 明确诊断，合理选药
- B: 静脉给药可不调整剂量
- C: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- D: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物

答案：B

81. 下列药物中，属于可逆性、选择性单胺氧化酶 A 抑制剂的是（）

- A: 吗氯贝胺
- B: 氟伏沙明
- C: 氯米帕明
- D: 阿米替林

答案：A

82. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
- B: 酚麻美敏口服溶液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药
- C: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
- D: 酚麻美敏口服溶液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

83. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、稍有气促，心率 95 次 / 分，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：双肺呼吸音粗，未闻及明显啰音；发病以来纳差、精神欠佳、二便可、睡眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 右美沙芬可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- B: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多的咳嗽应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果
- C: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，以缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰
- D: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

84. (2021 年真题) 患者,女,58 岁,诊断为骨性关节炎,经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 双氯芬酸
- C: 美洛昔康
- D: 曲马多

答案: D

85. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 辛伐他汀
- C: 磺胺类药物
- D: 硫酸亚铁

答案: B

86. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 粪肠球菌
- B: 变形杆菌
- C: 大肠杆菌
- D: 葡萄球菌

答案: C

87. 杨某, 男性, 25 岁, 间断上腹痛 2 年, 表现为两餐之间出现上腹痛, 持续至下餐进餐后缓解, 以秋冬季多发。

- A: 奥美拉唑?
- B: 碳酸氢钠?
- C: 克拉霉素?

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 氯化氢?

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/815342030114012033>