

2024 广西壮族自治区宜州市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题附参考答案（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 慢性失血性贫血
- D: 神经炎

答案：D

2. 治疗铜绿假单胞菌感染选用()

- A: 多西环素
- B: 红霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 庆大霉素

答案：D

3. 氨茶碱的主要平喘机制为

- A: 激活鸟苷酸环化酶
- B: 抑制腺苷酸环化酶
- C: 直接舒张支气管
- D: 松弛气道平滑肌

答案：D

4. 以下避孕药不受月经周期限制的是

- A: 孕二烯酮
- B: 双炔失碳酯
- C: 左炔诺孕酮
- D: 去氧孕烯

答案：B

5. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

- A: 绦虫病
- B: 蛔虫病和蛲虫病
- C: 疟疾
- D: 蛲虫病

答案：B

6. 具有强大的抗凝血因子 XA 功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

- A: 阿加曲班
- B: 尿激酶
- C: 华法林
- D: 那屈肝素钙

答案：D

7. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

答案：B

8. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

- A: 氢氧化镁
- B: 氢氧化铝
- C: 碳酸钙
- D: 三硅酸镁

答案：B

9. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的
是

- A: 阿奇霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 氟曲南

答案：C

10. 茚地那韦的作用靶点是

- A: 神经氨酸酶
- B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: HIV-1 反转录酶

答案：B

11. 与唑来膦酸合用可增加多发性骨髓瘤患者发生肾功能不全风险的谷
氨酸衍生物是

- A: 抗血管生成药
- B: 萘普生
- C: 高钙食品

D: 沙利度胺

答案: D

12. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A: 依诺沙星可抑制茶碱代谢

B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

C: 可使用大环内酯类药物如红霉素

D: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

答案: C

13. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

A: 乳房触痛或增大

B: 体重增加

C: 突破性出血

D: 白带增多

答案: C

14. 下列哪种药物属于抑菌药

A: 头孢氨苄

B: 庆大霉素

C: 青霉素 G

D: 四环素

答案: D

15. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: IV 型变态反应
- B: II 型变态反应
- C: I 型变态反应
- D: III 型变态反应

答案: C

16. 肝功能不全、哺乳期妇女禁用 ()

- A: 夫西地酸
- B: 利福平
- C: 氯霉素
- D: 四环素可的松

答案: A

17. 有关维生素 K 的描述，错误的是

- A: 天然维生素 K 为脂溶性
- B: 参与凝血因子的合成
- C: 维生素 K
- D: 对于应用链激酶所致出血有特效

答案: D

18. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是 ()

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 那格列奈
- D: 瑞格列奈

答案：A

19. 氯霉素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- D: 影响胞浆膜通透性

答案：C

20. 儿童使用强效激素制剂，连续使用不应超过

- A: 4 周
- B: 3 周
- C: 1 周
- D: 2 周

答案：D

21. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是()

- A: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗
- B: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染
- D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：D

22. 属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

- A: 地屈孕酮
- B: 戊酸雌二醇
- C: 依普黄酮
- D: 他莫昔芬

答案：B

23. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

- A: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦
- B: 糖尿病、高血压患者禁用
- C: 妊娠期妇女禁用利巴韦林
- D: 相应药物过敏者禁用

答案：B

24. ()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 万古霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

答案：A

25. 下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 泮托拉唑

答案：A

26. 属于 H₁ 受体阻断药，用于季节性 & 常年性过敏性鼻炎的预防与治疗的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 过氧化氢
- C: 克罗米通
- D: 酮替芬

答案：D

27. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 利妥昔单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

28. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 拉坦前列素
- B: 布林佐胺
- C: 阿托品
- D: 奥布卡因

答案：C

29. 存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 泼尼松
- B: 表柔比星
- C: 多西他赛
- D: 卡莫司汀

答案：C

30. 助消化药不包括

- A: 乳酶生
- B: 胰酶
- C: 多潘立酮
- D: 乳酸菌素

答案: C

31. 顺铂

- A: 干扰 RNA 转录
- B: 影响蛋白质合成和功能
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案: D

32. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- B: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- C: 抗肿瘤作用比紫杉醇强
- D: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案: D

33. 扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是 ()

- A: 尼莫地平
- B: 非洛地平

C: 拉西地平

D: 氨氯地平

答案: A

34. 下列头孢菌素药物中，半衰期最长的药物是

A: 头孢氨苄

B: 头孢克洛

C: 头孢曲松

D: 头孢孟多

答案: C

35. 氟他胺适用于治疗()。

A: 绒毛膜上皮癌

B: 晚期睾丸肿瘤

C: 急性淋巴细胞白血病

D: 晚期前列腺癌

答案: D

36. 用于浸润麻醉、神经阻滞的局部麻醉药是

A: 普鲁卡因

B: 西地碘

C: 利多卡因

D: 布地奈德

答案: A

37. 患者，男，68 岁。发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠、气急。近 2 天全身散在出血点及淤斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A: 维生素 C
- B: 低分子量肝素
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K

答案：C

38. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

- A: 复方氨基酸注射液(18AA)
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 精氨酸

答案：C

39. 以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

- A: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- B: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- C: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- D: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：A

40. 神经毒性较严重的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 奥沙利铂
- C: 卡铂
- D: 顺铂

答案：B

41. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

A: 聚乙二醇 4000

B: 甘油

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案：D

42. 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

A: 二磷酸果糖注射液

B: 葡萄糖注射液

C: 门冬氨酸钾镁注射液

D: 乳酸钠注射液收售，

答案：A

43. 口服存在首关效应的药物是

A: 羧甲司坦

B: 乙酰半胱氨酸

C: 溴己新

D: 氨溴索

答案：B

44. 二磷酸果糖注射液禁用的人群是

A: 高磷血症者

B: 高钾血症者

C: 高镁血症者

D: 高尿酸血症者

答案：A

45. 属于 CYP2C9 的诱导剂，可以减少氟伐他汀的生物利用度 50% 的是

- A: 地高辛
- B: 利福平
- C: 红霉素
- D: 烟酸

答案：B

46. 下列不属于硝基呋喃类抗菌药物的不良反应是()

- A: 发热
- B: 头痛
- C: 腹泻
- D: 呕吐、食欲减退

答案：A

47. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 氨氯地平
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

答案：D

48. 青霉素用于()

- A: 伤寒、副伤寒
- B: 钩端螺旋体病
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 布鲁菌病

答案：B

49. 可拮抗阿托品所致的心动过速的是

- A: 美西律
- B: 地尔硫䷀
- C: 地高辛
- D: 普萘洛尔

答案：B

50. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A: 可预测抗凝效果，无需监测 INR
- B: 选择性高
- C: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶
- D: 治疗剂量下不会引起血小板减少

答案：C

51. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素
- B: 抗菌药物与糖皮质激素合用
- C: 抗结核药与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素替代疗法

答案：D

52. （2015 年真题）可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是（）

。

- A: 甲状腺片
- B: 复方碘口服液
- C: 甲巯咪唑片
- D: 卡比马唑片

答案：C

53. 属于叶酸类抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨
- D: 巯嘌呤

答案: B

54. 下列不属于肽类抗生素的是

- A: 万古霉素
- B: 多黏菌素 B
- C: 去甲万古霉素
- D: 利奈唑胺

答案: D

55. (2019 年真题) 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

- A: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- B: NSAIDS 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
- C: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- D: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

答案: D

56. 润滑性泻药()

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 甘油

D: 地芬诺酯

答案: C

57. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A: M 胆碱受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 白三烯受体阻断剂

D: 长效 B₂ 受体激动剂

答案: A

58. 与 α_1 受体阻断剂无相互作用的药物是

A: 西咪替丁

B: 第三代头孢菌素

C: 卡马西平

D: 地尔硫

答案: B

59. 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

A: 中枢镇静作用较强

B: 对有机磷中毒解救作用强

C: 对眼的作用强

D: 对胃肠道平滑肌作用强

答案: A

60. 下列不属于一线抗结核药的是

A: 吡嗪酰胺

B: 链霉素

C: 利福平

D: 乙硫异烟胺

答案: D

61. 服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

A: 维生素 A

B: 糜蛋白酶

C: 鱼精蛋白

D: 维生素 K

答案: D

62. 与长春新碱合用可产生严重的周围神经病

A: 铂类

B: 异烟肼

C: 替尼泊苷

D: 非格司亭

答案: D

63. 甲氧沙林属于

A: 重金属元素及其化合物

B: 其他光敏剂

C: 肾上腺皮质激素类

D: 补骨脂素及其衍生物

答案: D

64. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。关于万古霉素的儿童日剂量，正确的是（）

- A: 5mg/kg
- B: 60mg/kg
- C: 40mg/kg
- D: 15mg/kg

答案：C

65. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

- A: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱
- B: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱
- C: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱
- D: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

答案：A

66. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 甲睾酮
- C: 丙酸睾酮
- D: 非那雄胺

答案：A

67. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 地塞米松
- D: 右美沙芬

答案：D

68. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 沙美特罗
- B: 孟鲁司特
- C: 噻托溴铵
- D: 多索茶碱

答案：A

69. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 氯吡格雷
- B: 替罗非班
- C: 噻氯匹定
- D: 替格雷洛

答案：C

70. 长期服用呋塞米易发生的不良反应是（）

- A: 低尿酸血症
- B: 高钠血症
- C: 高氯血症
- D: 低钾血症

答案：D

71. 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁，出现窦性心动过缓，原因（）

- A: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：D

72. 引起妇女面部和躯体的多毛症，男性若长期应用，可表现为男子女性乳房的是()

- A: 非那雄胺
- B: 普适泰
- C: 十一酸睾酮
- D: 特拉唑嗪

答案：C

73. 羟基脲属于()

- A: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- B: 核苷酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: DNA 多聚酶抑制剂

答案：B

74. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿昔莫司
- D: 非诺贝特

答案：D

75. 可同时作用于胰岛 α 、 β 细胞的是

- A: 胰岛素
- B: 格列本脲
- C: 西格列汀

D: 二甲双胍

答案: C

76. (2017 年真题) 在痛风急性期禁用的药物是 ()

A: 秋水仙碱

B: 布洛芬

C: 别嘌醇

D: 舒林酸

答案: C

77. 关于第一、二、三、四代头孢菌素类抗菌药物药理作用的叙述，错误的是

A: 第三代头孢菌素对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，但对 β -内酰胺酶不稳定

B: 第二代头孢菌素对铜绿假单胞菌无效，对多种 β -内酰胺酶较稳定

C: 第四代头孢菌素对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌显示广谱抗菌活性

D: 第一代头孢菌素对青霉素酶稳定，但可被革兰阴性菌产生的 β -内酰胺酶所破坏

答案: A

78. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应

A: 白细胞减少

B: 眼部水肿

C: 中枢神经系统毒性

D: 白细胞增高

答案: C

79. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 克林霉素
- B: 多黏菌素
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：D

80. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 舍尼通
- B: 多沙唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 十一酸睾酮

答案：D

81. 头孢类药物作用机制

- A: 抑制细菌蛋白质合成
- B: 抑制细菌糖代谢
- C: 抑制细菌细胞壁合成
- D: 干扰细菌核酸代谢

答案：C

82. 下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

- A: 毛花苷丙
- B: 地高辛
- C: 毒毛花苷 K
- D: 洋地黄毒苷

答案：D

83. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 红霉素

答案：A

84. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 呋喃妥因
- B: 利奈唑胺
- C: 甲氧苄啶
- D: 磺胺甲唑

答案：C

85. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

- A: 水肿
- B: 光过敏
- C: 干咳
- D: 低血糖

答案：C

86. 高钠血症是指

- A: 血钠>135mmol/L
- B: 血钠>145mmol/L
- C: 血钠>130mmol/L

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 血钠 $>140\text{mmol/L}$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/816013121055011030>