

1. 关于先心病儿童的个性心理特征表现，错误的叙述是

- A. 性格内向
- B. 情绪不稳
- C. 依赖心理增强
- D. 明显的恐怖感
- E. 记忆力强

正确答案：

E

2. 关于侵蚀性葡萄胎的叙述，正确的是

- A. 多继发于人工流产后
- B. 转移灶最常见的部位是肺部
- C. 肺部声称灶表现为紫蓝色结节
- D. 最主要的症状是停经后阴道出血
- E. 侵蚀性葡萄胎是一种良性滋养细胞疾病

正确答案：

B

3. 患者，男性， 45 岁。痛风病史 8 年，该患者不 需要加以限制的食物是

- A. 豆腐、蘑菇
- B. 土豆、鸡汤
- C. 红酒、牛排
- D. 鸡胗、米饭
- E. 水、马铃薯

正确答案：

E

4. 患者，男性， 60 岁。进行性黄疸 2 个月。诊断为胰头癌，行胰十二指肠切除术，术后 5 天蓦地浮现上腹疼痛，腹腔穿刺抽出含胆汁的液体少许。患者可能浮现了

- A. 膈下脓肿
- B. 术后急性腹膜炎
- C. 嵌顿性内疝
- D. 胆囊穿孔
- E. 胰、空肠吻合口瘘

正确答案：

E

5. 患者男， 72 岁。因急性前壁心肌梗死收入院。入院后已行面罩吸氧，建立静脉通路，心电监护示频发，多源性室性早搏，护士在床边准备抢救用品， 最重要的是

- A. 血氧饱和度仪
- B. 气管切开包
- C. 吸痰器
- D. 除颤仪
- E. 呼吸机

正确答案：

D

6. 深Ⅱ度烧伤局部损伤的深度达：（）

- A. 表皮层，生发层健在
- B. 表皮层，甚至真皮乳头层
- C. 真皮深层，有皮肤附件残留
- D. 脂肪层
- E. 脂肪下层

正确答案：

C

7. 患者，男性， 55 岁。慢性肾盂肾炎 4 年，今因 腰痛、低热就诊。其中与发病密切相关的护理资料是

- A. 男性
- B. 年龄
- C. 职业
- D. 口服激素
- E. 患有前列腺肥大症

正确答案：

E

8. 1 岁小儿，因气管异物窒息入院。治疗中并发脑水肿，遵医嘱使用20%的甘露醇。护士向家长解释使用此药物的作用是

- A. 迅速降颅压，预防脑疝
- B. 预防颅内出血
- C. 预防颅内感染
- D. 促进脑细胞代谢
- E. 兴奋呼吸中枢

正确答案：

A

9. 患儿， 2 岁。诊断为动脉导管未闭。对该患儿 家长做健康指导时，不妥的是

- A. 建立合理的生活制度
- B. 充分运动，增强体质
- C. 合理营养，促进生长
- D. 预防呼吸道感染
- E. 指导定期复诊

正确答案：

B

10. 贫血病人的护理评估，其伴有身心状况下列哪项除外：（）

- A. 消化系统症状
- B. 低热
- C. 呼吸艰难
- D. 注意力不集中
- E. 单位时间内心排出量减少

正确答案：

B

11. 患者男， 35 岁。急性髓系白血病，应用高三尖杉酯做化疗。静脉滴注该药物时的最佳滴数是低于

- A. 20 滴/分钟

- B. 40 滴/分钟
- C. 50 滴/分钟
- D. 60 滴/分钟
- E. 70 滴/分钟

正确答案:

B

12. 毒蛇咬伤首先要做的是: ()

- A. 包扎伤口
- B. 伤口排毒
- C. 即将转运病人
- D. 病情观察
- E. 伤肢制动放低肢体

正确答案:

E

13. 患者女性, 35 岁, 因活动后有呼吸艰难, 近半年有进行性加重, 并伴有咳嗽, 声音嘶哑, 既往患者有风湿热, 常有扁桃体炎发生, 考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。风湿性心脏病二尖瓣狭窄心电图表现正确的是

- A. P 波消失, 代之以大小、形态不一的 f 波
- B. P 波消失, 代之以锯齿状 F 波
- C. P 波变窄, P 波宽度
- D. 二尖瓣型 P 波, P 波宽度 >0.12 秒
- E. P 波提早浮现, 形态与窦性不同

正确答案:

D

14. 使用冰槽时, 为防止冻伤 需保护的部位是

- A. 前额
- B. 颞部
- C. 头顶
- D. 耳部
- E. 面颊

正确答案:

D

15. 支气管扩张 的早期病理改变是

- A. 柱状扩张
- B. 气管扭曲
- C. 气管坏死
- D. 气管穿孔
- E. 空洞形成

正确答案:

A

16. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘

E. 口干
正确答案：
D

17. 建立良好医护关系的原则是双方应相互

A. 依存
B. 独立
C. 监督
D. 尊重
E. 补充
正确答案：
D

18. 患者女，40岁。近1个月来自觉疲惫，无力，头晕，医嘱硫酸亚铁溶液口服，为减少不良反应正确的给药知道是

A. 饭前服用
B. 直接喝取
C. 茶水送服
D. 牛奶送服
E. 服药后及时漱口
正确答案：
E

19. 患儿，男，6个月。支气管肺炎，半天来蓦地烦躁不安，口周发绀，有鼻扇及三凹征。体检：呼吸72次/分，心率180次/分，5cm低钝，两肺大量细湿罗音，肝肋下3.5cm，该患儿最可能的并发症是

A. 脓胸
B. 肺不张
C. 脓气胸
D. 肺大泡
E. 急性心力衰竭
正确答案：
E

20. 某护士在急诊科工作13年，由于工作长期处于紧张状态，在患者行动不便时还有协助搬运患者，劳动强度较大，时常感到身心疲惫，。近期腰部不适加重，检查为腰间盘突出。导致其损伤的职业因素属于（）

A. 化学性因素
B. 生物性因素
C. 放射性因素
D. 机械性因素
E. 心理因素
正确答案：
D

21. 某产妇，足月产后3天，浮现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底位于脐上1指，子宫体软。以下护理措施中，错误的是

A. 做好会阴护理
B. 半卧位或者抬高床头
C. 检测体温变化

- D. 做好心理支持
- E. 红外线照射会阴部每日 3 次，每次 1 小时

正确答案：

E

22. 患者女， 3 岁患法洛四联症，心功能 IV 级， 护士建议其家长该患儿最佳的手术时机是

- A. 即将
- B. 择期
- C. 学龄前
- D. 成年后
- E. 心功能改善后

正确答案：

E

23. 患者女， 31 岁，车祸造成损伤性血胸， 来院后即将为其行胸腔闭式引流术，现有引流一处，在术后观察中，引流量(血量)为多少时护士应立即报告医生提示患者有进行性血胸的可能

- A. 30ml/h
- B. 50ml/h
- C. 100ml/h
- D. 150ml/h
- E. 200ml/h

正确答案：

E

24. 急性胰腺炎患者应慎用的药物是

- A. 钙剂
- B. 奥曲肽
- C. 吗啡
- D. 生长抑素
- E. 洛赛克

正确答案：

C

25. 做碘过敏试验的时间应在碘化物造影检查前

- A. 2 周
- B. 1 周
- C. 3~5 天
- D. 2~3 天
- E. 1~2 天

正确答案：

E

26. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是

- A. 青霉素
- B. 黄连素
- C. 制霉菌素
- D. 蒙脱石散
- E. 双歧杆菌

正确答案：

D

27. 对于正常新生儿的心理护理，错误的是

- A. 母婴同室
- B. 父亲应参预照应婴儿
- C. 保持肃静不与新生儿说话
- D. 时常与新生儿进行目光交流
- E. 给色彩明艳会转动的玩具看

正确答案：

C

28. 早产儿生理性黄疸血胆红素如果高于下列哪项数值，需要进行进一步检查以判断是否为病理性黄疸（）

- A. 340 $\mu\text{mol/L}$
- B. 205.2 $\mu\text{mol/L}$
- C. 256 $\mu\text{mol/L}$
- D. 522 $\mu\text{mol/L}$
- E. 119 $\mu\text{mol/L}$

正确答案：

C

29. 血液病继发感染的护理措施中，错误的是：（）

- A. 用紫外线行空气消毒，每日 2 次
- B. 女性清洗会阴，每日 2 次
- C. 鼻腔内涂抗生素软膏，每日 2 次
- D. 常规测体温，每日 2 次
- E. 餐前餐后，睡前晨起用漱口水漱口

正确答案：

D

30. 属于氨中毒引起肝性脑病的主要机制是

- A. 氨导致蛋白质代谢障碍
- B. 氨干扰脑的能量代谢
- C. 氨取代正常神经递质
- D. 氨引起神经传导异常
- E. 氨使氨基酸代谢不平衡

正确答案：

B

31. 对于下肢急性深静脉血栓形成患者，正确的护理措施是

- A. 床上活动
- B. 卧床歇息，患肢抬高
- C. 行走练习
- D. 患肢热敷
- E. 按摩，促进血液循环

正确答案：

B

32. 孕妇，29岁。尿hCG阳性，超声检查：宫内孕6周，对其孕期健康指导正确的是

- A. 妊娠初期 8 周内谨慎用药
- B. 28 周后每天数胎动 1 次
- C. 妊娠 12~28 周避免性生活
- D. 胎心率在 160~180 次 / 分
- E. 妊娠 30 周后进行乳房护理

正确答案:

A

33. 可以使用肛温测量患者体温的情况是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 痔 疮术后
- C. 肝昏迷
- D. 心肌梗死
- E. 直肠术后

正确答案:

C

34. 尿路感染女性发病率高于男性, 是因为女性尿道较男性尿道

- A. 短而宽
- B. 长而窄
- C. 扁而平
- D. 宽而长
- E. 短而窄

正确答案:

A

35. 检测红细胞沉降率应使用的容器是

- A. 干燥试管
- B. 抗凝试管
- C. 血培养瓶
- D. 乳酸钠试管
- E. 液状石蜡试管

正确答案:

B

36. 患者男, 26 岁, 血友病 16 年, 胃大部份切除术后 2 小时浮现烦躁不安, 术口敷料渗血, 值班护士首先应采取的措施是

- A. 监测血糖变化
- B. 监测生命体征
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 查看患者病历
- E. 查看四肢活动情况

正确答案:

B

37. 患者女, 44 岁, 敏感多疑, 怀疑单位同事故意和她作对, 故意给其工作和生活设置障碍, 近期经常听到耳边有人说话, 对其行为进行评论, 护士对其心理护理中, 正确的是

- A. 时常与患者讨论单位同事对她的评价
- B. 明确告诉患者没有人陷害她
- C. 与患者争辩其说话的对象不存在

- D. 耐心倾听患者诉说，尽量满足患者合理要求
- E. 在患者面前应低声交谈，以免引起患者猜疑

正确答案：

D

38. 患者男，26岁。以肺炎入院，赋予抗生素治疗。一周以来体温向来维持在39到40度，24小时波动范围不超过1度，此热型属于

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 药物热

正确答案：

A

39. 孕妇发生早产时容易变得焦虑，主要是因为担心

- A. 难产
- B. 胎儿畸形
- C. 产程延长
- D. 早产儿的预后
- E. 宫缩乏力

正确答案：

D

40. 患者，男性，49岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，浮现恶心、呕吐，多汗、流涎、瞳孔缩小，呼吸艰难、大汗、肺水肿、惊厥等症状。全血胆碱酯酶活力降至30%以下，在治疗时使用阿托品静脉给药。“阿托品化”的指标是

- A. 瞳孔缩小
- B. 心率减慢
- C. 颜面潮红、口干
- D. 皮肤潮湿
- E. 肺部湿啰音明显

正确答案：

C

41. 患者男，28岁。精神分裂症。第2次复发住院治疗后拟于明日出院。护士在对患者进行出院指导时，应首先重点强调的是

- A. 规律生活
- B. 锻炼身体
- C. 加强营养
- D. 维持药物治疗
- E. 参预社会工作

正确答案：

D

42. 患者：“我每天都要喝一点酒。”护士：“请问您每天具体喝多少？”护士使用的沟通技巧是

- A. 叙述
- B. 重复
- C. 澄清
- D. 反映

E. 反馈
正确答案：
C

43. 处理不协调性宫缩乏力，错误的方法是

- A. 调整宫缩
 - B. 恢复子宫收缩的协调性
 - C. 可肌注哌替啶 50~100mg
 - D. 静滴缩宫素
 - E. 有胎儿窘迫，应行剖宫产
- 正确答案：
D

44. 患者女，32岁。因白带增多伴下腹坠痛3个月就诊，诊断为宫颈柱状上皮异位，2日前行宫颈锥形切除术。护士指导患者出院后禁止性生活及盆浴的时间应是

- A. 1个月
 - B. 2个月
 - C. 3个月
 - D. 4个月
 - E. 5个月
- 正确答案：
B

45. 患者女性，36岁，行子宫肌瘤手术前导尿并留置导尿管的目的是

- A. 排空膀胱避免手术损伤
 - B. 测定残尿
 - C. 采集尿液以作细菌培养
 - D. 排除尿液以解除痛苦
 - E. 保持会阴部清洁干燥
- 正确答案：
A

46. 患儿男，3岁。奔跑时摔倒，诊断为左前臂闭合骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止，护士提供正确的心理护理措施是

- A. 安慰，解释治疗的重要性
 - B. 请患儿妈妈进入留观室陪伴
 - C. 让患儿听舒缓的音乐
 - D. 询问患儿需求，赋予满足
 - E. 请主治医师与患儿交谈
- 正确答案：
B

47. 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈
 - B. 躯干糠皮样脱屑
 - C. 皮疹多在发热2天后浮现
 - D. 疹间无正常皮肤
 - E. 多为持续性高热
- 正确答案：

A

48. 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时，输液速度宜控制在

- A. 10~20 滴/分钟
- B. 20~30 滴/分钟
- C. 30~40 滴/分钟
- D. 40~50 滴/分钟
- E. 50~60 滴/分钟

正确答案：

B

49. 患者男，30岁。阿米巴痢疾，医嘱：前泪腺增生，尿潴留“来院就诊，遵医嘱行留置导尿术。正确的操作方法是

- A. 导尿管插入尿道的长度为4—6cm
- B. 插尿管时见尿后再插入2cm
- C. 插导尿管遇到阻力时应竭力快速插入
- D. 第一次放尿不可超过800ml
- E. 集尿袋放置应高于耻骨联合

正确答案：

B

50. 患者男，35岁。胃肠道术后第1天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

正确答案：

C

51. 可浮现持续性青紫的先天性心脏病是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 动脉导管未闭
- E. 法洛四联症

正确答案：

E

52. 患者男，40岁。因为溃疡穿孔“毕Ⅰ式胃大部切除术”。现术后4天，主诉腹部胀痛，恶心，住手排气排便。查体：全腹膨隆，未见肠型，中上腹轻度压痛及肌紧张，肠鸣音消失。最重要的处理措施是

- A. 镇痛
- B. 胃肠减压
- C. 补液
- D. 半卧位
- E. 应用抗生素

正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816022240054010045>