专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省大田县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试大全（易错题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

A：过氧苯甲酰

B：异维A酸

C：阿达帕林

D：维胺酯

答案：A

2.患者，男，72岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A：氯吡格雷

B：比索洛尔

C：硝酸异山梨酯舌下片

D：普伐他汀

答案：C

3.用于治疗二氮类药物中毒的特殊解毒剂是()

A：青霉胺

B：纳洛酮

C：氟马西尼

D：乙氟胺

答案：C

4.患者男62岁无吸烟饮酒史患高血压、高脂血症数年,未治疗。半年前就诊查肝肾功能正常,按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示息AST145U/L,ALT134/L,排除了其他疾病因素后停用阿托伐他汀肝功能逐步恢复正常。二个月后,改用普伐他汀,再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应与他汀类药物之间的因果关系应评价为()

A: 可能

B: 肯定

C: 很可能

D: 可能无关

答案：B

5.由细菌引起的急性卡他结膜炎可选用

A: 2%色甘酸钠滴眼剂

B: 0.1%碘苷滴眼剂

C: 0.1%羟苄唑滴眼剂

D: 四环素眼膏

答案：D

6.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用：

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 多巴丝肼

D: 左旋多巴

答案：B

7.以下治疗沙眼的药物中，对急性结膜炎者忌用的是()。

A: 硫酸锌滴眼剂

B: 红霉素眼药膏

C: 酞丁安滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案：A

8.抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的"盐"1μg作为1IU抗生素是

A: 四环素

B: 红霉素

C: 土霉素

D: 链霉素

答案：A

9.躯干部出现鞭打状色素沉着

A: 氟尿嘧啶

B: 柔红霉素

C: 白消安

D: 博来霉素

答案：D

10.阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

A: 结晶沉积

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 前列腺素合成障碍

D: 肾小球滤过率下降

答案：C

11.“以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对问题进行确定并归类

C: 确立有效的检索方法、查阅文献

D: 对文献进行评价、分析和整理

答案：D

12.男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 糖皮质激素

B: 布洛芬

C: 抗菌药物

D: 阿司匹林

答案：A

13.下列症状不属于高血压临床表现的是

A: 头痛

B: 头晕

C: 口干

D: 心悸

答案：C

14.应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

A: 上市3年以内的药品

B: 上市5年以内的药品

C：上市5年以上的药品

D：国家重点监测的药品

答案：C

15.老年患者对低血糖的耐受能力差，不建议使用的降糖药是

A：磺酰脲类促胰岛素分泌剂

B：胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物

C：α-葡萄糖苷酶抑制剂

D：二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂

答案：A

16.预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

A：硝苯地平

B：利伐沙班

C：胺碘酮

D：去乙酰毛花苷

答案：D

17.根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是()

A：BMI≤18.5

B：BMI<21.5

C：BMI≥28.0

D：BMI≥24.0

答案：C

18.（2018年真题）干眼症可选用（）

A：七叶洋地黄双苷滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 氧氟沙星滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：D

19.重组人促红素需要的特殊贮存条件是

A: 遮光

B: 不宜振摇

C: 低温

D: 密闭

答案：B

20.以下哪项是乳果糖治疗功能性便秘的主要机制

A: 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便

B: 润滑肠壁，软化大便和调节稠度

C: 润滑并刺激肠壁，软化大便

D: 在结肠中被消化道菌群转化成低分子量的有机酸，导致肠道内的pH下降，并通过渗透作用增加结肠内容量

答案：D

21.呋塞米

A: 宜餐后服用

B: 宜清晨服用

C: 宜餐前服用

D: 宜睡前服用

答案：B

22.下列常见的外文缩写，其含义是"立即"的是

A: St

B: ss

C: Dos

D: Sol

答案：A

23.比沙可啶适用于

A: 功能性便秘

B: 习惯性便秘

C: 急性便秘

D: 低张力性便秘

答案：B

24.与黄连上清丸不宜联用的药物是

A: 乳酶生

B: 氢氧化铝

C: 氨茶碱

D: 苯巴比妥

答案：A

25.较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

A: 比沙可啶

B: 酮康环孢素唑

C: 环孢素

D: 布洛芬

答案：B

26.COMT 抑制剂

A：左旋多巴

B：恩托卡朋

C：司来吉兰

D：苯海索

答案：B

27.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A：一次性尽量提供更多的信息

B：尽量避免使用专业术语

C：认真聆听

D：可提供一些宣传资料

答案：A

28.巴比妥类药物重度中毒的表现是

A：意识障碍、昏迷

B：抽搐反复发作

C：恶心、呕吐、视力模糊

D：呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：A

29.钙制剂+维生素D+双膦酸盐用于治疗

A：原发性骨质疏松症

B：妇女绝经后骨质疏松症

C：老年性骨质疏松症

D：抗癫痫药所致的骨质疏松症

答案：C

30.透析患者宜在两餐中间服用的药物是

A：磷结合剂

B：促红细胞生成素

C：铁剂

D：维生素D

答案：C

31.患者，女，51岁，体检时发现血压160／105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol／L（正常参考范围＜7.8mmol／L），三酰甘油1.52mmol／L（正常参考范围0.56～1.70mmol／L），总胆固醇6.26mmol／L（正常参考范围＜5.2mmol／L），低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol／L（正常参考范围2.1～3.1mmol／L），高密度脂蛋白胆固醇1.20mmol／L（正常参考范围1.20～1.65mmol／L），血肌酐50μmol／L（正常参考范围45～84μmol／L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A：复方利血平

B：氢氯噻嗪

C：依那普利

D：特拉唑嗪

答案：C

32.（2015年真题）冠状动脉粥样硬化心脏病的患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为二级预防，最佳剂量范围是（）。

A：25～50mg/d

B：75～150mg/d

C：150～300mg/d

D：25～75mg/d

答案：B

33.除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

A：地西泮

B：卡马西平

C：谷维素

D：氟西汀

答案：A

34.下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

A：病因未明用药

B：感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素

C：应用两种或两种以上一药多名的药物

D：忽略药品说明书提示用药

答案：B

35.患者男性，30 岁，确诊哮喘入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

A：H1 受体阻断剂

B：抗胆碱药物

C：β2 受体激动剂

D：β 受体阻断剂

答案：D

36.评价肾功能的可靠指标是

A：尿液肌酐

B：尿素氮

C：血清肌酐

D：尿液酸碱度

答案：C

37.麻醉药品处方印刷用纸是

A：淡红色

B：淡绿色

C：淡橙色

D：淡黄色

答案：A

38.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A：慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至2～4.5小时

B：肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

C：月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

D：假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：B

39.中效低精蛋白锌胰岛素的作用峰时为()。

A：6～12小时

B：0.25～0.5小时

C：1.5～4小时

D：0.6～1.5小时

答案：A

40.（2018年真题）根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为（）

A：50mg

B：500~600mg

C：2000~4000mg

D：100mg

答案：B

41.新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

A：年龄因素

B：性别因素

C：基础疾病因素

D：遗传因素

答案：A

42.慢性肝炎尤其是肝硬化时，肝功能检查结果可能显示的是

A：AST上升幅度大

B：AST、ALT同时上升

C：ALT上升幅度大

D：AST上升幅度高于ALT

答案：D

43.体操运动员使用后，可减慢心率、减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

A：依那普利

B：氢氯噻嗪

C：阿替洛尔

D：利血平

答案：C

44.适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 雌孕激素序贯用药

C: 单纯孕激素补充治疗

D: 单纯雌激素补充治疗

答案：A

45.药师在调剂工作中，首先要审核处方的

A: 用药适宜性

B: 合法性

C: 完整性

D: 规范性

答案：B

46.淋巴细胞正常参考区间是

A: 0.005～0.05

B: 0.20～0.40

C: 0.03～0.08

D: 0～0.01

答案：B

47.关于抗抑郁药的合理使用，下列说法错误的为（）

A: 多数需要至少2周才会起效

B: 如单药治疗无效时，考虑两种作用机制不同的抗抑郁药联合使用

C: 不能突然停止使用，以避免出现症状反弹和戒断综合征

D: 在单胺氧化酶抑制剂停用的14天内不能使用SSRIs等抗抑郁药物

答案：B

48.服用华法林、利福平可呈现

A: 白陶土便

B: 黄色

C: 橘红至红色

D: 红至黑色

答案：C

49.沙眼的病原体为

A: 病毒

B: 衣原体

C: 支原体

D: 细菌

答案：B

50.引起"苯妥英钠半衰期为30～40h，羟化酶缺乏者一半剂量即出现神经毒性"是

A: 遗传因素

B: 年龄

C: 性别

D: 基础疾病

答案：A

51.餐前服用，可以促进胃排空的药品是

A: 二甲双胍片

B: 复方铝酸铋片

C: 瑞舒伐他汀片

D: 甲氧氯普胺片

答案：D

52.（2017年真题）高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于（）

A: 双侧肾动脉狭窄患者

B: 胃溃疡患者

C: 心力衰竭患者

D: 痛风患者

答案：D

53.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

B: 注意关节保暖

C: 应适当减轻体重

D: 遵医嘱，不得自行增加剂量

答案：A

54.妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上的异常而造成胎儿畸形的阶段是

A: 妊娠1～12周

B: 妊娠13～27周

C: 妊娠28～32周

D: 妊娠1～2周

答案：A

55.（2016年真题）患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为（）。

A: 0.1g，tid

B: 0.5g，tid

C: 0.2g，qd

D: 0.5g，qd

答案：A

56.下列不属于尿液检查项的是

A: LEU

B: PRO

C: BL

D: ALT

答案：D

57.如果ACEI引起干咳可

A: 慎用甲基多巴

B: 停用ACEI或减量

C: 给予硫酸亚铁

D: 联用他汀类

答案：C

58.适用于L-dopa治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A: 恩托卡朋

B: 苯海索

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

答案：A

59.下列药物中适宜在餐前服用的是()

A：双氯芬酸钠片

B：伊马替尼片

C：莫沙必利片

D：头孢呋辛酯片

答案：C

60.药物对孕妇的不良影响中，摄入过量泻药、利尿药可能引起()。

A：死胎

B：流产

C：溶血

D：畸形

答案：B

61.紫外线加速一些药品的氧化、分解

A：日光

B：空气

C：温度

D：湿度

答案：A

62.服药后1h内限制饮水的药物是

A：微生态制剂

B：磺胺类药物

C：镇静催眠药

D：胃黏膜保护剂

答案：D

63.用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发ADR的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此ADR因果关系可评价为

A：很可能

B：可能

C：可能无关

D：待评价

答案：B

64.用于癌性胸水

A：动脉注药

B：腔内注射

C：静脉注射

D：肌内注射

答案：B

65.冠心病患者同时伴有阵发性和持续性房颤，为维持其窦性心律，应首选的药物是

A：索他洛尔

B：多非利特

C：普罗帕酮

D：胺碘酮

答案：D

66.由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物

A：尽可能避免使用

B：一般无须调整剂量

C：须谨慎使用，必要时减量给药

D: 必须减量应用

答案：C

67.容易水解的药物是

A: 胃蛋白酶

B: 牛痘菌苗

C: 吗啡

D: 青霉素类

答案：D

68.表现为“牛肉样舌”的疾病为()

A: 再生障碍性贫血

B: 白血病

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

69.缺铁性贫血最早和最常见症状是

A: 头晕

B: 乏力、困倦、活动耐力减退

C: 食欲不振

D: 记忆力减退

答案：B

70.患者，男，53岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 干酵母片

C: 多潘立酮片

D: 乳酶生片

答案：B

71.用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

A: 吲哚美辛

B: 阿卡波糖

C: 格列本脲

D: 苯巴比妥

答案：C

72.倍他洛尔所致的主要不良反应是

A: 外周血肿

B: 血尿酸升高

C: 血钠升高

D: 支气管痉挛

答案：D

73.其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

A: 维生素 E

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 B

答案：B

74.可用于对乙酰氨基酚过量所致中毒的药物是

A: 亚硝酸钠

B: 乙酰胺

C：纳洛酮

D：乙酰半胱氨酸

答案：D

75.患者，男性，80岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近2个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：卧位和坐位时高血压

B：直立性低血压

C：口干、便秘、尿潴留

D：鼻咽炎和尿路感染

答案：D

76.关于口腔溃疡药物治疗的说法,错误的是（）

A：补充复合维生素B和维生素C有利于促进溃疡面愈合

B：氯己定如含漱液,每次15-20ml,一日2~3次含漱

C：西地碘含片,一次6mg一日4次含服

D：复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷,一日3次,稍加按摩。

答案：C

77.属于5α还原酶抑制剂的是

A：雌三醇

B：普适泰

C：氟他胺

D：依立雄胺

答案：D

78.属于第三代头孢菌素类抗菌药物的是

A：头孢曲松

B：头孢拉定

C：头孢洛林酯

D：头孢吡肟

答案：A

79.患者，男性，55岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示Hb72g/L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

A：尽量使用铁锅烹饪

B：注意足够的蛋白质摄入

C：大便颜色变黑为消化道出血所致

D：服药时不能饮用茶和咖啡

答案：C

80.属于非核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是（）

A：多替拉韦

B：奈韦拉平

C：洛匹那韦

D：阿巴卡韦

答案：B

81.其含量用生育酚当量表示的是

A：维生素A

B：维生素B

C：维生素E

D：维生素D

答案：C

82.（2019年真题）患者，女，69岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体:咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史:高血压病史12年，服用氨氯地平片5mgqd，血压控制在140/85mmHg左右，高脂血症10年，服用阿托伐他汀钙片20mgqd。

A: 支气管哮喘

B: 胃食管反流病

C: 心绞痛

D: 胃溃疡

答案：B

83.（2018年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

B: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

C: 在常规时间20:00服用4月25日的药片,不用补服4月24日的药片

D: 不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

答案：A

84.干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

A: 链霉素

B: 青霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 四环素

答案：B

85.患者，女，30岁，妊娠7个月，既往有磺胺类药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物增多并有烧灼感。药师应推荐的治疗药物是

A: 利巴韦林滴眼液

B: 硫酸锌滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 氯霉素滴眼液

答案：B

86.根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

A: 药品经营企业

B: 药品生产企业

C: 药品研究机构

D: 药品监督管理部门

答案：B

87.可提示完全梗阻性黄疸的是

A: 34.2μmol/L～171μmol/L

B: 17.1μmol/L～171μmol/L

C: >342μmol/L

D: 17.1μmol/L～34.2μmol/L

答案：C

88.一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视力模糊或定向力障碍等；为安全起见驾驶员应该

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/816104135101011030