2024湖北省五峰土家族自治县《执业药师之西药学专业二》考试真题题库附答案【典型题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.不宜与三环类抗抑郁药合用

A：酚甘油滴耳液

B：麻黄碱

C：羟甲唑啉

D：赛洛唑啉

答案：B

2.（2021年真题）患者，男，54岁。拟行膝关节置换术，围手术期宜选用的预防用抗菌药物（）

A：头孢曲松

B：头孢唑林

C：头孢他啶

D：头孢噻肟

答案：B

3.患者，男，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟呼吸急促、面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A：青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应

B：青霉素本身诱导机体发生变态反应

C：青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原

D：青霉素加速抗原抗体结合

答案：A

4.主要以降低三酰甘油为目标的首选药是

A：辛伐他汀

B：烟酸

C：非诺贝特

D：阿托伐他汀

答案：C

5.下列哪种药物属于抑菌药

A：青霉素G

B：头孢氨苄

C：庆大霉素

D：四环素

答案：D

6.胰岛素依赖型重症糖尿病需

A：胰岛素皮下注射

B：阿卡波糖

C：吡格列酮

D：西格列汀

答案：A

7.作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

A：利奈唑胺

B：甲氧苄啶

C：呋喃妥因

D：磺胺甲唑

答案：D

8.β-内酰胺类抗生素的主作用靶位是()

A：细菌核糖体50S亚基

B：二氢叶酸合成酶

C：细菌细胞膜上特殊蛋白PBPs

D：DNA螺旋酶

答案：C

9.可能引起中性粒细胞减少的药物是

A：碘及碘化物

B：左甲状腺素

C：鲨肝醇

D：丙硫氧嘧啶

答案：D

10.属于合成的麻醉性镇痛药的是

A：美沙酮

B：布洛芬

C：吗啡

D：可待因

答案：A

11.为鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂，用于手癣、足癣、体癣及皮肤念珠菌病的药物是

A：阿莫罗芬

B：制霉菌素

C：特比萘芬

D: 联苯卡唑

答案：C

12.属于润滑性泻药的是

A: 多库酯钠

B: 利那洛肽

C: 番泻叶

D: 欧车前

答案：A

13.属于嘧啶类的是

A: 卡泊芬净

B: 特比萘芬

C: 制霉菌素

D: 氟胞嘧啶

答案：D

14.（2019年真题）患者，男，15岁，因咳嗽、咳痰，发热3天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠10分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 去甲肾上腺素

B: 肾上腺素

C: 地塞米松

D: 多巴胺

答案：B

15.抑制HIV整合酶的催化活性，可防止感染早期HIV基因组共价插入或整合到宿主细胞基因组上，该类药物是

A：核苷类反转录酶抑制药

B：非核苷类反转录酶抑制药

C：整合酶抑制剂

D：蛋白酶抑制药

答案：C

16.能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A：红霉素

B：氯霉素

C：青霉素G

D：庆大霉素

答案：B

17.可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A：利血平

B：瑞舒伐他汀

C：依折麦布

D：阿昔莫司

答案：D

18.尤其适用于伴有精神症状的儿童癫痫患者的是

A：丙戊酸钠

B：苯妥英钠

C：卡马西平

D：乙琥胺

答案：C

19.军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是()。

A：头孢他啶

B：利奈唑胺

C：头孢曲松

D：罗红霉素

答案：D

20.（2017 年真题）影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是（）

A：伯氨喹

B：青蒿素

C：乙胺嘧啶

D：奎宁

答案：C

21.哌嗪类驱虫药主要用于治疗

A：疟疾

B：蛔虫病和蛲虫病

C：蛲虫病

D：绦虫病

答案：B

22.（2015 年真题）易导致牙齿黄染的药品是（）。

A：加替沙星

B：多西环素

C：庆大霉素

D：头孢哌酮

答案：B

23.重度阻滞Na+通道的药物是

A：利多卡因

B：普萘洛尔

C：普罗帕酮

D：普鲁卡因胺

答案：C

24.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：长期口服给药

B：短期口服给药

C：注射与口服并用

D：注射给药

答案：B

25.剂量过大会引起高铁血红蛋白血症的是

A：硝苯地平

B：地尔硫

C：硝酸甘油

D：普萘洛尔

答案：C

26.（2020年真题）患者，男，65岁。高血压病史8年，血压峰值180/110mmHg，冠心病史5年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

A: 赖诺普利
B: 吲达帕胺
C: 普萘洛尔
D: 氨氯地平
答案：A

27.易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素B合用的抗真菌药物是
A: 卡泊芬净
B: 氟胞嘧啶
C: 氟康唑
D: 特比萘芬
答案：B

28.可使磷酰化胆碱酯酶复活的药物
A: 碘解磷定
B: 阿托品
C: 匹鲁卡品
D: 毒扁豆碱
答案：A

29.具有利胆作用的药物是()
A: 阿托品
B: 甲氧氯普胺
C: 肾上腺素
D: 熊去氧胆酸
答案：D

30.为金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎及关节炎的首选药物是

A：氨曲南

B：克拉霉素

C：克林霉素

D：红霉素

答案：C

31.基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

A：尿激酶

B：重组人促红素

C：链激酶

D：叶酸

答案：B

32.制霉菌素属于

A：丙烯胺类

B：唑类

C：抗生素类

D：吗啉类

答案：C

33.下列不属于一线抗结核药的是

A：利福平

B：对氨基水杨酸

C：链霉素

D：吡嗪酰胺

答案：B

34.（2021年真题）可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做HLA-B*5801基因筛查的抗痛风药物是（）

A：别嘌醇

B：苯溴马隆

C：非布司他

D：秋水仙碱

答案：A

35.抑制细菌核酸合成的抗菌药物是

A：头孢吡肟

B：利福喷丁

C：磺胺甲噁唑甲氧苄啶

D：头孢米诺

答案：B

36.氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

A：100mg

B：50mg

C：20mg

D：60mg

答案：D

37.属于贝丁酸类的调节血脂药是()

A：烟酸

B：辛伐他汀

C：非诺贝特

D：依折麦布

答案：C

38.（2019年真题）注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是（）

A: 先用氯化钠注射液溶解，再用5%葡萄糖注射液进一步稀释

B: 氯化钠注射液稀释

C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液进一步稀释

D: 5%葡萄糖注射液稀释

答案：D

39.（2015年真题）可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是（）。

A: 氨基糖苷类

B: 林可霉素类

C: 酰胺醇类（氯霉素）

D: 四环素类

答案：A

40.治疗绦虫病的首选药品是()。

A: 伯氨喹

B: 哌嗪

C: 伊维菌素

D: 吡喹酮

答案：D

41.患者，男，57岁，身高175cm，体重87kg，诊断为2型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 随餐服用

B: 餐后2小时

C: 餐后半小时

D: 餐前半小时

答案：A

42.关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

A: 用药期间需定期测定血红蛋白

B: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

C: 对于不同的手术，选择疗程不同

D: 用药过量可导致出血并发症

答案：B

43.单纯疱疹性或溃疡性角膜炎患者禁用()

A: 四环素可的松

B: 利福平

C: 氯霉素

D: 夫西地酸

答案：A

44.（2015 年真题）属于刺激性泻药的是（）。

A: 乳果糖

B: 甘油（开塞露）

C: 酚酞

D: 聚乙二醇 4000

答案：C

45.氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 100～250μg，一日 2 次

B: 一次 50～100μg，一日 2 次

C: 一次 500～1000μg，一日 2 次

D: 一次 250～500μg，一日 2 次

答案：A

46.奥美拉唑属于

A: M 受体拮抗药

B: H2 受体拮抗药

C: H+，K+-ATP 酶抑制剂

D: 胃泌素受体拮抗药

答案：C

47.改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以减低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

A: α 受体激动药

B: 利尿降压药

C: 血管紧张素转换酶抑制药

D: 钙离子通道阻滞药

答案：C

48.林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

A: 革兰阳性球菌

B: 肺炎链球菌

C: 肺炎支原体

D: 厌氧菌

答案：C

49.乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

A: 氟他胺

B: 阿那曲唑

C: 曲妥珠单抗

D: 他莫昔芬

答案：D

50.属于抑酸药的是()

A: 莫沙必利

B: 奥美拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 胃蛋白酶

答案：B

51.对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

A: 油剂

B: 乳膏剂

C: 粉剂

D: 洗剂

答案：B

52.坦洛新与华法林合用，华法林游离药物浓度增加，这是因为二者竞争

A: UGT287

B: CYP3A4

C: 血浆蛋白

D: p一糖蛋白

答案：C

53.下列不属于雌激素作用部位的是

A：阴道

B：子宫

C：肾脏

D：输卵管

答案：C

54.（2016 年真题）用于治疗低磷血症的药物是

A：碳酸钙

B：三磷酸腺苷

C：二磷酸果糖

D：葡萄糖

答案：C

55.其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

A：氨曲南

B：克拉霉素

C：阿奇霉素

D：红霉素

答案：C

56.长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

A：番泻叶

B：利那洛肽

C：欧车前

D：多库酯钠

答案：A

57.下列属于短效糖皮质激素的是

A：泼尼松

B：氢化可的松

C：泼尼松龙

D：甲泼尼龙

答案：B

58.（2021年真题）常与ACEI联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是（）

A：氢氯噻嗪

B：甘油果糖

C：乙酰唑胺

D：螺内酯

答案：A

59.某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A：上午8时左右

B：空腹

C：下午4时左右

D：中午12时左右

答案：A

60.与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

A：替尼泊苷

B：非格司亭

C：异烟肼

D：铂类

答案：D

61.可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是()

A: 谷氨酸

B: 乳酸钠

C: 氯化钾

D: 硫酸镁

答案：B

62.控制癫痫持续状态，可静脉注射

A: 硫喷妥钠

B: 氯丙嗪

C: 地西泮

D: 阿司匹林

答案：C

63.华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 鱼精蛋白

B: 葡萄糖酸钙

C: 氨基己酸

D: 维生素 K1

答案：D

64.药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

A: 高血压危象

B: 急性肝衰竭

C：血糖异常

D：红人综合征

答案：D

65.烷化剂中易诱发出血膀胱炎的药物是

A：氮芥

B：环磷酰胺

C：卡莫司汀

D：塞替派

答案：B

66.葡醛内酯属于

A：肝胆疾病辅助用药

B：胃黏膜保护剂

C：促胃肠动力药

D：抑酸剂

答案：A

67.属于靶向抗肿瘤药物的是

A：多柔比星

B：吉非替尼

C：紫杉醇

D：昂丹司琼

答案：B

68.引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

A：碘苷

B: 奥布卡因

C: 阿托品

D: 20%甘露醇

答案：C

69.在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

A: 铝碳酸镁

B: 米索前列醇

C: 枸橼酸铋钾

D: 兰索拉唑

答案：D

70.抗血小板药西洛他唑属于

A: 整合素受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 维生素 K 拮抗剂

D: 二磷酸腺苷 P2Y12 受体阻断剂

答案：B

71.（2019 年真题）同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A: 帕罗西汀

B: 度洛西汀

C: 吗氯贝胺

D: 马普替林

答案：B

72.下列抗心律失常药中，属于 β 受体阻断剂的代表药是()。

A: 溴苄胺

B: 普萘洛尔

C: 索他洛尔

D: 胺碘酮

答案：B

73.属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是

A: 异甘草酸镁

B: 双环醇

C: 门冬氨酸钾镁

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：C

74.多柔比星用药后1～2日可出现

A: 红色尿

B: 绿色尿

C: 橙色尿

D: 黄色尿

答案：A

75.缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

A: 3～5μg/L

B: 10～15μg/L

C: 30～50μg/L

D: 20～30μg/L

答案：C

76.主要经胆汁排泄(仅有 5%左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是()

A：格列美脲

B：格列齐特

C：格列吡嗪

D：格列喹酮

答案：D

77.属于叶酸类抗代谢类药物的是()

A：甲氨蝶呤

B：巯嘌呤

C：长春瑞滨

D：吉西他滨

答案：A

78.（2017 年真题）抑制细菌叶酸合成（）

A：头孢米诺

B：头孢吡肟

C：利福喷丁

D：磺胺甲噁唑甲氧苄啶

答案：D

79.下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

A：降低膜反应性

B：减慢 0 相去极化速度

C：延长 APD 和 ERP

D：抑制 Na

答案：D

80.利巴韦林最主要的不良反应是

A：味觉异常

B：溶血性贫血

C：头痛

D：听力异常

答案：B

81.消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A：吲哚美辛

B：阿司匹林

C：塞来昔布

D：对乙酰氨基酚

答案：C

82.治疗系统性红斑狼疮选用

A：甲硝唑

B：甲苯咪唑

C：氯喹

D：吡喹酮

答案：C

83.属于抗炎类保肝药的是

A：双环醇

B：异甘草酸镁

C：多烯磷脂酰胆碱

D: 还原型谷胱甘肽

答案：B

84.下列情况不应首选红霉素的是()

A: 白喉带菌者

B: 肠道痢疾杆菌感染

C: 支原体肺炎

D: 军团菌肺炎

答案：B

85.（2016 年真题）鱼精蛋白可用于救治

A: 肝素过量导致的出血

B: 异烟肼中毒导致的神经毒性

C: 华法林过量导致的出血

D: 吗啡过量导致的呼吸抵制

答案：A

86.耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A: 1%碘甘油

B: 9%硼酸冰片滴耳液

C: 曲伏前列素

D: 四环素

答案：B

87.适用于心功能比较稳定的Ⅱ～Ⅲ级心力衰竭患者的药物是

A: 维拉帕米

B: 多巴酚丁胺

C：卡维地洛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/816142051054011030