

2024 湖北省东西湖区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题通关秘籍题库【必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 依诺肝素钠
- B: 尿激酶
- C: 氯吡格雷
- D: 达比加群酯

答案：C

2. 其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 E
- C: 维生素 B
- D: 维生素 A

答案：D

3. 倍他洛尔所致的主要不良反应是

- A: 支气管痉挛
- B: 血尿酸升高
- C: 血钠升高
- D: 外周血肿

答案：A

4. 可引起驾驶员嗜睡的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 抗过敏药
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：B

5. 多数抗过敏药物慎用于（）

- A: 高脂血症患者
- B: 慢性鼻炎患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 前列腺增生老年患者

答案：D

6. 患者到药店购买鱼肝油,药师应给予()

- A: 鱼油
- B: 维生素
- C: 维生素 AD
- D: 维生素 A

答案：C

7. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 利伐沙班
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：B

8. 对合并糖尿病以及肾病的高血压病人降压的目标建议是

- A: $<140/90\text{mmHg}$
- B: $<150/90\text{mmHg}$
- C: $<130/80\text{mmHg}$
- D: $<160/95\text{mmHg}$

答案：C

9. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 替考拉宁
- C: 头孢洛林
- D: 阿莫西林

答案：A

10. 具有吸附力，对氰化物无效的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 1: 5000 高锰酸钾
- C: 3%鞣酸溶液
- D: 淀粉溶液

答案：A

11. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

- A: 胃肠型
- B: 神经型
- C: 病毒型
- D: 肺炎型

答案：A

12. 可卡因属于哪一类兴奋剂

- A: 蛋白同化激素
- B: 精神刺激剂
- C: 利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：B

13. 推荐可用于治疗痛经的解热镇痛非处方药包括

- A: 阿司匹林
- B: 萘普生
- C: 黄体酮
- D: 阿托品

答案：A

14. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 早、晚给药
- B: 清晨给药
- C: 睡前给药
- D: 一日三餐后给药

答案：C

15. 患者，女，28 岁，近一个月出现阴道分泌物增多，阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是()

- A: 头孢曲松钠
- B: 咪康唑
- C: 青霉素钠
- D: 甲硝唑

答案：D

16. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

- A: 提倡无创给药
- B: 按时给药
- C: 按阶梯给药
- D: 按需给药

答案：D

17. （2017 年真题）患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 缬沙坦
- B: 维拉帕米
- C: 非洛地平
- D: 普萘洛尔

答案：A

18. 可引起血肌酐增高的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 严重肝病
- C: 胃溃疡
- D: 肾衰竭

答案：D

19. 有关血红蛋白的叙述正确的是

- A: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型

- B: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显
- C: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能
- D: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分

答案：C

20. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

- A: 多潘立酮+维生素 C
- B: 青霉素+丙磺舒
- C: 西咪替丁+格列本脲
- D: 四环素+硫酸亚铁

答案：C

21. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程为

- A: 4~6 周
- B: 1~2 周
- C: 8~12 周
- D: 6~8 周

答案：B

22. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 肾损害
- B: 口干
- C: 便秘
- D: 共济失调

答案：A

23. 常见老年人 ADR 的药物类别,阿托品、苯海索等致尿潴留

- A: β 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 抗生素

答案: B

24. 可引起体位性低血压,服用后,患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢,动作不能突然的药物是

- A: 卡马西平
- B: 头孢哌酮
- C: 特拉唑嗪
- D: 左氧氟沙星

答案: C

25. (2019 年真题) 患者,女,69 岁,体型偏胖,BMI30.1,主诉夜间咳嗽、咽部有异物感,平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛,自用止咳糖浆无效。查体:咽红,听诊双肺未闻及干湿性啰音,偶有哮鸣音。既往史:高血压病史 12 年,服用氨氯地平片 5mgqd,血压控制在 140/85mmHg 左右,高脂血症 10 年,服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 单硝酸异山梨酯缓释片
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 布地奈德吸入剂
- D: 多潘立酮片

答案: B

26. 对该患者进行初始经验性抗感染治疗,宜选用的药物是 ()

- A: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素

B: 左氧氧沙星+阿奇霉素

C: 多西环素

D: 阿奇霉素

答案：A

27. 长期使用可引起骨质疏松的是

A: 糖皮质激素

B: 炔雌醇

C: 胰岛素

D: 甲状腺素

答案：A

28. 不良反应是口干、尿潴留的是（）

A: 度他雄胺

B: 特拉唑嗪

C: 索利那新

D: 哌唑嗪

答案：C

29. 头痛，伴颈部僵硬、恶心、发热和全身痛，可能有

A: 脑血管意外

B: 动脉瘤

C: 脑肿瘤

D: 脑膜炎

答案：D

30. 典型结核病的临床表现错误的是

A: 乏力

B: 咳嗽

C: 食欲减退

D: 高热

答案：D

31. 十分常见，多从婴儿时期起发病，可持续终生

A: 人工荨麻疹

B: 幼小荨麻疹

C: 冷性荨麻疹

D: 热性荨麻疹

答案：C

32. 普通胰岛素的作用峰时为（）。

A: 0.25~0.5 小时

B: 0.6~1.5 小时

C: 6~12 小时

D: 1.5~4 小时

答案：D

33. 给予铁剂的依据是

A: 有助于合成红细胞

B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

C: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

D: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

答案：A

34. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

A: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

- B: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- C: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- D: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

答案：B

35. 以下联合用药中，依据"作用相加或增加疗效"机制的是

- A: 普萘洛尔联用硝苯地平
- B: 阿托品联用吗啡
- C: 阿托品联用解磷定
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：C

36. 异烟肼+链霉素+对氨基水杨酸钠治疗结核病属于

- A: 治疗多种疾病
- B: 延缓细菌耐药性的产生
- C: 减少药物不良反应
- D: 提高药物疗效

答案：B

37. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: <30g/L
- B: 31~60g/L
- C: 61~90g/L
- D: >90g/L

答案：A

38. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，一天前发热，体温 39.8℃，全身乏力，四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低，中性粒细胞比例低，该者最适宜选用的药物是

- A: 奥司他韦胶囊
- B: 阿昔洛韦片
- C: 利巴韦林片
- D: 金刚烷胺片

答案：A

39. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 3%过氧化氢
- B: 1%硫酸铜
- C: 1%硫酸镁
- D: 1%氯化钠

答案：C

40. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 单纯性甲状腺肿
- B: 甲状腺功能亢进
- C: 亚急性甲状腺炎
- D: 甲状腺功能减退

答案：B

41. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

- A: 口腔温度超过 37.0℃
- B: 腋下温度超过 36.6℃
- C: 口腔温度超过 37.3℃
- D: 直肠温度超过 36.3℃

答案：C

42. 用药期间禁止饮酒，否则可能引起眩晕、倦怠、嗜睡、视物不清等“双硫仑样反应”的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 左氧氟沙星
- C: 特拉唑嗪
- D: 卡马西平

答案：A

43. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

- A: E 级
- B: C 级
- C: B 级
- D: D 级

答案：D

44. (2017 年真题) 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是 ()

- A: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- B: 维 A 酸片
- C: 左旋多巴片
- D: 非洛地平片

答案：C

45. (2015 年真题) 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最有可能患有 ()。

- A: 肝脏疾病
- B: 心脏疾病
- C: 肾脏疾病
- D: 血液疾病

答案：C

46. 治疗类风湿关节炎时，需至少连服 6 个月才能宣布无效，可引起视网膜变性而致失明的药物为

- A: 氯喹
- B: 甲氨蝶呤
- C: 来氟米特
- D: 柳氮磺吡啶

答案：A

47. 是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

- A: 期刊论文
- B: 三级信息源资料
- C: 网站信息
- D: 二级信息源资料

答案：B

48. I 类手术切口应用第三代头孢菌素

- A: 超适应证用药
- B: 盲目联合用药
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：D

49. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 脱发
- B: 恶心、呕吐
- C: 食欲下降
- D: 骨髓抑制

答案：D

50. 容易引起脱发的是（）

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 吉非替尼
- D: 阿霉素

答案：D

51. 多用于病情急重者的制剂

- A: 膜剂
- B: 滴丸剂
- C: 泡腾片剂

D: 透皮贴剂

答案：B

52. 以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿出现溶血的是

A: 维生素 C

B: 阿莫西林

C: 吡哆美辛

D: 苯妥英钠

答案：C

53. 蒽环类药物的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 心脏毒性

C: 肺纤维化

D: 溶血性尿毒症

答案：B

54. (儿童用药特点) 儿童病情危重抢救时多采用

A: 皮下注射

B: 口服给药

C: 局部给药

D: 静脉给药

答案：D

55. 药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是（）。

A: 高尚的职业道德

B: 良好的教育背景

C: 药历制订、修改

D: 交流沟通能力

答案：D

56. 对沙眼衣原体有强大抗菌作用的药品是

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 红霉素眼膏
- D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案：C

57. 中成药麻杏止咳片具有镇咳、祛痰、平喘的功效，与其合用可增加对心脏的毒性，引起心律失常的药物是。

- A: 地高辛
- B: 氯苯那敏
- C: 甲氧氯普胺
- D: 复方利血平

答案：A

58. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- B: 福辛普利用于降压
- C: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- D: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙

答案：A

59. 下列药物使用方式, 正确的是()

- A: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- B: 氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用 3 个月
- C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案: A

60. 重组人促红素需要的特殊贮存条件是

- A: 不宜振摇
- B: 遮光
- C: 密闭
- D: 低温

答案: A

61. 1U 维生素 A 相当于

- A: 3 μg 维生素 A
- B: 0.03 μg 维生素 A
- C: 0.3 μg 维生素 A
- D: 30 μg 维生素 A

答案: C

62. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 沙奎那韦
- C: 恩夫韦替
- D: 扎西他滨

答案: B

63. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 东莨菪碱
- B: 氯苯那敏
- C: 阿米洛利
- D: 右美沙芬

答案：D

64. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 碳酸氢钠
- C: 丙磺舒
- D: 别嘌醇

答案：B

65. $90\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < \text{正常参考范围下限}$ 可诊断为

- A: 基本正常
- B: 中度贫血
- C: 重度贫血
- D: 轻度贫血

答案：D

66. 具有解热镇痛抗炎作用，镇痛作用较强、对胃肠道刺激性小的是

- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 贝诺酯
- D: 阿司匹林

答案：A

67. 对血管平滑肌选择性高，对心肌收缩力或心肌传导作用影响很小的

- A: 普萘洛尔
- B: 哌唑嗪
- C: 氨氯地平
- D: 硝酸甘油

答案：C

68. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 西格列汀
- C: 二甲双胍
- D: 格列吡嗪

答案：C

69. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 索利那新
- B: 特拉唑嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：D

70. 下列药物中适宜在餐前服用的是（）

- A: 莫沙必利片
- B: 伊马替尼片

C: 双氯芬酸钠片

D: 头孢呋辛酯片

答案：A

71. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

A: 社区获得性肺炎

B: 肺结核

C: 哮喘

D: 支气管炎

答案：A

72. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 餐中多饮水

B: 避免高脂饮食

C: 戒烟酒

D: 控制体重

答案：A

73. 依照药品不良反应程度分级标准，以下属于“中度药品不良反应”的是

A: 不良反应症状明显

B: 症状不发展

C: 一般无需治疗

D: 重要器官有严重损害

答案：A

74. 成人空腹血糖正常参考区间是

A: 3.5~6.1mmol / L

B: 3.3~5.5mmol / L

C: 3.9~6.1mmol / L

D: 3.7~6.1mmol / L

答案：C

75. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准未经严格论证或评估的专家意见在循证医学价中的证据级别属于()

A: 1 级

B: 5 级

C: 2 级

D: 3 级

答案：B

76. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

A: 弱轻度

B: 重度

C: 轻度

D: 中度

答案：B

77. 急性传染病的恢复期可呈现

A: 中性粒细胞增多

B: 单核细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 淋巴细胞增多

答案：B

78. 致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

B: 注意特殊人群用药

C: 注意定期监测器官功能

D: 了解患者及家族的过敏史

答案：A

79. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 维生素 B6

B: 昂丹司琼

C: 奥美拉唑

D: 雷尼替丁

答案：B

80. 艾滋病的传播途径不包括

A: 经血传播

B: 经血制品传播

C: 消化道传播

D: 性途径传播

答案：C

81. 服用维生素 B

A: 酒

B: 脂肪

C: 食盐

D: 食醋

答案：A

82. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 葡萄糖酸亚铁

B: 右旋糖酐铁

C: 琥珀酸亚铁

D: 叶酸

答案：D

83. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h，输注速度应是

A: 20ml / h

B: 10ml / h

C: 60ml / h

D: 30ml / h

答案：D

84. 某患者到药店购买降糖灵，药师应交付的药物是

A: 胃得灵

B: 格列本脲

C: 苯乙双胍

D: 吡拉西坦

答案：C

85. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 氨溴索片
- B: 阿司匹林泡腾片
- C: 维生素 C 片
- D: 左氧氟沙星片

答案：B

86. 患者，女，76 岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

- A: 美金刚
- B: 多奈哌齐
- C: 加兰他敏
- D: 卡巴拉汀

答案：C

87. 解救强腐蚀剂中毒者（）

- A: 不能用强利尿剂
- B: 不能催吐
- C: 不能导泻
- D: 禁止洗胃

答案：D

88. 可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

- A: 奥沙利铂
- B: 卡铂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 顺铂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/816142053054011030>