

# 国家基本公卫（预防接种）考试复习题及答案

## 单选题

1. 国家对儿童实行预防接种证制度，儿童接种疫苗后办理预防接种证的格式由（）规定。

- A、国务院卫生健康主管部门
- B、省级疾病预防控制中心
- C、国家疾病预防控制中心
- D、省级卫生主管部门

参考答案：A

2. 原则上各级疫苗储存量为：县级个月，乡级个月。（）

- A、6，1
- B、3，1
- C、6，2
- D、3，2

参考答案：B

3. 疾病预防控制机构、接种单位在接收或者购进疫苗时，应当索取前款规定的证明文件，并保存至疫苗有效期满后不少于（）备查。

- A、10年
- B、5年
- C、8年

D、3年

参考答案：B

4. 同一接种门诊，同一接种人员，在同一时间段，同一人群接种卡介苗后，发现受种者的卡疤有的很小，有的很大。最可能的原因是（）。

A、疫苗不合格

B、CG保存温度不当

C、接种前BCG未摇匀

D、接种技术差，皮内注射时深时浅

参考答案：C

5. 冰箱内储存疫苗时，疫苗与疫苗之间应留有多大空隙？（）

A、疫苗与箱壁1.5-2cm，疫苗与疫苗无需余留空隙

B、1.5-2cm

C、2-3cm

D、1-2cm

参考答案：D

6. 按最新的免疫程序，乙脑减毒活疫苗接种全程共打（）针。

A、4

B、3

C、1

D、2

参考答案：D

7. 常规免疫接种率的逻辑性评价一般不采用哪种方法？（）

- A、差值评价
- B、图表法
- C、加权法
- D、比值评价法

参考答案：C

8. 百白破疫苗的成分包括（）。

- A、百日咳类毒素、白喉类毒素、破伤风类毒素
- B、百日咳灭活菌、白喉类毒素、破伤风活菌苗
- C、百日咳活菌苗、白喉活菌苗、破伤风类毒素
- D、百日咳灭活菌、白喉类毒素、破伤风类毒素

参考答案：D

9. 儿童离开原居住地，原则上时间超过（）月，现居住地所在单位应将其纳入免疫规划管理。

- A、1个月
- B、6个月
- C、2个月
- D、3个月

参考答案：D

10. 国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表所列各疫苗剂次的接种时间，是指可以接种该剂次疫苗的（）接种年（月）龄。

- A、全部都不对

B、最晚

C、最小

D、最佳

参考答案：C

11. 对于非免疫规划疫苗接种，接种单位（）

A、可以收取接种服务费

B、可以收取挂号费

C、只能收取疫苗费用

D、不得收取任何费用

参考答案：A

12. 预防接种服务对象包括（）

A、辖区内居住满3个月的儿童

B、辖区内居住满6个月的儿童

C、辖区内0-6岁儿童

D、辖区内0-6岁儿童和其他重点人群

参考答案：D

13. 对鸡蛋过敏的人不能接种的疫苗有（）

A、乙脑疫苗

B、流脑疫苗

C、流感疫苗

D、乙肝疫苗

参考答案：C

14. 疫苗是指为预防、控制疾病的发生、流行，用于人体免疫接种的（）。

- A、治疗性生物制品
- B、诊断性生物制品
- C、预防性生物制品
- D、生物制品

参考答案：C

15. 我国目前暂定除出生体重 $< 2500$  克的早产儿暂缓接种外，对（）疫苗的接种可按常规进行。

- A、脊灰糖丸
- B、乙肝疫苗
- C、无细胞百白破
- D、卡介苗

参考答案：D

16. 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的组织采购方式为（）。

- A、各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购
- B、接种单位自行采购
- C、市级采购
- D、国家统一采购

参考答案：A

17. 接种疫苗时, 用灭菌镊子夹取 75%乙醇棉球或用无菌棉签蘸 75%乙醇, 由内向外螺旋式对接种部位皮肤进行消毒, 涂擦直径应 ( ) cm, 待晾干后立即接种。

A、 $\geq 3$

B、 $\geq 4$

C、 $\geq 2$

D、 $\geq 5$

参考答案 : D

18. HIV 感染母亲所生儿童如经医疗机构诊断出现艾滋病相关症状或免疫抑制症状, 仍可接种 ( ) 疫苗。

A、甲肝减毒活疫苗

B、乙脑减毒活疫苗

C、麻疹

D、乙肝疫苗

参考答案 : D

19. 根据我国对疑似预防接种异常反应的分类方法, 下列哪种情况不属于疑似预防接种异常反应? ( )

A、偶合症

B、不良反应

C、接种后未产生免疫效果

D、事故

参考答案 : C

20. 2016 年实施新的脊髓灰质炎疫苗免疫策略，首剂疫苗为（）。

- A、2 月龄接种 1 剂次二价脊灰减毒活疫苗 (bOPV)
- B、2 月龄接种 1 剂次三价脊灰减毒活疫苗 (tOPV)
- C、3 月龄接种 1 剂次脊灰灭活疫苗 (IPV)
- D、2 月龄接种 1 剂次脊灰灭活疫苗 (IPV)

参考答案：D

21. 预防接种安全注射的含义不包括 ( )。

- A、预防接种的环境符合要求
- B、使用合格的注射器，在有效期内使用，使用后放入安全盒等防刺容器内并安全地回收、销毁
- C、实施预防接种人员经过培训，取得相关资格，预防接种技术操作要规范化
- D、预防接种对象身体健康，没有相关的禁忌和暂缓接种症状

参考答案：D

22. 发生过敏性休克时，体重不明的 2 岁以下儿童立即皮下注射 1:1000 肾上腺素 ( )。

- A、0.125ml (1/8 支)
- B、0.5ml (1/2 支)
- C、0.0625ml (1/16 支)
- D、0.25ml (1/4 支)

参考答案：C

23. 下列哪种情况不属于百白破疫苗接种的禁忌症？ ( )

- A、鸡蛋过敏



- B、有惊厥史
- C、肝肾功能不全
- D、发热，体温 39.5 度

参考答案：A

24. 在我国的乙肝母婴阻断策略中，建议 HBsAg 阳性母亲所生儿童接种第 3 剂乙肝疫苗（）后进行 HBsAg 和抗-HBs 检测。

- A、3~5 个月
- B、12 个月
- C、6 个月
- D、1~2 个月

参考答案：D

25. 育龄期妇女接种麻腮风三联疫苗后，（）内应避免怀孕。

- A、9 个月
- B、6 个月
- C、12 个月
- D、3 个月

参考答案：D

26. 儿童离开原居住地期间，由（）承担预防接种工作的接种单位负责对其实施接种。

- A、现居住地
- B、现居住地和原居住地共同
- C、原居住地或现居住地均可

D、原居住地

参考答案：A

27. 下列哪一项不完全属于我国规定的应报告的疑似预防接种异常反应？（）

A、癫痫、脑炎、脑病

B、无菌性脓肿、热性惊厥、过敏反应

C、脓毒血症，败血症，血管性水肿

D、脊髓灰质炎疫苗相关病例、脊灰疫苗衍生病毒病例、局部化脓感染

参考答案：D

28. 世界卫生组织推荐接种流感疫苗接种的重点人群不包括（）。

A、医疗卫生机构工作人员

B、60 岁以上人群

C、育龄期妇女

D、慢性病患者及体弱多病者

参考答案：C

29. 脊髓灰质炎疫苗的强化免疫活动定在每年的（）接种。

A、12 月 5 日和 1 月 5 日

B、3 月 5 日和 4 月 5 日

C、5 月 5 日和 6 月 5 日

D、11 月 5 日和 12 月 5 日

参考答案：A

30. 下列全部属于灭活疫苗的是 ( )。

- A、乙肝疫苗，AC 流脑疫苗，水痘疫苗
- B、麻疹疫苗，百白破疫苗，A 流脑疫苗
- C、百白破疫苗，狂犬病疫苗，流感疫苗
- D、卡介苗，乙肝疫苗，Hib 疫苗

参考答案：C

31. 疫苗质量监测的目的？ ( )

- A、对疫苗从生产、运输、使用各环节可能出现的问题进行监测以改进疫苗质量
- B、了解疫苗的生产过程
- C、保证疫苗接种水平
- D、因为疫苗常有不合格产品

参考答案：A

32. 采用划痕法接种的疫苗是 ( )。

- A、炭疽疫苗
- B、钩体疫苗
- C、出血热疫苗
- D、霍乱疫苗

参考答案：A

33. 常用的检验含吸附剂疫苗的方法被称为 ( )。

- A、沉降试验
- B、沉淀试验

C、振荡试验

D、摇匀试验

参考答案：C

34. 按照现行国家免疫规划程序，儿童在3岁内接种（）次百白破疫苗？

A、4

B、5

C、1

D、3

参考答案：A

35. 国家免疫规划疫苗常规报告接种率的评价不包括（）。

A、常规报告接种率的及时性评价

B、常规报告接种率的敏感性评价

C、常规报告接种率的完整性评价

D、常规报告接种率的正确性评价

参考答案：B

36. 活疫苗超过小时、灭活疫苗超过小时未用完，应将疫苗废弃。

（）

A、1，1

B、0.5，1

C、0.5，0.5

D、1，1.5

参考答案：B

37. 关于接种前消毒，下列哪种说法是不正确的？（）

- A、消毒的顺序是由内向外，螺旋式进行
- B、消毒直径一般大于 5 厘米
- C、皮肤消毒和接种应当避开瘢痕、炎症和硬结等病变处
- D、消毒可以采用 75%的酒精或是 2%的碘酊

参考答案：D

38. 灭活疫苗与减毒活疫苗相比，其具有下列哪个优点？（）

- A、不受循环抗体的影响
- B、免疫作用时间长，一次免疫，可产生持久免疫
- C、免疫效果牢固
- D、除注射接种外，可采取自然感染的途径（如口服、喷雾等）进行免疫

参考答案：A

39. 国家对儿童实行预防接种证制度，儿童出生多长时间内其监护人应当到儿童居住地承担接种工作的接种的单位办理预防接种证？（）

- A、2 个月
- B、任何时候
- C、3 个月
- D、1 个月

参考答案：D

40. 国务院于（）年颁布的《疫苗流通和预防接种管理条例》是目前应用的最新修订版？

- A、2012
- B、2005
- C、2019
- D、2016

参考答案：D

41. 从事免疫规划疫苗接种的单位由（）指定。

- A、市级以上人民政府卫生健康主管部门
- B、国家级卫生健康主管部门
- C、省级以上人民政府卫生健康主管部门
- D、县级以上人民政府卫生健康主管部门

参考答案：D

42. 受种者在接种后应在留观室观察（）分钟？

- A、10
- B、15
- C、45
- D、30

参考答案：D

43. 关于接种后发生血小板减少性紫癜，下列说法正确的是（）。

- A、一般在疫苗接种后3天内发生
- B、一般使用干扰素治疗

- C、严重出血者可用丙种球蛋白
- D、表现为内脏广泛出血，症状极为凶险

参考答案：C

44. 两种减毒活疫苗若没有同时接种，则至少应间隔 4 周接种，这是为了（）

- A、减少和消除先注射的疫苗对后注射疫苗的干扰
- B、减少和消除后注射的疫苗对先注射疫苗的干扰
- C、区别两种疫苗引起的疑似预防接种异常反应
- D、减少两种疫苗不良反应的发生率

参考答案：A

45. 以下疫苗要在 12 月龄前完成 3 剂次接种的是（）

- A、乙肝疫苗
- B、白破疫苗
- C、流脑疫苗
- D、乙脑灭活疫苗

参考答案：A

46. 注射器（汤匙）数量按照最近一次预约人数的（）配备。

- A、1.8 倍
- B、1.2 倍
- C、2.0 倍
- D、3.0 倍

参考答案：B

47. 《疫苗管理法》正式实施的时间是 ( )。

- A、2020 年 1 月 1 日
- B、2020 年 6 月 1 日
- C、2019 年 7 月 1 日
- D、2019 年 12 月 1 日

参考答案：D

48. PPD 试验判定结果，以局部反应直径大于 5mm 为阳性。

- A、72 小时
- B、48 小时
- C、24 小时
- D、即时

参考答案：A

49. 常见的 AFP 病例中不包括 ( )。

- A、多神经病
- B、急性脑炎
- C、格林巴利综合征
- D、肌病

参考答案：B

50. 新生儿及时接种首针乙肝疫苗的时间是指 ( )。

- A、出生后 1 个月之内
- B、出生后 24 小时之内
- C、出生后 48 小时之内



D、出生后立即接种

参考答案：B

51. 预防接种证可由在新生儿出生后办理，如出生时未办理，监护人应当在儿童月内，到儿童居住地的接种单位办理。（）

A、出生医院所在辖区接种门诊，2个月

B、出生医院，1个月

C、出生医院，2个月

D、出生医院所在辖区接种门诊，1个月

参考答案：B

52. 免疫规划意义上的流动儿童，指的是（）。

A、户籍在外县、在暂居地居住满3个月及以上的≤7周岁儿童

B、户籍在外县、在暂居地居住满3个月及以上的≤6周岁儿童

C、户籍在外省、在暂居地居住满3个月及以下的≤7周岁儿童

D、户籍在外省、在暂居地居住满3个月及以上的≤6周岁儿童

参考答案：A

53. 皮内接种法注射部位为上臂三角肌，皮下接种法注射部位为上臂三角肌，肌内接种法注射部位为上臂三角肌（）。

A、下部，下部，中部

B、中部，中部，下部

C、上部，中部，下部

D、中部，下部，中部

参考答案：D

54. 发现疑似预防接种异常反应后，接种人员应及时向上级疾控机构报告，并填写“疑似预防接种异常反应报告卡”。以下内容中哪一项不需要报告？（）

- A、既往发生类似反应的情况
- B、反应发生地时间，主要临床特征、初步诊断等
- C、姓名、性别、年龄等基本信息
- D、接种疫苗名称、剂次、接种时间

参考答案：A

55. 预防接种前需要准备好有关的药品和器械，但不包括（）。

- A、体温表
- B、血压计
- C、1:1000 肾上腺素
- D、吸氧设备

参考答案：D

56. 不安全注射可能造成的危害是（）。

- A、感染血源性传染病
- B、霍乱
- C、呼吸道传染病
- D、过敏性休克

参考答案：A

57. 关于接种卡介苗作用的描述，下列说法正确的是（）。

- A、能预防大量传染性肺结核病例

- B、对儿童期结核性脑膜炎和粟粒性结核病有明显预防作用
- C、接种 BCG 能预防原发性结核杆菌感染
- D、能明显降低社区中的结核病传播

参考答案：B

58. 下列关于冷链设备安装要求表述有错误的是（）。

- A、每种设备安装专用插座, 但相同设备之间可以共用插座
- B、安装在保持通风的专用房间内
- C、避免阳光直射, 远离热源
- D、设备安装必须有技术人员按照规定程序和使用说明书进行

参考答案：A

59. 关于预防接种的说法正确的是（）。

- A、安瓿开启后, 减毒活疫苗超过半小时应废弃
- B、接种部位皮肤可以用 2%碘酊消毒
- C、儿童接种完毕应在接种门诊留观 10 分钟
- D、脊髓灰质炎疫苗可以用乳汁喂服

参考答案：A

60. 居住在中国境内的（）依法享有预防接种免疫规划疫苗的权利。

- A、户籍人口
- B、常住人口
- C、公民
- D、居民

参考答案：D

61. 预防接种管理要求，每对辖区内儿童的预防接种卡（簿）进行1次核查和整理，查缺补漏，并及时进行。

A、半年、补种

B、季度、补种

C、半年、记录

D、季度、记录

参考答案：B

62. 生产、销售疫苗属于假药的，下列哪项处罚表述错误（）

A、没收疫苗生产的原料、辅料、包装材料、设备等物品

B、停产整顿、吊销药品注册证书

C、没收违法所得以及违法生产和销售的疫苗

D、处罚违法生产、销售货物价值金额的15倍以上30倍以下的罚款

参考答案：D

63. 关于群体性预防接种，以下说法错误的是（）。

A、全国范围内的群体性接种应该由国务院卫生健康主管部门决定

B、单位或学校可以决定开展群体性接种

C、县级以上卫生行政部门可做出开展本行政区域内群体性接种的决定

D、开展群体性接种时不可以收取疫苗费和接种服务费

参考答案：B

64. 下列哪组疫苗全部采用皮下注射法接种？（）

- A、乙脑疫苗、腮腺炎疫苗，炭疽疫苗
- B、轮状病毒疫苗、风疹疫苗、腮腺炎疫苗
- C、麻疹疫苗、卡介苗、流脑疫苗
- D、流脑疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗

参考答案：D

65. 疫源地范围的大小取决于（）。

- A、传染源的活动范围、数量和周围人群的免疫状态
- B、传染源的活动范围, 传播途径的特点和周围易感人群的免疫状态等
- C、传染源的活动范围, 排出病原体数量及毒力
- D、传染源的数量, 活动范围及周围人口数多少

参考答案：B

66. 卡介苗的接种方法和剂量是（）。

- A、肌内, 0.01ml
- B、皮内, 0.1ml
- C、皮下, 0.1ml
- D、皮内, 0.01ml

参考答案：B

67. 2008 年，由卫生部、国家发展改革委、教育部、财政部、国家食品药品监督管理局等 5 部委联合下发了（），正式启动了扩大国家免疫规划工作。

- A、《关于实施扩大国家免疫规划的通知》
- B、《关于印发〈扩大国家免疫规划实施方案〉的通知》
- C、《预防接种工作规范》
- D、《疫苗流通和预防接种管理条例》

参考答案：A

68. 根据国家免疫规划疫苗儿童免疫程序，以下不符合流脑疫苗的免疫程序的是（）。

- A、1 岁接种第 2 剂 A 群流脑多糖疫苗
- B、6 月龄接种第 1 剂 A 群流脑多糖疫苗
- C、3 岁零 3 个月接种第 1 剂 A 群 C 群流脑多糖疫苗
- D、5 岁接种第 2 剂 A 群 C 群流脑多糖疫苗

参考答案：D

69. 群体性预防接种不包括以下哪一种？（）

- A、强化免疫
- B、应急接种
- C、查漏补种
- D、突击接种

参考答案：C

70. 冻制冰排时，冰排与低温冰箱之间留有的间隙。

A、 2-4cm

B、 3-5cm

C、1-3cm

D、4-6cm

参考答案：B

71. 从事疫苗生产活动，应当经（）批准，取得药品生产许可证。

A、市级以上人民政府药品监督管理部门

B、县级以上人民政府药品监督管理部门

C、省级以上人民政府药品监督管理部门

D、国家药品监督管理部门

参考答案：C

72. 接种单位的接种记录应当保存至（）备查。

A、疫苗有效期满后不少于五年

B、疫苗接种后十年

C、疫苗接种后五年

D、疫苗有效期满后不少于十年

参考答案：A

73. 下列对于预防接种一般反应的表现描述不正确的是（）。

A、全身反应中发热一般分为轻、中、重三个等级，其中轻度发热指体温在 37.1~37.5℃之间。

B、皮内接种卡介苗者，绝大部分受种者于 2 周左右在局部出现红肿，以后化脓或溃疡，3~5 周结痂，形成卡疤。

C、局部反应主要表现为红肿浸润，一般分为弱、中、强三个等级，其中中度局部反应指红肿直径在 5.0-7.0cm。



D、预防接种一般反应是指在预防接种后发生的，由疫苗本身所固有的特性引起的，对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应，主要有发热和局部红肿。

参考答案：C

74. 发生群发性癔症时，应当采取下列哪种措施？（）

A、对所有病人给予安慰剂（如维生素 C）治疗

B、可以对少数病人使用暗示疗法

C、将所有病人集中起来进行治疗管理，避免事态扩大

D、对所有病人进行全面医学体检，排除偶合病例

参考答案：B

75. 卫生部《预防接种异常反应鉴定办法》中第十四条明确规定：受种方、接种单位、疫苗生产企业对预防接种异常反应调查诊断结论有争议时，可以在收到预防接种异常反应调查诊断结论之日起内向接种单位所在地设区的市级医学会申请进行预防接种异常反应鉴定，并提交预防接种异常反应鉴定所需的材料。（）

A、60 日

B、30 日

C、90 日

D、15 日

参考答案：A

76. 关于肌肉注射，下列说法不正确的是（）

- A、适用于注射吸附疫苗，如百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗和狂犬疫苗
- B、针头与皮肤表面呈  $90^{\circ}$  角，快速进针刺入针头长度的  $1/3$
- C、注射完毕快速拔出针头，用消毒棉球稍加按压针眼部位
- D、接种部位为上臂外侧三角肌中部

参考答案：B

77. 关于皮内接种操作技术要点，下列说法不正确的是（）。

- A、使用配有 4~4.5 号针头的 1ml 一次性蓝芯注射器或 0.1ml 自毁型注射器
- B、注射完毕为防止疫苗外溢，应将针管顺时针方向旋转  $90^{\circ}$  角，然后拔出针头
- C、进针角度与皮肤呈  $10\sim 15^{\circ}$
- D、主要用于卡介苗接种

参考答案：B

78. 关于高危 AFP 病例的定义描述有错误的一项是（）。

- A、年龄小于 5 岁
- B、临床怀疑为脊灰的病例
- C、接种 OPV 次数少于 4 次或服苗史不详
- D、未采或未采集到合格大便标本的 AFP 病例

参考答案：C

79. 乙肝疫苗接种的最短间隔，第 1、2 针间隔 $\geq$ 天，第 2、3 针间隔 $\geq$ 天。（）

A、28 天，80 天

B、28 天，30 天

C、28 天，60 天

D、28 天，90 天

参考答案：C

80. 选择乙脑灭活疫苗接种时，采用剂次接种程序，第 1、2 剂间隔天。（）

A、二，7-10

B、二，28

C、四，7-10

D、三，28

参考答案：C

81. 国家免疫规划疫苗基础免疫合格接种判定标准不包括那一项？（）

A、及时接种

B、起始月龄不提前

C、在 1 周岁内完成

D、间隔时间正确，有准确的出生时间和接种时间记录

参考答案：A

82. 冷链设备的管理人员每天应至少查看几次并填写温度记录表？（）

A、4 次

B、3 次

C、2次

D、1次

参考答案：C

83. 疑似预防接种异常反应的责任报告人不包括（）。

A、疫苗生产企业

B、各级各类医疗机构

C、接种单位及其执行职务的人员

D、疾病预防控制机构

参考答案：A

84. 划痕法接种疫苗时，先洗净皮肤，做常规消毒，待消毒液干后，滴上疫苗，用单针或双排钝针划成（）字形状，使皮肤组织液有少量渗出，不可流血。

A、井

B、王

C、中

D、田

参考答案：A

85. 下列选项中，（）疫苗的起始接种年龄为2岁，推荐完成年龄是<3周岁。

A、乙脑减毒活疫苗第2剂

B、乙脑灭活疫苗第3剂

C、全部都是

D、甲肝灭活疫苗第 2 剂

参考答案：C

86. 选择甲肝减毒活疫苗接种时，采用剂次接种程序；选择甲肝灭活疫苗接种时，采用剂次接种程序。（）

A、一，三

B、一，四

C、一，二

D、二，四

参考答案：C

87. 冻制冰排程序：冰排内注入清洁水，注水量为冰排容积的。注水后冰排直立放置在低温冰箱或普通冰箱的冷冻室，冻制时间应不少于小时。（）

A、80%，12

B、80%，24

C、90%，24

D、90%，12

参考答案：C

88. 疫苗安全性观察是指（）。

A、疫苗在使用过程中是否符合安全保存要求

B、将疫苗送到上级单位进行试验

C、疫苗在运输过程中是否符合安全运输要求

D、观察疫苗在人群接种后的全身和局部反应大小

参考答案：D

89. 引起人群易感性降低可能的原因是（）。

- A、易感人口迁入
- B、实施免疫规划
- C、出生率上升
- D、人群抗体水平下降

参考答案：B

90. 《疫苗管理法》将疫苗分为（）。

- A、基础免疫疫苗、加强免疫疫苗、强化免疫疫苗和应急接种疫苗
- B、免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗
- C、自费疫苗和免费疫苗
- D、国家规定疫苗和省级规定疫苗

参考答案：B

91. 合格的双份 AFP 病例粪便标本应在麻痹后天内采集，两份至少应隔小时。

- A、7, 12
- B、7, 24
- C、14, 12
- D、14, 24

参考答案：D

92. 以下未纳入国家免疫规划疫苗的是（）

- A、脊灰灭活疫苗、乙肝疫苗
- B、肺炎疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗
- C、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗
- D、A群C群流脑多糖疫苗、甲肝灭活疫苗

参考答案：B

93. 接种操作中需严格执行“三查七对”，下列哪种情况不属于“三查”内容？（）

- A、查对儿童接种前告知情况
- B、检查疫苗、注射器外观与批号、效期
- C、查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证
- D、检查受种者健康状况和接种禁忌证

参考答案：A

94. 接种人员用 1ml 注射器配上 5.5 号针头接种麻腮风疫苗时，应快速刺入针头长度的（）。

- A、 $1/2 \sim 2/3$
- B、 $1/2 \sim 1/3$
- C、 $1/3 \sim 1/4$
- D、 $1/3 \sim 2/3$

参考答案：D

95. 疾病预防控制机构应当依照国务院卫生主管部门的规定，将购进、分发及供应记录保存至超过疫苗有效期多长时间备查？

（）



- A、5 年
- B、18 个月
- C、2 年
- D、6 个月

参考答案：A

96. 县级或设区的市卫生行政部门组织群体性预防接种报批要求为（）。

- A、报同级人民政府决定
- B、报同级卫生局决定
- C、报同级人民政府决定，报省级卫生行政部门备案
- D、报同级人民政府决定，报省级人民政府备案

参考答案：C

97. 在卡介苗的补种原则中，（）岁以上儿童可以不予补种卡介苗。

- A、 $\geq 4$  岁
- B、 $\geq 5$  岁
- C、 $\geq 2$  岁
- D、 $\geq 3$  岁

参考答案：A

98. 实施扩大国家免疫规划新纳入的国家免疫规划疫苗接种对象为（）。

- A、所有达到应种月（年）龄的适龄儿童

- B、2007 年以后出生的所有儿童，包括流动儿童
- C、规定实施时间起达到免疫程序规定各剂次月（年）龄的儿童
- D、2007 年以后出生的、在居住地居住 $\geq 3$  个月的儿童

参考答案：C

99. 2006 年安徽泗县接种甲肝疫苗事件是一起集体接种甲肝疫苗引起的（）。

- A、偶合症
- B、过敏反应
- C、心因性反应
- D、疫苗质量事故

参考答案：C

100. 麻疹防制的错误观点是（）

- A、有可靠、有效的疫苗可以预防
- B、出疹 3 天内 IgM 抗体检测阴性即可排除麻疹
- C、病毒感染后可以产生持久的免疫力
- D、麻疹病毒只有 1 个血清型，抗原性稳定

参考答案：B

101. 接种流脑多糖疫苗的作用（）

- A、产生免疫记忆
- B、产生杀菌抗体
- C、产生群体免疫
- D、降低鼻咽部带菌率

参考答案：B

102. 免疫程序内容一般不包括（）。

- A、接种禁忌症
- B、接种途径与方法
- C、免疫起始月（年）龄
- D、接种剂次和剂量，剂次之间的时间间隔

参考答案：A

103. 通过粪-口途径传播的传染病是（）。

- A、麻疹
- B、白喉
- C、百日咳
- D、甲型病毒性肝炎

参考答案：D

104. 符合条件的医疗机构在承担非免疫规划疫苗接种工作前，应报（）备案。

- A、本级卫生健康主管部门
- B、颁发其医疗机构执业许可证的卫生健康主管部门
- C、当地疾控机构
- D、上级卫生健康主管部门

参考答案：B

105. 皮下接种时针头刺入皮肤角度为（）。

- A、 $10^{\circ}$  - $20^{\circ}$

B、30° -40°

C、20° -30°

D、40° -50°

参考答案：B

106. 儿童接种下列哪种疫苗可能会对家庭中其他的免疫缺陷者的造成影响？（）

A、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗

B、MMR 疫苗

C、水痘疫苗

D、卡介苗

参考答案：A

107. 疾病预防控制机构、接种单位在接受或者购进疫苗时，应向疫苗生产企业、疫苗批发企业索取规定的证明文件并保存至超过疫苗有效期多长时间备查？（）

A、5 年

B、2 年

C、6 个月

D、18 个月

参考答案：A

108. 脊灰疫苗及百白破疫苗基础免疫各剂次的间隔时间应（）。

A、≥15 天

B、≥28 天

C、≥30 天

D、≥31 天

参考答案：B

109. 对于不能排除属于预防接种异常反应的情况，应（）。

A、应双方协商解决

B、不能纳入补偿范围

C、由政府机构决定是否可以补偿

D、纳入补偿范围

参考答案：D

110. 接种减毒活疫苗后可使用免疫球蛋白；使用免疫球蛋白后可接种减毒活疫苗。（）

A、4 周，2 周

B、4 周，4 周

C、2 周，2 周

D、2 周，4 周

参考答案：D

111. 评价以县为单位接种率的抽样方法，一般采用的方法为（）。

A、单层随机抽样法

B、按容量比例概率抽样法（PPS）

C、分层抽样法

D、批质量保证抽样方法（LQAS）

参考答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/817051045121006123>