

2025 年度护师资格考试模拟测试题
《专业实践能力》科目模拟测试

一、选择题

1. B 型题

下列服药方法，不正确的一项是

- A、助消化药饭前服
- B、服用铁剂时，禁忌饮茶
- C、发汗药服后多饮水
- D、服酸类时，避免与牙齿接触
- E、鼻饲病人服药，应自胃管灌入，灌后需温开水冲净

答案：A

解析：A

正确选择:A

2. B 型题

急性心肌梗死病人需住院治疗，住院处护理人员首先

- A、进行卫生处置
- B、进行护理诊断
- C、协助病人办理入院手续
- D、给予氧气吸入，立即平车送入病区

E、留尿便标本检验

答案：D

解析：D

危重病人应先由医护人员送入病区，入院手续由陪送人员或工作人员补办。一般患者需经过卫生处置，但是危急重症可酌情处理急性心肌梗死属于该类患者，需立即抢救。

3. B 型题

氧中毒后出现失明多见于

A、新生儿

B、婴幼儿

C、青少年

D、中青年

E、老年人

答案：A

解析：A

氧中毒后由于视网膜血管收缩，视网膜纤维化，最终可以出现不可逆转的失明，仅见于新生儿，以早产儿多见。

4. B 型题

需要避光保存的药物是

A、庆大霉素

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

B、氨茶碱

C、乙醇

D、尼可刹米

E、过氧乙酸

答案：B

解析：B

氨茶碱易氧化、遇光变质，所以应避光保存。

5. B 型题

塞利认为压力的生理反应过程分成的三个阶段是指

A、警告期、适应期和解决期

B、反应期、无效期和衰竭期

C、警告期、抵抗期和衰竭期

D、拒绝期、抵抗期和适应期

E、确认期、适应期和解决期

答案：C

解析：C

因为塞利认为压力的生理反应包括全身适应综合征 GAS 和局部适应综合征 LAS，其反应过程分为三个阶段：警告期、抵抗期和衰竭期，故选 C。

6. B 型题

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

有关输血前准备工作，下列描述错误的是

- A、禁止同时为两人采集血标本
- B、必须 2 人核对，严格三查八对
- C、分界不清的库血不能使用
- D、库血应在室温内放置 20min 再输入
- E、输血前将血浆振荡摇匀

答案： E

解析： E

正确选择:E

7. B 型题

每日两次的外文缩写是

- A、bid
- B、tid
- C、qid
- D、biw
- E、qo

答案： A

解析： A

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

每日两次的外文缩写是 bid。

8. B 型题

属于长期备用医嘱的是

A、一级护理

B、X 线摄片

C、眼科会诊

D、吸氧 prm

E、餐后血糖

答案： D

解析： D

正确选择:D

9. B 型题

A． "A"抗原

B． "B"抗原

C． "A、B"抗原

D． 无

E． "D"抗原

"O" 型血者红细胞膜上存在的抗原是

答案： D

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

解析：D

N01. “O”型血者红细胞膜上无“A”或“B”抗原存在，而其血清中存在“抗A”和“抗B”两种抗体。

N02. Rh 血型以“D”抗原存在与否来表示 Rh 阳性或阴性。

10. B 型题

A. 以客观事实为依据的原则

B. 鉴定工作独立进行的原则

C. 实行合议制的原则

D. 回避原则

E. 保密原则

医疗事故鉴定工作的基本原则

答案：C

解析：C

鉴定组在工作中不受任何单位、个人干涉，属于鉴定工作独立进行的原则；医疗事故鉴定工作的基本原则是实行合议制的原则；回避医疗事故争议当事人，属于回避原则。

11. B 型题

患儿女性，10 个月。主因发热 2 天，咳嗽、喘憋 1 天入院，入院诊断“支气管肺炎”，给予静脉输液治疗

若穿刺时不慎误入动脉，其特征为

A、触之无搏动

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- B、不易滑动
- C、向心方向血流
- D、注药时局部血管树状突起
- E、血液色暗红

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：D

12. B 型题

根据弗洛伊德的性心理学说潜伏期固结会产生

- A、强迫性人格
- B、卫生习惯不良
- C、酗酒
- D、性别认同障碍
- E、身心功能失调

答案：A

解析：A

因为此期个体的性和攻击冲动埋藏在潜意识中，而通过智力和身体活动得到愉快感，所以固结者会形成压迫感或强迫性人格，故选 A。

13. B 型题

君子忧道不忧贫。——孔丘

尿液呈烂苹果味见于

- A、肝昏迷
- B、泌尿道感染
- C、阻塞性胆管炎
- D、有机磷农药中毒
- E、糖尿病酮症酸中毒

答案：E

解析：E

正确选择:E

14. B 型题

有关臀大肌注射时体表定位联线法的描述正确的是

- A、髂嵴和尾骨联线的外上 1 / 3 处
- B、髂嵴和尾骨联线的外下 1 / 3 处
- C、髂前上棘和尾骨联线的内下 1 / 3 处
- D、髂前上棘和尾骨联线的中 1 / 3 处
- E、髂前上棘和尾骨联线的外上 1 / 3 处

答案：E

解析：E

正确选择:E

15． B 型题

灭头虱用物的处理方法，不妥的一组是

- A、隔离衣--高压蒸汽灭菌
- B、治疗巾--烈日曝晒 6h
- C、篦子上的棉花--焚烧
- D、梳子--浸泡于消毒液中
- E、病人衣服--煮沸消毒

答案： E

解析： E

正确选择:E

16． B 型题

当 PaO₂ 为 80mmHg ， SaO₂ 为 88 %，此时患者

- A、呼吸困难
- B、极度呼吸困难
- C、明显发绀
- D、发绀
- E、无发绀

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

答案：E

解析：E

病人处于轻度缺氧状态，无发绀发生，不需要吸氧治疗。

17．B 型题

潜血试验为避免假阳性，不能进食的食物是

A、绿色蔬菜

B、牛奶

C、大豆

D、冬瓜

E、白萝卜

答案：A

解析：A

潜血试验为避免假阳性，不能进食绿色蔬菜。

18．B 型题

足底部禁忌用冷的主要原因是

A、以免加重血液循环障碍，导致局部组织缺血缺氧而继发坏死

B、以免出现局部荨麻疹

C、以免引起足部疼痛

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

D、以免引起肌肉痉挛

E、以防反射性末梢血管收缩影响散热或引起一过性冠状动脉收缩

答案：E

解析：E

足底禁忌用冷以防反射性末梢血管收缩影响散热或引起一过性冠状动脉收缩。

19. B 型题

独立性护理措施是指

A、源于护士独立提出的措施

B、源于医嘱的措施

C、源于病人意愿的措施

D、源于家属建议的措施

E、融入其他学科专家意见的措施

答案：A

解析：A

独立的护理措施：是不依赖医嘱。护士独立提出和采取的措施。

20. B 型题

新生儿及老年人的最佳室温应保持在

A、16～18℃

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

B、18～20℃

C、20～22℃

D、22～24℃

E、24～26℃

答案：D

解析：D

新生儿及老年病人，室温以保持在22～24℃为佳，室温过高会使神经系统受到抑制，干扰消化及呼吸功能，不利于体热的散发，影响体力恢复。

21. B型题

生物学死亡期，整个中枢神经系统及各器官的新陈代谢相继停止，是死亡过程的

A、开始阶段

B、可逆阶段

C、不可逆阶段

D、复苏前期

E、最后阶段

答案：E

解析：E

生物学死亡期是死亡过程的最后阶段，中枢神经系统和各器官功能新陈代谢相继停止，出现不可逆变化。

22. B 型题

- A. 医源性损伤
- B. 跌倒
- C. 烫伤
- D. 采用保护措施
- E. 微波

治疗性用热不当可造成病人

答案：C

解析：C

- N01. 洗手间由于地面湿滑易造成患者的跌倒，因此应设置扶手。
- N02. 用热不当最可能造成的操作就是烫伤。
- N03. 人工心脏起搏器是通过人工心脏起搏器发放脉冲电流，通过导线和电极的传导刺激心肌，使之兴奋和收缩。使用心脏起搏器的病人应远离强磁场和高电压，装有起搏器的一侧上肢应避免做过度用力或幅度过大的动作。
- N04. 放射性治疗对人体有损害，因此在进行放疗时应做好保护措施。
- N05. 医源性损伤是医护人员在实施治疗护理措施时给患者带来的损伤。

23. B 型题

- A. 4 小时
- B. 12 小时

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

C．24 天

D．7 天

E．14 天

干燥存放的无菌持物钳有效期是

答案：A

解析：A

N01. 无菌持物钳及容器一般每周更换 1 次，使用频率高的部门（手术室、门诊换药室、注射室）应每日更换 1 次，干燥存放每 4～6 小时更换 1 次。

N02. 开启的无菌溶液未污染的情况下 24 小时有效。

24．B 型题

取用无菌溶液法，不妥的是

A、取无菌溶液前，洗手，戴口罩

B、根据医嘱认真查对无菌溶液并检查瓶体完整性，溶液有无沉淀、混浊、絮状物及变色

C、倒溶液时，注意手不可触及瓶塞内面及瓶口

D、倒溶液时，可使瓶口接触容器周围

E、不可将物品伸到无菌溶液瓶中蘸取溶液

答案：D

解析：D

取用无菌溶液时手不可触及瓶塞内面及瓶口，倒溶液时勿使瓶口接触容器口周围，以防止污染。

25．B 型题

成人胃内容量为

A、150ml

B、200ml

C、250ml

D、300ml

E、350ml

答案：D

解析：D

成人胃容量约为 300ml 。

26．B 型题

不属于濒死阶段的表现是

A、呼吸不规则

B、肌张力增强

C、大小便失禁

D、意识丧失

E、出现间断呼吸

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

答案：B

解析：B

濒死期机体各系统功能极度衰弱，中枢神经系统脑干以上部位的功能处于深度抑制状态，具体表现为：意识模糊或丧失，各种反射减弱或迟钝，肌张力减退或消失，心跳减弱，血压下降，呼吸微弱或出现潮式呼吸及间断呼吸。

27．B 型题

陈先生接管一家濒临倒闭的企业三个月，出现头痛、失眠、心跳加快、肌肉酸痛等症状，按塞利的压力理论，他所处的压力生理反应期别是

- A、衰竭期
- B、适应期
- C、警告期
- D、抵抗期
- E、反应期

答案：C

解析：C

因为机体在压力源的刺激下，在警告期内通常表现出一系列以交感神经兴奋为主的改变，如血压升高、心跳加快、肌肉紧张等，故选 C。

28．B 型题

使用冰帽的目的是

- A、降温、止血

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

- B、头部降温，预防脑水肿
- C、头部止痛、镇静
- D、对颅内感染的患者使用冰帽可使颅内炎症消退
- E、为高热患者降温

答案：B

解析：B

使用冰帽可达到头部降温，预防脑水肿目的。

29. B 型题

护士对病人进行评估时，不属于资料来源的选项是

- A、病人及家属
- B、护士的判断
- C、各种检查报告单
- D、病历
- E、接种记录

答案：B

解析：B

资料的来源有：①护理对象本人；②护理对象的家属或关系密切的人员；③其他健康保健人员；④病案记录及各种检查报告；⑤医疗和护理的文献资料。

30. B 型题

在护理程序中，下列不属于信息输出的是

- A、确定护理诊断
- B、制定护理计划
- C、实施护理措施
- D、评价病人健康状况的变化
- E、根据需要确定是否需要调整护理计划和措施

答案：E

解析：E

经过分析整理资料，确定护理诊断，制定护理计划，实施护理措施，然后评价病人健康状况的变化这是信息的输出。将评价与预期目标比较，根据需要确定是否需要调整护理计划和实施，这是反馈和再输入的过程。

31. B 型题

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

破伤风皮内试验阳性时硬结的直径应大于

答案：C

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

解析：C

N01. 青霉素皮内试验阳性时硬结的直径应大于 1. 0cm 。

N02. 破伤风皮内试验阳性时硬结的直径应大于 1. 5cm 。

32. B 型题

口腔大手术，牙关紧闭者应用

A、普通饮食

B、高脂饮食

C、鼻饲饮食

D、低胆固醇饮食

E、无盐饮食

答案：C

解析：C

牙关紧闭者应用鼻饲饮食。

33. B 型题

护士小张从血库取回白细胞浓缩悬液，因故当天未予患者输注，则其保存温度和时限为

A、2℃，24 小时

B、2℃，48 小时

C、4℃，24 小时

D、4℃，48 小时

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

E、6℃，24 小时

答案：D

解析：D

白细胞浓缩悬液为新鲜全血经离心后取其白膜层的白细胞，4℃保存，48 小时内有效。

34．B 型题

A．人为因素

B．医疗设备因素

C．医疗药品因素

D．环境因素

E．时间因素

医院规章制度不健全、职责划分不明确，工作思想不认真导致的医疗事故的属于

答案：A

解析：A

N03. 医院规章制度不健全、职责划分不明确，工作思想不认真导致的医疗事故的属于人为因素导致的医疗事故；药品质量差导致的医疗事故属于医疗药品因素导致的医疗事故；临时突发事件导致的医疗事故属于时间因素导致的医疗事故。

35．B 型题

进入人体无菌组织或器官的内窥镜、活检钳应达到的消毒灭菌水平是

A、消毒

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

B、清洁

C、去污染

D、灭菌

E、洗涤

答案：D

解析：D

《消毒管理办法》规定：凡进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平。

36．B 型题

下列不能反映人体营养状况的是

A、身高

B、体重

C、皮褶厚度

D、毛发

E、年龄

答案：E

解析：E

毛发不能反映人体营养状况。

37．B 型题

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

空气栓塞病人应避免气栓阻塞

A、肺动脉入口

B、主动脉入口

C、肺静脉入口

D、下腔静脉入口

E、上腔静脉入口

答案：A

解析：A

正确选择:A

38．B 型题

有关皮下注射叙述正确的是

A、皮下注射时将小剂量的药液注入皮下组织

B、皮下注射不可以用于局部麻醉用药

C、对皮肤有刺激的药物可以做皮下注射

D、针尖与皮肤呈 15° ~30° 角刺入皮下

E、进针深度为针头的全部

答案：A

解析：A

皮下注射的定义是将小剂量的药液注入皮下组织。

39．B 型题

某传染病病室，长 5m 、宽 4m 、高 3m ，用纯乳酸进行空气消毒，纯乳酸用量是

A 、9.6ml

B 、7.2ml

C 、6.4ml

D 、4.2ml

E 、2.4ml

答案：B

解析：B

乳酸空气消毒的配制方法是每 100m³ 空间用乳酸 12ml 加等量水。该病房的空间约为 60m³ ，因此需要乳酸 7.2ml 。

40．B 型题

为有效改善临终病人的血液循环，应注意

A 、观察病人皮肤色泽和温度

B 、适时应用热水袋，水温<60℃，防止烫伤

C 、协助病人取半坐卧位

D 、吸氧

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

E、疼痛时适当应用止痛剂

答案：A

解析：A

临终病人由于循环功能逐渐减退，护士在进行护理时注意发现病人四肢冰冷时，可加盖棉被保暖，必要时使用热水袋加温。保持病人皮肤的清洁、干燥；随时观察病人生命体征的变化，皮肤的色泽和温度。

41．B 型题

A．钙

B．铁

C．碘

D．锌

E．磷

构成甲状腺素的重要成分是

答案：C

解析：C

磷具有调节酸碱平衡的作用；钙具有调节心脏、神经的传导和肌肉收缩的作用；碘是构成甲状腺素的重要成分。

模拟试题五, 专业实践能力

42．B 型题

林某，女性，32 岁，会阴侧切伤口红肿，给予红外线灯照射，灯距应为

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

A、5～10cm

B、10～20cm

C、20～30cm

D、30～50cm

E、50～70cm

答案：C

解析：C

正确选择:C

43．B 型题

患者男性，32 岁。确诊为再生障碍性贫血，欲行静脉输血治疗，已知其为“O”型血，则其血清中的抗体应为

A、抗 B

B、抗 A

C、无

D、抗 A，抗 B

E、抗 D

答案：D

解析：D

“O”型血者的红细胞内无抗原存在，而其血清中存在“抗 A”、“抗 B”两种抗体。

44． B 型题

盆底肌锻炼适用于

- A、尿潴留病人
- B、尿失禁病人
- C、肠胀气病人
- D、腹泻病人
- E、盆腔炎病人

答案： B

解析： B

尿失禁病人进行盆底肌锻炼以增强控制排尿的能力。

45． B 型题

患者男性，21 岁。在人际交往中总因为自以为是而遭遇挫折，根据弗洛伊德的性心理发展理论，你判断他的问题可能源自于

- A、口欲期
- B、肛门期
- C、性蕾期
- D、潜伏期
- E、生殖期

答案： B

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

解析：B

因为 1～3 岁个体的原欲集中在肛门区，此期的健康发展建立在控制排便所带来的愉快经历上，从而养成讲卫生守秩序并能控制自己的习惯，所以固结者则表现为缺乏自我意识或自以为是等。故选 B。

46．B 型题

大量不保留灌肠溶液的温度是

A、25～28℃

B、28～32℃

C、39～41℃

D、38～40℃

E、32～38℃

答案：C

解析：C

大量不保留灌肠溶液的温度是 39～41℃。

47．B 型题

患者在输液过程中出现溶液不滴，局部无肿胀、疼痛，护士给予挤压近针头端的输液管，感觉有阻力，且无回血，此时正确的处理措施为

A、更换针头重新穿刺

B、调整针头位置

C、生理盐水推注冲管

D、提高输液瓶位置

E、穿刺部位热敷

答案：A

解析：A

根据描述判断得出针头已阻塞，应更换针头重新穿刺。

48．B 型题

患者男性，50 岁。高级工程师，既往有高血压、冠心病史十年，近日因工作劳累诱发心绞痛急诊入院，护士对该患者进行病情询问中问到：“您上次发病是怎样控制的？”

该护士的询问属于

A、封闭式问题

B、开放式问题

C、证实性提问

D、征求意见性提问

E、任意性提问

A3 型题： 以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：B

49．B 型题

氧疗时鼻导管插入深度为

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

A、前额发际到鼻尖 的 1 / 3

B、鼻尖至耳垂的 1 / 3

C、鼻尖至耳垂的 2 / 3

D、前额发际到剑突的 1 / 3

E、鼻孔内 5cm

答案： C

解析： C

在使用单侧鼻导管吸氧时，插入长度为鼻尖到耳垂的 2 / 3。

50． B 型题

给病人鼻饲，胃管插入长度相当于病人从

A、眉心至胸骨柄长

B、眉心至剑突长

C、发际至剑突长

D、发际至胸骨柄长

E、鼻尖至剑突长

答案： C

解析： C

正确选择:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817122104055010024>