

主治医师（内分泌学）-肾上腺疾病(A1 型题)

1、Cushing 综合征是指

- A. 各种病因造成下丘脑分泌过多糖皮质激素所致病症的总称
- B. 各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素所致病症的总称
- C. 各种病因造成垂体分泌过多糖皮质激素所致病症的总称
- D. 各种病因造成肾上腺分泌过多盐皮质激素所致病症的总称
- E. 以上都不对

2、以下不属于 Cushing 综合征典型病例表现的是

- A. 皮质醇分泌失去昼夜节律
- B. 具有向心性肥胖的特征
- C. 呈多血质外貌，常伴痤疮
- D. 肾上腺髓质增生或肿瘤
- E. 皮肤菲薄，紫纹

3、引起异位 ACTH 综合征的肿瘤，按发病率的顺序正确的是

- A. 小细胞性肺癌、支气管肺癌、胸腺癌、胰腺癌、神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤
- B. 小细胞性肺癌、支气管肺癌、胸腺癌、胰腺癌、嗜铬细胞瘤、神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、甲状腺髓样癌
- C. 嗜铬细胞瘤、小细胞性肺癌、支气管肺癌、胸腺癌、胰腺癌、神

神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、甲状腺髓样癌

D. 嗜铬细胞瘤、小细胞性肺癌、支气管肺癌、胸腺癌、胰腺癌、神经节细胞瘤、甲状腺髓样癌、神经母细胞瘤

E. 胰腺癌、嗜铬细胞瘤、小细胞性肺癌、支气管肺癌、胸腺癌、神经母细胞瘤、神经节细胞瘤、甲状腺髓样癌

4、异位 ACTH 综合征是

A. 由于下丘脑以外的恶性肿瘤产生 ACTH，刺激肾上腺皮质增生，分泌过量皮质类固醇所致

B. 以上都不对

C. 由于垂体以外的肿瘤产生 ACTH，刺激肾上腺皮质增生，分泌过量皮质类固醇所致

D. 由于垂体以外的恶性肿瘤产生 ACTH，刺激肾上腺皮质增生，分泌过量皮质类固醇所致

E. 由于下丘脑以外的恶性肿瘤产生 ACTH，刺激肾上腺皮质增生，分泌过量皮质类固醇所致

5、以下不属于肾上腺皮质腺瘤特点的是

A. 起病较缓慢

B. 腺瘤呈圆形或椭圆形，包膜完整

C. 切面呈黄色或褐黄色，含透明细胞和颗粒细胞

D. 多毛、多见雄激素增多表现

E. 多见于成人，男性相对较多见

6、各型 Cushing 综合征共有的特征是

A. 糖皮质激素分泌异常

B. 能被小剂量地塞米松抑制

C. 皮质醇分泌减少

D. 呈昼夜分泌节律

E. 以上都不是

7、皮肤色泽变黑很少见于

A. 血色病

B. Addison 病

C. 肝硬化

D. 嗜铬细胞瘤

E. 重症 Cushing 病

8、垂体性 Cushing 病的临床表现主要为

A. 向心性肥胖、满月脸、多血质、紫纹

B. 无典型表现，往往以并发症就诊

C. 以高血压为主，肥胖、向心性不够显著

D. 体重减轻、浮肿、低血钾性碱中毒

E. 以上都不对

9、以下叙述不正确的是

- A. ACTH 瘤常为微腺瘤，引起 Cushing 病
- B. Cushing 综合征以并发症就诊者，年龄较大，Cushing 综合征易被忽略
- C. Cushing 综合征早期病例，以高血压为主，肥胖、向心性不够显著，全身情况好，尿游离皮质醇不高
- D. 不依赖 ACTH 性双侧性肾上腺小结节性增生又叫 Meador 综合征
- E. Cushing 综合征高血压与肾素-血管紧张素系统激活有关

10、Cushing 综合征患者出现性功能障碍的机制是

- A. 以上都不对
- B. 性器官对性激素的敏感性下降
- C. 大量皮质醇对垂体促性腺激素的抑制作用
- D. 促性腺激素释放激素减少
- E. 下丘脑产生促性腺激素减少

11、以下哪项少见于皮质醇增多症的患者

- A. 骨质疏松
- B. 向心性肥胖
- C. 胆固醇明显增高
- D. 高血糖

E. 高血压

12、原发性醛固酮增多症临床表现不包括

A. 多饮、多尿

B. 水肿

C. 低血钾

D. 高血压

E. 手足搐搦

13、在原发性醛固酮增多症的病因中，最多见的是

A. 迷走的分泌醛固酮组织

B. 糖皮质激素可治性醛固酮增多症

C. 以上都不对

D. 醛固酮癌

E. 醛固酮瘤

14、原发性醛固酮增多症最常见的临床症状是

A. 高血压

B. 肾脏表现

C. 精神症状

D. 神经肌肉功能障碍

E. 心脏表现

15、对原发性醛固酮增多症的影像学检查，下列说法不正确的是

- A. 放射性碘化胆固醇肾上腺扫描或照相，如一侧肾上腺有放射性浓集，提示该侧有腺瘤
- B. 放射性碘化胆固醇肾上腺扫描或照相，如两侧肾上腺皆有放射性浓集，提示为双侧增生
- C. 放射性碘化胆固醇肾上腺扫描或照相，有时两侧肾上腺放射性可以不对称，一侧浓、一侧淡，提示为腺瘤
- D. 有认为 MB I 对醛固酮瘤检出的敏感性较 CT 高，但特异性较 CT 低
- E. 特醛症在 CT 扫描时表现为正常或双侧弥漫性增大

16、以下有关原发性醛固酮增多症的病因鉴别，不正确的是

- A. 肾上腺素静脉血激素测定时行 ACTH 兴奋试验，若为醛固酮瘤，则 ACTH 兴奋后，腺瘤侧静脉血醛固酮 / 皮质醇比值显著增加，而对侧及周围静脉血中无明显变化
- B. 放射性碘化胆固醇肾上腺扫描或照相，如一侧肾上腺有放射性浓集，提示该侧有腺瘤
- C. 应用赛庚啶后多数特醛症患者，在服后 90 分钟时血浆醛固酮下降最明显，平均下降约 50%，醛固酮瘤患者血浆醛固酮无变化
- D. 整体病情，醛固酮瘤一般较特醛症者为重，低血钾、碱中毒更为明显，血、尿醛固酮更高
- E. 整体病情，醛固酮瘤一般较特醛症者为轻，低血钾碱中毒不明显，

血、尿醛固酮较低

17、原醛症与非醛固酮所致盐皮质激素过多综合征的区别在于

- A. 后者无肾素-血管紧张素系统受抑制
- B. 后者无高血压
- C. 以上都不对
- D. 后者无低血钾性碱中毒
- E. 后者血、尿醛固酮不高，反而降低

18、有关表象性盐皮质激素过多综合征的叙述，不正确的是

- A. 此病用地塞米松治疗有效
- B. 临床表现近似原醛症，包括严重高血压，明显的低血钾性碱中毒
- C. 此病用螺内酯治疗有效
- D. 其病因为先天性 11β -羟类固醇脱氢酶缺陷
- E. 此病多见于儿童和青少年

19、有关 Liddle 综合征的叙述，不正确的是

- A. 螺内酯治疗无效，氨苯蝶啶可纠正低血钾，降低血压
- B. 患者呈高血压、肾素受抑制、醛固酮低并伴低血钾
- C. 其病因为上皮细胞钠通道的异常
- D. 螺内酯治疗有效
- E. 此为一种常染色体遗传疾病

20、原醛症引起醛固酮分泌增多的病变部位是在

- A. 下丘脑
- B. 以上都不对
- C. 垂体
- D. 肾上腺皮质
- E. 肾上腺髓质

21、所谓肾素反应性腺瘤是指

- A. 腺瘤患者对站立位所致肾素升高呈醛固酮减少
- B. 指腺瘤只对肾素有反应
- C. 腺瘤患者对站立位所致肾素升高呈醛固酮增多
- D. 腺瘤的大小可由肾素调节
- E. 以上都不对

22、Addison 病最常见的病因是

- A. 葡萄球菌性肾上腺炎
- B. 自身免疫性肾上腺炎
- C. 先天性肾上腺发育不良
- D. 恶性肿瘤转移
- E. 肾上腺结核

23、有关 APSI 型的叙述，不正确的是

- A. 常见于成年人
- B. 女性可表现为卵巢功能低下
- C. 主要表现为肾上腺功能减退、甲状旁腺功能减退及黏膜皮肤白色念珠菌病
- D. 此综合征呈常染色体隐性遗传
- E. 常见于儿童

24、有关 APS II型的描述，不正确的是

- A. 呈常染色体隐性遗传
- B. 呈显性遗传
- C. 自身抗体的抗原为 21-羟化酶
- D. 平均起病年龄 24 岁
- E. 见于成人

25、Addison 病最具特征性的表现是

- A. 皮肤色素变淡
- B. 胃肠道症状
- C. 代谢障碍
- D. 全身皮肤色素加深
- E. 神经、精神系统症状

26、Addison 病患者每天至少摄入食盐

A. 30~35g

B. 15~20g

C. 8~10g

D. 5g

E. 20~30g

27、以下有关嗜铬细胞瘤的叙述，正确的是

A. 瘤体产生大量的肾上腺素，使血压急剧升高

B. 大多为恶性肿瘤

C. 大多病情凶险，很难治愈

D. 大多数病例如能及早治疗，可以治愈

E. 发病率男多于女

28、肾上腺外嗜铬细胞瘤主要位于

A. 颅内

B. 颈部

C. 以上都不对

D. 胸部

E. 腹部

29、关于嗜铬细胞瘤的叙述，下列说法不正确的是

- A. 嗜铬细胞瘤患者应首选 β 受体阻滞剂控制高血压
- B. 嗜铬细胞瘤多位于肾上腺，也可位于腹腔内的肾上腺外，甚至可位于腹腔外
- C. 嗜铬细胞瘤可分泌肾上腺素和去甲肾上腺素
- D. 嗜铬细胞瘤患者可有高血压或低血压，心动过速或心率缓慢，全身发热或四肢冰凉，急性腹痛、高热、心率失常等
- E. 嗜铬细胞瘤患者约半数伴有基础代谢率升高、体重减轻、高血糖及体位性低血压

30、嗜铬细胞瘤发生低血压和休克的原因，下列不正确的是

- A. 肿瘤骤然发生出血、坏死，以致停止释放儿茶酚胺
- B. 大量儿茶酚胺引起严重心律失常或心力衰竭，致心排血量锐减
- C. 肾上腺受体敏感性下降
- D. 肿瘤分泌多种扩血管物质
- E. 由于肿瘤主要分泌肾上腺素，兴奋肾上腺素能 β 受体，使周围血管扩张

31、治疗嗜铬细胞瘤常用的降压药是

- A. 北京降压 0 号
- B. 复方降压片
- C. 尼群地平
- D. 以上都是

E. 酚苄明

32、嗜铬细胞瘤手术前的药物应用，下列说法正确的是

- A. 术前常规应用 β 受体阻滞剂
- B. α 受体阻断药的应用一般不得少于 2 周
- C. 因酚苄明作用时间长，故手术前 3 天宜停用
- D. 以上都不对
- E. 术前停用降压药，单用 β 受体阻滞剂

33、如患者为孕妇，若用影像学检查鉴别嗜铬细胞瘤和肾上腺皮质肿瘤，宜采用的方法是

- A. MRI
- B. X 线
- C. B 超
- D. MIBG 闪烁扫描
- E. CT 扫描

34、嗜铬细胞瘤患者骤发高血压危象时，应立即采取的措施是

- A. 立即手术治疗
- B. 以上都对
- C. 立即肌注硫酸镁
- D. 立即静脉缓慢推注酚妥拉明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818034111137006132>