

## 2024 年甘肃省金塔县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试（满分必刷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2017 年真题）会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应，用药期间不宜饮酒的药物是（）

- A: 甲硝唑
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿奇霉素
- D: 阿司匹林

**答案：A**

2.（2018 年真题）婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是（）

- A: 用温水调服
- B: 应同时碱化尿液
- C: 清晨服用
- D: 舌下含服

**答案：A**

3.属于 A 级高危药品的是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 血液透析液
- C: 全胃肠外营养液
- D: 50%葡萄糖注射液

**答案：D**

4. 餐前 30min 服用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 复方氢氧化铝
- C: 阿托伐他汀
- D: 伊托必利

**答案：B**

5. 氯喹与伯氨喹合用

- A: 引起心脏房室传导阻滞
- B: 诱发癫痫
- C: 根治间日疟
- D: 加重神经肌肉接头抑制作用

**答案：C**

6. 如“齐二药事件”

- A: 药品上市前风险评估
- B: 发现与规避假、劣药流入市场
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现药品质量问题

**答案：B**

7. 患者，女，48 岁，因急性气管一支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

- A: 美敏伪麻溶液
- B: 氨溴索溶液
- C: 沙丁胺醇气雾剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 阿莫西林胶囊

**答案: D**

8. (2019 年真题) 用药时宜限制饮水的药物是

A: 苯溴马隆胶囊

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 利托那韦片

D: 环丙沙星片

**答案: B**

9. 成人血小板计数正常参考区间是

A:  $(11.0 \sim 12.0) \times 10$

B:  $(100 \sim 300) \times 10$

C:  $(200 \sim 300) \times 10$

D:  $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

**答案: B**

10. (2016 年真题) 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是 ( )。

A: 肝脏毒性

B: 肺纤维化

C: 肾脏毒性

D: 心脏毒性

**答案: C**

11. 服用时应多饮水，同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是

A: 苯溴马隆

B: 氨苄西林

C: 氨茶碱

D: 阿仑膦酸钠

**答案: A**

12. 用药期间禁止饮酒则可出现面部潮红、头痛、眩晕等"双硫仑反应"的药品是

A: 克林霉素

B: 庆大霉素

C: 甲硝唑

D: 青霉素钾

**答案: C**

13. 患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的NSAID类药物是

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 布洛芬

**答案: B**

14. 下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

A: 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病

B: 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型

C: 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

D: 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状

**答案: D**

15. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
- B: 透析患者服用磷结合剂的钙剂，目的是为了补钙
- C: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- D: 透析患者服用钙剂量大时易出现高钙血症

**答案：B**

16. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）所致药源性损伤为

- A: 肾损害
- B: 胃肠系统损害
- C: 肝损害
- D: 肺损害

**答案：C**

17. 重度哮喘的处理不包括

- A: 吸氧
- B: 给予糖皮质激素
- C: 补液
- D: 注射毛花苷 C（西地兰）

**答案：D**

18. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 海带
- B: 虾皮
- C: 不含碘的食用盐
- D: 紫菜

**答案：C**

19. 静脉药物配置的环境条件是

- A: 千级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上
- B: 万级洁净、密闭环境下，局部千级净化的操作台上
- C: 万级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上
- D: 万级洁净、密闭环境下，局部百级净化的操作台上

**答案：D**

20. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁
- B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- C: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- D: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

**答案：B**

21. 使用消化性溃疡治疗药物的注意事项，因长期应用可导致腹泻或便秘的药物是

- A: 丙谷胺
- B: 铝碳酸镁
- C: 铋剂
- D: 硫糖铝

**答案：B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

22. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: ACEI、AR

B: 硝普钠、利尿药、ACEI

C: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

D:  $\beta$  受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

**答案：D**

23. (2017 年真题) 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择 ( )

A: 静脉滴注给药

B: 每日给药 1 次

C: 每个半衰期给药 1 次

D: 2~3 个半衰期给药 1 次

**答案：A**

24. 关于改善认知功能的药物治疗，下列说法不正确的为

A: 帕罗西汀可使加兰他敏作用增强

B: 氯化铵抑制美金刚的排泄

C: 卡巴拉汀于早晨和晚上与食物同服

D: 应用多奈哌齐时要监测胃出血

**答案：B**

25. 用体重计算年长儿童的剂量时，一般应选择

A: 剂量的 1/3

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 剂量的  $1/2$
- C: 剂量的下限
- D: 剂量的上限

**答案：C**

26. 可加重老年人慢性便秘的药物是

A: 麻黄碱

B: 异丙嗪

C: 氯丙嗪

D: H

**答案：B**

27. 以甲硝唑口颊片治疗口腔溃疡，最合理的用药方案是（）

A: 三餐前 1 小时含服

B: 三餐前含服

C: 三餐后含服

D: 三餐前 10 分钟含服

**答案：C**

28. 米索前列醇所致的主要不良反应是

A: 神经毒性

B: 性功能减退

C: 皮炎

D: 腹痛

**答案：D**

29. 强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

A: 磷化氢

B: 氯化钠

C: 氯化锌

D: 磷化锌

**答案：C**

30. 贫血患者常出现()

- A: 血小板计数增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 中性粒细胞增多

**答案：C**

31. 对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等

- A: 用药起止时间
- B: ADR/ADE 过程描述
- C: 用药原因
- D: 不良反应 / 事件的结果

**答案：B**

32. 患者，男性，58岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 鼻咽炎和尿路感染
- C: 口干、便秘、尿潴留
- D: 卧位和坐位时高血压

**答案：C**

33. 餐前 15~20min 服用的药物是

- A: 伊托必利

- B: 阿托伐他汀
- C: 奥美拉唑
- D: 复方氢氧化铝

**答案：A**

34. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h，输注速度应是

- A: 60ml / h
- B: 20ml / h
- C: 10ml / h
- D: 30ml / h

**答案：D**

35. 目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

- A: 绝经后 15 年之内或 60 岁以后
- B: 60 岁以后
- C: 绝经后 5 年之内
- D: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

**答案：D**

36. 可促进去铁胺的螯合，用于慢性铁中毒的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 D
- D: 维生素 A

**答案：A**

37. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

- A: 《马丁代尔药物大典》
- B: 《药物事实与比较》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《中国国家处方集》

**答案：A**

38. 患者，女，28岁，处于哺乳期，因阴道分泌物增多、稀薄且带鱼腥臭味，就医后确诊为细菌性阴道病，首选用药方案是

- A: 咪康唑栓，阴道给药，每晚1粒（200mg），连用7日
- B: 1:2服克林霉素300mg，每日2次，连用7日
- C: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次，连用7日
- D: 口服甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

**答案：C**

39. 机体钙吸收减少的机制是

- A: 药物生物转化障碍
- B: 组织吸收有自限性
- C: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积
- D: 经肾排泄的药物消除减慢

**答案：A**

40. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

- A: 布洛芬
- B: 头孢哌酮
- C: 阿司匹林
- D: 苯巴比妥

**答案：D**

41. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 心脏疾病
- B: 肝脏疾病
- C: 肾脏疾病
- D: 血液疾病

**答案：C**

42. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；可评价为

- A: 可能无关
- B: 待评价
- C: 可能
- D: 很可能

**答案：A**

43. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品

- A: 合理性
- B: 权威性
- C: 归因性
- D: 新颖性

**答案：A**

44. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 氯吡格雷
- B: 氨氯地平
- C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

**答案: B**

45. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

C: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

D: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

**答案: C**

46. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg/m<sup>2</sup>，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 胃食管反流病

B: 心绞痛

C: 支气管哮喘

D: 胃溃疡

**答案: A**

47. 可在一定程度上准确反映肾小球滤过功能损害程度的是

A: 肌酐

B: 淀粉酶

C: 胆固醇

D: 尿素氮

**答案：A**

48. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

A: 确认

B: 驳倒

C: 待验证

D: 验证

**答案：B**

49. 注意个体化用药体现

A: 规范性

B: 安全性

C: 有效性

D: 经济性

**答案：A**

50. 餐后 0.5~1 小时给药的是

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 胰岛素

D: 瑞格列奈

**答案：A**

51. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times 10^9/L$ 。

A: 肺结核

B: 哮喘

C: 支气管炎

D: 社区获得性肺炎

**答案: D**

52. 热程持续 4 周以上，体温持续在 37.5-38℃ 间波动，其属于

A: 不明原因发热

B: 超高热

C: 中低等度热

D: 长期低热

**答案: D**

53. 可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素 K 减少的抗菌药物是

A: 头孢唑林

B: 青霉素

C: 头孢哌酮

D: 美罗培南

**答案: C**

54. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 索利那新

B: 坦索罗辛

C: 米多君

D: 非那雄胺

**答案: D**

55. 具有抗肿瘤作用的抗风湿药

- A: 塞来昔布
- B: 利妥昔单抗
- C: 布洛芬
- D: 甲氨蝶呤

**答案：D**

56. 治疗急性细菌性扁桃体炎的首选药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 阿莫西林
- C: 克林霉素
- D: 莫西沙星

**答案：B**

57. 2~3 度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用()。

- A: ACEI
- B: 利尿剂（袪利尿药）
- C: 利尿剂（噻嗪类）
- D: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

**答案：D**

58. 致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

- A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- B: 注意定期监测器官功能
- C: 了解患者及家族的过敏史
- D: 注意特殊人群用药

**答案：A**

59. 骨髓增生病

- A: 红细胞沉降率减慢
- B: 血小板增多
- C: 白细胞增多
- D: 淋巴细胞增多

**答案：B**

60. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

- A: 立即
- B: 适量
- C: 右眼
- D: 左眼

**答案：D**

61. 主要不良反应有高血压、肝肾毒性的 DMARDs 是

- A: 利妥昔单抗
- B: 氯喹
- C: 环孢素
- D: 硫唑嘌呤

**答案：C**

62. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 抗酸药合用四环素类
- B: 磺胺类药与青霉素合用
- C: 阿司匹林合用格列美脲

D: 用药时同服甲氧氯普胺

**答案: C**

63. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

A: 处方审核

B: 处方点评

C: 参与健康教育

D: 药物信息服务

**答案: B**

64. 下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

A: 地塞米松

B: 苯巴比妥

C: 利福平

D: 异烟肼

**答案: D**

65. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 停用二甲双胍肠溶片

B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用阿托伐他汀钙片

**答案: D**

66. 常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 磺胺醋酰

- B: 麻黄碱
- C: 苯巴比妥
- D: 碳酸氢钠

**答案：D**

67. 服用大黄、番泻叶等可呈现

- A: 白陶土便
- B: 黄色
- C: 橘红至红色
- D: 红至黑色

**答案：B**

68. 运动员在比赛前使用可快速降低体重，但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 苯丙酸诺龙
- C: 人促红细胞生成素
- D: 可待因

**答案：A**

69. (毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

- A: 吗啡中毒
- B: 水银中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 有机磷中毒

**答案：B**

70. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是（）

- A: 金刚乙胺
- B: 利巴韦林
- C: 金刚烷胺
- D: 奥司他韦

**答案：D**

71. 湿疹患者的实验室检查结果常会出现（）

- A: 中性粒细胞减少
- B: 淋巴细胞减少
- C: 淋巴细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：D**

72. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 睡前给药
- B: 一日三餐后给药
- C: 清晨给药
- D: 早、晚给药

**答案：A**

73. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 A 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 万古霉素
- C: 沙利度胺

D: 阿莫西林

**答案: A**

74. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 乳酶生片

C: 干酵母片

D: 多潘立酮片

**答案: B**

75. 属于选择性雌激素调节因子类药物的是

A: 阿仑膦酸钠

B: 乳酸钙

C: 雷洛昔芬

D: 阿法骨化醇

**答案: C**

76. 给予(透析患者)维生素 B、维生素 C 的依据是

A: 有助于机体合成红细胞

B: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

D: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

**答案: C**

77. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 华法林片
- B: 氯吡格雷片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 双嘧达莫片

**答案：B**

78. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

- A: 博来霉素
- B: 白消安
- C: 氟尿嘧啶
- D: 柔红霉素

**答案：A**

79. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8°C，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 若患者腹泻加重，可口服补液盐进行补液
- B: 应避免高脂肪、高糖饮食
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- D: 每次腹泻后均要少量多次喝水，直至腹泻停止

**答案：C**

80. 习惯性便秘

- A: 比沙可啶
- B: 羧甲基纤维素钠
- C: 开塞露

D: 乳果糖

**答案：A**

81. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

A: 羟甲唑啉鼻喷雾剂

B: 布地奈德鼻喷雾剂

C: 麻黄碱滴鼻剂

D: 萘甲唑啉鼻喷雾剂

**答案：B**

82. 由美国卫生系统药师学会出版的三级文献是

A: 《新编药理学》

B: 《美国药典药物信息》

C: 《马丁代尔药物大典》

D: 《美国医院处方集服务处：药物信息》

**答案：D**

83. 服用  $\alpha$  受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 4 小时

B: 48 小时

C: 1 周

D: 24 小时

**答案：A**

84. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 诱导 CYP3A4
- C: 抑制 CYP1A2
- D: 抑制 CYP2C9

**答案：A**

85. 一般情况下，以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施，洗胃液每次的用量为

- A: 最多不超过 500ml
- B: 最多不超过 300ml
- C: 最多不超过 200ml
- D: 最多不超过 400ml

**答案：A**

86. 用于紧急避孕的药物是

- A: 左炔诺孕酮
- B: X 睾酮
- C: 黄体酮
- D: 罗格列酮

**答案：A**

87. 急性荨麻疹的治疗首选药物是

- A: 肾上腺糖皮质激素
- B: 第一代抗组胺药
- C: 第二代非镇静抗组胺药
- D: 1: 1000 肾上腺素注射液

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/818133142043007022>